RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 22

10 de julio de 2025



10 DE JULIO DE 2025

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)

INFORME N°22
20 de junio al 04 de julio de 2025.

En este vigésimo segundo informe se relevaron en total 352 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (63 localidades), NEA (47 localidades), Litoral (32 localidades), Centro Norte (67 localidades), Centro Sur (143 localidades) como se detalla en la Figura 1. En este informe también a partir de la categoría de más de 100 adultos se establecieron nuevas categorías, considerándose a los valores de 101 a 500 adultos por trampa, 501 a 1000 y más de 1000 adultos capturados por trampa (Figura 1 y 2).

Impacto de las heladas sobre las capturas de adultos de *D. maidis* en trampas cromáticas adhesivas

Se compararon los datos del informe N.º 21 (03/06 al 19/06) con los valores registrados en el informe N.º 22 (20/06 al 04/07), para cada región

En el NOA, durante el período comprendido entre el 20 de junio y el 4 de julio de 2025 se registraron heladas generalizadas en varias localidades, evento climático que tuvo un impacto directo sobre las poblaciones de *D. maidis*. Esta condición térmica adversa provocó una disminución abrupta y sostenida en las capturas, evidenciada en la mayoría de las trampas monitoreadas.
El análisis comparativo entre los informes muestra que en más del 75% de las localidades las capturas se redujeron de forma drástica, reflejando un impacto térmico severo y relativamente homogéneo en toda la región. Las heladas meteorológicas detectadas incluyeron temperaturas mínimas de hasta −5,1 °C (Frías, Santiago del Estero) y eventos que superaron las ocho horas de duración. La coincidencia temporal entre estos registros y la fuerte retracción poblacional del vector refuerza la influencia directa de estos pulsos térmicos sobre su dinámica estacional (Figura 2, 3 y 4 y tabla 1).

En el NEA, durante fines de junio y comienzos de julio, se registraron heladas de moderada intensidad —con mínimas entre −0,4 °C y −2,5 °C— en localidades representativas de Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. Las tendencias registradas en esta región fueron consistentes con las observadas en el NOA: más del 64% de las localidades relevadas evidenció una disminución marcada en las capturas de *D. maidis*

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

entre ambas evaluaciones, en estrecha relación con la ocurrencia de heladas meteorológicas generalizadas (Figura 2, 5 y 6 y tabla 2).

En el litoral durante el período comprendido entre el 20 de junio y el 4 de julio de 2025, se registraron heladas de moderada a alta intensidad en diversas localidades de Entre Ríos y Corrientes. Los registros más extremos se observaron en Entre Ríos, particularmente en Concordia y Concepción del Uruguay, donde se alcanzaron temperaturas mínimas de −7,6 °C y −7,5 °C, respectivamente, ambas el 1 de julio, con una persistencia de eventos bajo cero durante más de cinco días consecutivos. En Corrientes, las heladas fueron de menor intensidad, con mínimas entre −0,2 °C y −2,6 °C, concentradas principalmente en localidades como Mercedes y Bella Vista, mientras que en Ituzaingó no se reportaron eventos de helada en el mismo período.
El evento térmico en la región del Litoral evidenció una ola de frío con impacto entomológico, en línea con lo observado en el NOA y NEA. La ocurrencia de heladas en amplias zonas provocó una reducción del 55% en la actividad del vector, reflejada en la retracción de los focos de alta incidencia y en el incremento de localidades con baja densidad poblacional. (Figura 2, 7 y 8 y tabla 3).

En la región Centro Norte, se registraron heladas generalizadas en localidades de Córdoba, Santa Fe y San Luis, con temperaturas mínimas extremas y alta frecuencia de días bajo cero, evidenciando un evento térmico de gran magnitud e impacto regional. En Córdoba, las localidades más afectadas fueron Santa Rosa (−8,5 °C), Tancacha (−8,0 °C) y San Francisco (−8,6 °C), donde se registraron heladas todos los días del período monitoreado y temperaturas promedio diarias inferiores a −3 °C. También se destacaron El Fortín (−6,1 °C) y Corralito (−4,3 °C), con heladas frecuentes, aunque de menor intensidad. En Santa Fe, Rafaela presentó condiciones similares, con 9 días consecutivos con heladas, una mínima de −7,4 °C y un promedio térmico de −3,6 °C. En San Luis, La Toma registró la temperatura más baja del período (−10,6 °C el 30 de junio), con heladas todos los días monitoreados y valores sistemáticamente por debajo de 0 °C. El análisis comparativo entre informes muestra una retracción marcada en las capturas de *D. maidis*, atribuible al efecto directo de este evento térmico extremo. En la mayoría de las localidades evaluadas, las caídas fueron abruptas, con una reducción promedio del 86%, lo que refleja un fuerte impacto sobre la dinámica poblacional del vector. Este comportamiento resalta la importancia de mantener un monitoreo intensivo, ya que condiciones climáticas como las registradas pueden modificar significativamente el

riesgo de transmisión de patógenos, afectando las decisiones de manejo fitosanitario en los sistemas agrícolas de la región (Figura 2, 9 y 10 y tabla 4).

En el Centro Sur, entre el 20 de junio y el 4 de julio de 2025, se registraron heladas intensas y persistentes en localidades del sur de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. En Córdoba, se destacaron Huinca Renanco (−10,1 °C), Corral de Bustos (−9,6 °C) y Jovita (−8,4 °C), con heladas diarias y promedios térmicos inferiores a −3 °C. En Buenos Aires, Bordenave alcanzó los −8,2 °C, con una media de −3,8 °C y heladas en todos los días relevados. Localidades como Ferré, San Pedro y 25 de mayo también registraron descensos térmicos sostenidos. En La Pampa, Anguil llegó a −10,0 °C, mientras que, en San Luis, Naschel marcó la mínima más extrema del país: −15,3 °C, con varios días consecutivos por debajo de −8 °C.
Este evento térmico, de gran severidad y cobertura espacial, tuvo un fuerte impacto sobre las poblaciones de *D. maidis*, donde las capturas se redujeron en un 89% respecto al informe anterior, constituyendo la mayor disminución registrada entre todas las regiones analizadas (Figuras 2, 11 y 12, Tabla 5).

Es fundamental mantener el monitoreo de adultos de *D. maidis* durante todo el año, incluso en períodos de bajas temperaturas. Aunque las heladas reducen su actividad, actúan como moduladores de su dinámica poblacional, generando fluctuaciones que deben ser registradas para entender su comportamiento estacional en las distintas regiones maiceras. Esta información es clave para una toma de decisiones más precisa y oportuna.

El uso de trampas cromáticas debe complementarse con inspecciones visuales y muestreo con red entomológica, especialmente en cultivos invernales, de servicio y malezas, donde los adultos tienden a refugiarse en el estrato inferior. Esta combinación de herramientas mejora la detección en condiciones adversas y permite caracterizar con mayor exactitud la dinámica del vector a lo largo del año.

Por otro lado, cabe recordar que durante el período otoñal-invernal los adultos de *D. maidis* tienden a modificar su coloración estacional. Los ejemplares estivales suelen presentar tonalidades más claras y brillantes, mientras que los adultos que emergen en otoño e invierno adquieren una coloración más oscura. Este aspecto debe considerarse para una correcta identificación del vector en las distintas épocas del año.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, donde el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.



Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 22° lectura (20/06 al 04/07).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.



Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el primer al vigésimo segundo informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)



Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 20° (17/05 al 02/06)**,** 21° (03/06 al 19/06) y **22° Lectura (20/06 al 04/07)**.

Comentarios Región NOA

Se relevaron 63 localidades, de las cuales solo el 30% se ubicó en la categoría de mayor abundancia, con más de 100 adultos por trampa (Figura 4). En comparación con el monitoreo anterior, se registró una disminución marcada en la proporción de sitios dentro de esta categoría, los cuales se concentraron principalmente en Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Dentro de este grupo, solo el 16% de las localidades (equivalente a 3 sitios) superaron las 1000 capturas por trampa, lo que refuerza la evidencia de una reducción significativa en los niveles poblacionales del vector respecto al período previo (Figura 3 y 4).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.



Figura 4. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* en la región NOA, según datos de los informes 20°, 21° y 22°.

Tabla 1. Registros de fecha, intensidad y duración de heladas durante el periodo del 20 de junio al 04 de julio de 2025 para localidades específicas de la región NOA. Fuente: https://agromet.eeaoc.gob.ar/

Provincia	Localidad	Fecha	Intensidad (°C)	Duración (hh:mm)
SALTA	Gral. Pizarro	24/6/2025	-3,5	05:00
SANTIAGO DEL ESTERO	Rapelli	24/6/2025	-1,9	06:30
		3/7/2025	-2,0	02:30
	Isca Yacu	20/6/2025	-1,7	02:00
		21/6/2025	-0,9	00:30
		23-24/6/2025	-4,3	06:00
		26-27/6/2025	-1,1	05:45
	Frias	20/6/2025	-3,2	05:00
		21/6/2025	-0,7	00:30
		23/6/2025	-1,8	01:00
		24/6/2025	-5,1	09:00
		25/6/2025	-2,4	02:00
		26/6/2025	-1,9	05:00
		27/6/2025	-3,5	07:00
		2/7/2025	-4,6	05:00

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

		4/7/2025	-2,3	02:00
TUCUMÁN	San Agustín	20/6/2025	-0,3	01:15
		21/6/2025	-0,8	00:30
		24/6/2025	-2,3	03:00
		25/6/2025	-0,8	01:30
		26/6/2025	-0,5	01:15
		27/6/2025	-0,9	06:30
		3/7/2025	-2,9	04:45
		4/7/2025	-0,4	02:15
	La Cruz	24/6/2025	-0,9	01:30
		2/7/2025	-0,7	01:00
		3/7/2025	-0,1	00:15
CATAMARCA	Los Altos	20/6/2025	-1,1	01:00
		24/6/2025	-4,2	02:15
		25/6/2025	-1,5	02:00
		26/6/2025	-1,7	03:00
		27/6/2025	-2,2	05:00
		2/7/2025	-2,1	02:00
		3/7/2025	-3,5	08:00
		4/7/2025	-1,4	02:00

Porcentaje de la infección de los adultos de *D. maidis* a CSS. Región NOA

Entre febrero y junio de 2025 se realizaron colectas de adultos de ***Dalbulus maidis*** en las localidades de San Agustín y la Cocha provincia de Tucumán, Los Altos, provincia de Catamarca, El Palomar provincia de Santiago del Estero y Piquete Cabado, Coronel Mollinedo y Metan, provincia de Salta (región NOA), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos infectados con ***Corn Stunt Spiroplasma (CSS),*** mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de la infección de los adultos de *Dalbulus maidis* a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región NOA. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de *D. maidis*	% Infec.
San Agustín	**Tucumán**	**febrero**	**Maíz**	**30**	**27%**
San Agustín	**Tucumán**	**mayo**	**Maíz**	**30**	**33%**
Los altos	**Catamarca**	**febrero**	**Maíz**	**30**	**37%**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

La cocha	Tucumán	marzo	Maíz	30	13%
Los Altos	Catamarca	mayo	Maíz	30	50%
El Palomar	Santiago	enero	Maíz	30	13%
El Palomar	Santiago	mayo	Maíz	30	30%
Coronel Mollinedo	Salta	mayo	Maíz	30	23%
Piquete Cabado	Salta	junio	Maíz	30	30%
Metán	Salta	junio	Maíz	30	50%

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)



Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 20° (17/05 al 02/06), 21° (03/06 al 19/06) y **22° Lectura (20/06 al 04/07)**.

Comentarios Región NEA

Se realizaron relevamientos en 47 localidades, siendo la categoría más representativa la de abundancia intermedia (entre 1 y 50 adultos de *D. maidis* por trampa), que concentró el 55% de los sitios evaluados, principalmente en las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe. En

esta región, solo 2 localidades (14%) superaron las 500 capturas por trampa, destacándose La Sarita (Santa Fe) como el sitio de mayor registro, con un total de 1.089 adultos capturados, lo que marca un foco puntual de alta densidad dentro de un escenario general de baja a moderada presión poblacional (Figura 5 y 6).



Figura 6. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* en la región NEA, según datos de los informes 20°, 21° y 22°.

Tabla 2. Registros de fecha e intensidad de heladas durante el periodo del 20 de junio al 04 de julio de 2025 para localidades específicas de la región NEA. Fuente: https://siga.inta.gob.ar/#/

Provincia	Localidad	Fecha	Intensidad (°C)
CHACO	Roque Saenz Peña	24/6/2025	-0,4
		1/7/2025	-1,1
		3/7/2025	-0,9
	Basail	24/6/2025	-1,2
		1/7/2025	-1,2
		2/7/2025	-1,9
		3/7/2025	-0,9
	Las Breñas	24/6/2025	-1,5

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

		1/7/2025	-1,4
		3/7/2025	-2,5
SANTIAGO DEL ESTERO	Bandera	24/6/2025	-2,4
		1/7/2025	-0,9
		2/7/2025	-0,4
	Quimili	24/6/2025	-1,4
		27/6/2025	-0,4
		1/7/2025	-4,2
		3/7/2025	-0,3
SANTA FE	Reconquista	24/6/2025	-1,1
		1/7/2025	-1,8
		2/7/2025	-2,2
		3/7/2025	-1,8

Resumen Región Litoral



Figura 7. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 20° (17/05 al 02/06)**,** 21° (03/06 al 19/06) y **22° Lectura (20/06 al 04/07)**.

Comentarios Región Litoral

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

En la región del Litoral se relevaron 32 localidades, de las cuales solo el 9% registró densidades superiores a 20 adultos de *D. maidis* por trampa, lo que representa una disminución significativa respecto al informe anterior, donde el 27% de las localidades superaban esa categoría. Dentro de este grupo, solo una localidad (3%) alcanzó la categoría más alta de abundancia, con más de 100 adultos por trampa. Ese sitio fue **Paraná**, en la provincia de **Entre Ríos**, con un registro de 104 adultos capturados, constituyéndose en un foco puntual dentro de un escenario regional de baja densidad poblacional (Figura 7 y 8).



Figura 8. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* en la región LITORAL, según datos de los informes 20°, 21° y 22°.

Tabla 3. Registros de fecha e intensidad de heladas durante el periodo del 20 de junio al 04 de julio de 2025 para localidades específicas de la región Litoral. Fuente: https://siga.inta.gob.ar/#/

Provincia	Localidad	Fecha	Intensidad (°C)
ENTRE RÍOS	Concordia	24/6/2025	-3,8
		27/6/2025	-4,0
		30/6/2025	-4,1
		1/7/2025	-7,5
		2/7/2025	-6,6
		3/7/2025	-5,1
		4/7/2025	-0,1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

	Concepcion del Uruguay	20/6/2025	-0,1
		21/6/2025	-0,7
		24/6/2025	-1,6
		27/6/2025	-3,3
		28/6/2025	-1,2
		30/6/2025	-2,5
		1/7/2025	-7,6
		2/7/2025	-6,5
		3/7/2025	-3,8
CORRIENTES	Mercedes	30/6/2025	-0,5
		1/7/2025	-1,7
		2/7/2025	-2,6
	Bella Vista	24/6/2025	-0,2
		1/7/2025	-1,7
		2/7/2025	-1,4
	Ituzaingó	Sin registro de heladas	

Resumen Región Centro Norte



Figura 9. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 20° (17/05 al 02/06), 21° (03/06 al 19/06) y **22° Lectura (20/06 al 04/07)**.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Comentarios Región Centro Norte

De las 67 localidades relevadas, el 86% presentó presencia de *D. maidis*. Entre los sitios con capturas, predominó la categoría de menor abundancia (más de 1 a 4 adultos por trampa), que abarcó el 31% del total (21 localidades). En contraste, la categoría de mayor densidad (más de 100 adultos por trampa) evidenció una disminución marcada, pasando del 37% registrado en el informe anterior al 5% en el presente relevamiento. El mayor registro se observó en Emilia (Santa Fe), con 438 adultos por trampa, constituyéndose en el foco más destacado dentro del área evaluada (Figura 9 y 10).



Figura 10. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* en la región CENTRO NORTE, según datos de los informes 20°, 21° y 22°.

Tabla 4. Registros de fecha e intensidad de heladas durante el periodo del 20 de junio al 04 de julio de 2025 para localidades específicas de la región Centro Norte. Fuente: https://siga.inta.gob.ar/#/ https://clima.sanluis.gob.ar/InformeTemp.aspx?fechaDesde=2025070321&fechahasta=2025070421

Provincia	Localidad	Fecha	Intensidad (°C)
CÓRDOBA	San Francisco	20/6/2025	-3,8
		21/6/2025	-0,6

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

		23/6/2025	-1,6
		24/6/2025	-1,4
		26/6/2025	-1,9
		27/6/2025	-4,2
		28/6/2025	-0,9
		30/6/2025	-4,5
		1/7/2025	-8,6
		2/7/2025	-5,6
		3/7/2025	-2,2
	Santa Rosa	20/6/2025	-4,1
		21/6/2025	-1,9
		23/6/2025	-4,8
		24/6/2025	-7,6
		26/6/2025	-4,3
		27/6/2025	-6,6
		28/6/2025	-0,6
		30/6/2025	-6,6
		1/7/2025	-8,5
		2/7/2025	-5,5
		3/7/2025	-2,9
		4/7/2025	-1,6
	Corralito	23/6/2025	-0,7
		27/6/2025	-1,0
		30/6/2025	-4,3
		1/7/2025	-4,1
		2/7/2025	-3,4
		4/7/2025	-1,7
	El Fortín	20/6/2025	-0,9
		23/6/2025	-3,6
		24/6/2025	-4,6
		26/6/2025	-1,4
		27/6/2025	-3,6
		28/6/2025	-0,4
		30/6/2025	-6,1
		1/7/2025	-5,1
		2/7/2025	-4,4
		3/7/2025	-1,3
	Tancacha	20/6/2025	-3,4
		23/6/2025	-4,7
		24/6/2025	-5,3
		25/6/2025	-1,9
		26/6/2025	-2,4
		27/6/2025	-6,5

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

		28/6/2025	-3
		30/6/2025	-7,8
		1/7/2025	-7,6
		2/7/2025	-8
		3/7/2025	-0,4
		4/7/2025	-4,9
SANTA FE	Rafaela	20/6/2025	-0,7
		23/6/2025	-2,4
		24/6/2025	-3,3
		26/6/2025	-2,4
		27/6/2025	-2,9
		30/6/2025	-7,4
		1/7/2025	-5,8
		2/7/2025	-4,6
		3/7/2025	-2,9
SAN LUIS	La Toma	21/6/2025	-0,9
		23/6/2025	-2,7
		24/6/2025	-4,0
		25/6/2025	-0,1
		26/6/2025	-1,4
		27/6/2025	-2,1
		28/6/2025	-1,0
		29/6/2025	-3,1
		30/6/2025	-10,6
		1/7/2025	-5,8
		2/7/2025	-5,2

Porcentaje de la infección de los adultos de *D. maidis* a CSS. Región Centro Norte.

Entre marzo y mayo de 2025 se realizaron colectas de adultos de ***Dalbulus maidis*** en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe (región Centro Norte), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos infectados con ***Corn Stunt Spiroplasma (CSS)***, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de la infección de los adultos de *Dalbulus maidis* a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región Centro Norte. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N° de *D. maidis*	% Infec.
Esperanza	Santa Fe	marzo	Maíz	15	13%
Esperanza	Santa Fe	mayo	Maíz	30	0%

Resumen Región Centro Sur



Figura 11. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 20° (17/05 al 02/06), 21° (03/06 al 19/06) y **22° Lectura (20/06 al 04/07)**.

Comentarios Región Centro Sur

De las 143 localidades relevadas, el 65% no registró presencia de *D. maidis*. Las categorías de mayor abundancia desaparecieron por completo en este informe, reflejando una fuerte retracción poblacional. El valor más elevado se registró en Los Molles (San Luis), con apenas 31 individuos por trampa, constituyéndose en el pico más alto dentro de un escenario general de muy baja densidad (Figura 11 y 12).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.



Figura 12. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* en la región CENTRO SUR, según datos de los informes 20°, 21° y 22°.

Tabla 5. Registros de fecha e intensidad de heladas durante el periodo del 20 de junio al 04 de julio de 2025 para localidades específicas de la región Centro Sur. Fuente: https://siga.inta.gob.ar/#/ https://clima.sanluis.gob.ar/InformeTemp.aspx?fechaDesde=2025070321&fechahasta=2025070421 https://cordoba.redesclimaticas.com/next/reports?mss=30062,30076,30271,30408,30249

Provincia	Localidad	Fecha	Intensidad (°C)
CÓRDOBA	Jovita	20/6/2025	-1,3
		23/6/2025	-2,0
		25/6/2025	-2,5
		26/6/2025	-5,7
		27/6/2025	-5,6
		28/6/2025	-1,7
		29/6/2025	-6,1
		30/6/2025	-7,6
		1/7/2025	-8,4
		2/7/2025	-4,9
		3/7/2025	-2,7
		4/7/2025	-1,8

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

	Corral de Bustos	20/6/2025	-1,6
		21/6/2025	-2,0
		23/6/2025	-2,0
		24/6/2025	-3,1
		25/6/2025	-1,9
		26/6/2025	-6,2
		27/6/2025	-4,6
		28/6/2025	-0,8
		29/6/2025	-2,0
		30/6/2025	-5,2
		1/7/2025	-9,6
		2/7/2025	-4,0
		3/7/2025	-1,4
	Huinca Renanco	20/6/2025	-1,4
		21/6/2025	-0,3
		23/6/2025	-2,3
		25/6/2025	-1,5
		26/6/2025	-6,6
		27/6/2025	-6,5
		29/6/2025	-7,6
		30/6/2025	-10,1
		1/7/2025	-8,1
		2/7/2025	-6,3
		3/7/2025	-3,5
		4/7/2025	-3,3
BUENOS AIRES	San Pedro	24/6/2025	-2,4
		26/6/2025	-2,7
		27/6/2025	-1,7
		30/6/2025	-1,5
		1/7/2025	-5,3
		2/7/2025	-3,0
	Bordenave	20/6/2025	-2,6
		21/6/2025	-1,3
		24/6/2025	-4,1
		25/6/2025	-1,2
		26/6/2025	-3,5
		27/6/2025	-4,9
		28/6/2025	-2,9
		29/6/2025	-4,5

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

		30/6/2025	-6,4
		1/7/2025	-8,2
		2/7/2025	-2,6
	Ferré	24/6/2025	-2,1
		26/6/2025	-3,2
		27/6/2025	-2,8
		29/6/2025	-1,3
		30/6/2025	-3,6
		1/7/2025	-5,9
		2/7/2025	-4,1
		3/7/2025	-2,8
		4/7/2025	-0,1
	25 de mayo	24/6/2025	-1,6
		26/6/2025	-1,5
		27/6/2025	-1,6
		29/6/2025	-2,0
		30/6/2025	-1,3
		1/7/2025	-5,4
		2/7/2025	-3,5
		3/7/2025	-0,7
LA PAMPA	Anguil	20/6/2025	-1,9
		23/6/2025	-1,4
		24/6/2025	-3,4
		25/6/2025	-2,0
		26/6/2025	-2,4
		27/6/2025	-5,5
		28/6/2025	-2,7
		29/6/2025	-6,7
		30/6/2025	-9,2
		1/7/2025	-10,0
		2/7/2025	-4,8
		3/7/2025	-1,7
		4/7/2025	-5,0
SAN LUIS	Naschel	21/6/2025	-6,0
		23/6/2025	-6,5
		24/6/2025	-6,4
		25/6/2025	-3,7
		26/6/2025	-4,9
		27/6/2025	-6,9

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

		28/6/2025	-5,2
		29/6/2025	-3,8
		30/6/2025	-15,3
		1/7/2025	-9,7
		2/7/2025	-8,1
		3/7/2025	-4,3
		4/7/2025	-3,5

Porcentaje de la infección de los adultos de *D. maidis* a CSS. Región Centro sur.

En junio de 2025 se realizaron colectas de adultos de ***Dalbulus maidis*** en la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba (región Centro Sur), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos infectados con ***Corn Stunt Spiroplasma (CSS)***, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de la infección de los adultos de *Dalbulus maidis* a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región Centro Sur. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N° de *D. maidis*	% Infec.
Marcos Juárez	**Córdoba**	**junio**	**Maíz**	**37**	**5%**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 20° (17/05 al 02/06), 21° (03/06 al 19/06) y **22° Lectura correspondiente al período del 20 de junio al 04 de julio de 2025**. **Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoria.**

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos *D. maidis*/trampa		
				20° Lectura	21° Lectura	**22° Lectura**
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	22	7	**2**
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	15	12	**5**
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	28	43	**19**
4	INTA	Jujuy	El Bananal	95	675	**244**
5	AAPRESID	Salta	Rivadavia	28	368	**32**
6	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	1960	2680	**1416**
7	CREA	Salta	Antilla	3061	945	**Sin datos**
8	CREA	Salta	Ballivián	118	112	**32**
9	CREA	Salta	Ceibalito	1520	1520	**113**
10	CREA	Salta	Chaguaral	Sin datos	0	**0**
11	CREA	Salta	Copo Quiles	4464	4320	**Sin datos**
12	CREA	Salta	El Bordo	2320	2800	**Sin datos**
13	CREA	Salta	El Galpón	2238	1007	**Sin datos**
14	CREA	Salta	El Tunal	380	957	**Sin datos**
15	CREA	Salta	Embarcación	592	39	**32**
16	CREA	Salta	Gral Pizarro	2000	2240	**20**
17	CREA	Salta	Horcones	240	260	**31**
18	CREA	Salta	J V Gonzales	2030	2030	**0**
19	CREA	Salta	Las Lajitas T3	1656	1296	**282**
20	CREA	Salta	Metan 1	459	972	**155 ✓**
21	CREA	Salta	Metan 2	1665	2564	**804**
22	CREA	Salta	Mollinedo	2640	0	**21**
23	CREA	Salta	Mosconi	Sin datos	19	**7**
24	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	323	323	**9**
25	CREA	Salta	Pichanal	228	59	**2**
26	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	2300	2300	**363**
27	CREA	Salta	Santo Domingo	Sin datos	2320	**448**
29	CREA	Salta	Saravia	1540	1540	**1000**
30	CREA	Salta	Tolloche	244	244	**53**
31	CREA	Salta	Urundel	701	110	**21**
32	INTA	Salta	Metán	359	6	**6**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

33	CREA	Tucumán	Acequiones	610	214	25
34	CREA	Tucumán	Alto Verde	254	42	98 ✓
35	CREA	Tucumán	Burruyacu	630	150	Sin datos
36	CREA	Tucumán	Chilca	636	Sin datos	42
37	CREA	Tucumán	Garmendia	60	630	Sin datos
38	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	3	212	407 ✓
39	CREA	Tucumán	La Bajada	203	224	12
40	CREA	Tucumán	La Cocha 1	1040	1020	47
41	CREA	Tucumán	La Cruz	1134	2450	Sin datos
42	CREA	Tucumán	La Invernada	136	115	1065
43	CREA	Tucumán	La Virginia	530	418	42
44	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	439	2793	1096
45	CREA	Tucumán	Las Cejas	2120	4760	Sin datos
46	CREA	Tucumán	Los Pereyra	959	996	238
47	CREA	Tucumán	Los Puestos	24	169	34
48	CREA	Tucumán	Piedrabuena	227	107	38
49	CREA	Tucumán	Rapelli	3290	Sin datos	Sin datos
50	CREA	Tucumán	Río Colorado	40	132	62 ✓
51	CREA	Tucumán	Rumi Punco	1530	880	133
52	CREA	Tucumán	San Agustín	200	35	14 ✓
53	CREA	Tucumán	Tacanas	265	Sin datos	17
54	CREA	Tucumán	Taco Ralo	537	2005	15
55	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	2120	789	210 ✓
56	CREA	Tucumán	Trancas	439	191	19
57	CREA	Tucumán	Viclos	Sin datos	Perdida	134
58	INTA	Tucumán	Leales	510	1388	174
59	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	320	156	54
60	CREA	Santiago del Estero	El Charco	310	23	19
61	CREA	Santiago del Estero	El Mojón	571	895	35
62	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	268	226	18 ✓
63	CREA	Santiago del Estero	Frias 2	1542	17	0 ✓
64	CREA	Santiago del Estero	Frias	1542	1657	Sin datos
65	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 1	3061	Sin datos	Sin datos
66	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	Perdida	98	13
67	CREA	Santiago del Estero	Las Delicias	430	1025	38
68	CREA	Santiago del Estero	Lavalle	Sin datos	Perdida	Sin datos
69	CREA	Santiago del Estero	Nueva Esperanza	743	Sin datos	15
70	CREA	Santiago del Estero	Pampa Pozo	1080	1925	67
71	CREA	Santiago del Estero	Pozo de Betbedert	521	Sin datos	40
72	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	278	1820	32

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

73	**CREA**	**Santiago del Estero**	**San Pedro de Guasayán**	644	286	**157**
74	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Termas de Río Hondo**	603	Perdida	**27**
75	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Vinará**	603	219	**68**
76	**CREA**	**Catamarca**	**El Abra**	150	150	**675 ✓**
77	**CREA**	**Catamarca**	**Los Altos**	256	98	**55 ✓**

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 20° (17/05 al 02/06), 21° (03/06 al 19/06) y **22° Lectura correspondiente al período del 20 de junio al 04 de julio de 2025**. **Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoria.**

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos *D. maidis*/trampa		
				20 ° Lectura	21 ° Lectura	**22 ° Lectura**
1	**CREA**	**Formosa**	**Perin**	59	Sin datos	**35 ✓**
2	**INTA**	**Formosa**	**El colorado**	8	3	**14**
3	**INTA**	**Formosa**	**Comandante Fontana**	891	450	**215**
4	**AAPRESID**	**Chaco**	**Tres Isletas**	20	26	**18**
5	**AAPRESID**	**Chaco**	**Pampa del Infierno**	83	512	**266**
6	**AAPRESID**	**Chaco**	**Concepcion del Bermejo (Estanislao)**	Perdida	Sin datos	**210**
7	**AAPRESID**	**Chaco**	**Villa Angela**	1	17	**9**
8	**AAPRESID**	**Chaco**	**Las Piedritas**	0	0	**Sin datos**
9	**CREA**	**Chaco**	**Las Breñas**	23	19	**97 ✓**
10	**CREA**	**Chaco**	**Santa Teresa Capdevilla**	Sin datos	Sin datos	**Sin datos**
11	**CREA**	**Chaco**	**Pampa Cejas**	Sin datos	Sin datos	**Sin datos**
12	**CREA**	**Chaco**	**3 Retoños**	37	41	**Sin datos**
13	**CREA**	**Chaco**	**Kempe**	0	34	**Sin datos**
14	**INTA**	**Chaco**	**Gral. Pinedo**	42	186	**125**
15	**INTA**	**Chaco**	**Tres Isletas**	102	43	**21**
16	**INTA**	**Chaco**	**Pampa del Infierno**	2	179	**52**
17	**INTA**	**Chaco**	**Las Breñas**	Perdida	310	**611**
18	**INTA**	**Chaco**	**Juan José Castelli**	65	116	**124**
19	**INTA**	**Chaco**	**Sylvina**	143	147	**246**
20	**INTA**	**Chaco**	**Basail**	35	92	**81**
21	**AAPPCE**	**Santiago del Estero**	**Weisburd**	1120	1900	**320**
22	**AAPPCE**	**Santiago del Estero**	**Bandera**	2057	94	**32**
23	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Bandera**	Sin datos	0	**0**
24	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Arbol Blanco**	125	Sin datos	**7**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

25	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Los Juries**	340	27	**5**
26	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Roversi**	816	**874**	**50**
27	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Otumpas**	Sin datos	11	**55**
28	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Tacañitas**	320	Sin datos	**304**
30	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Campo Gallo**	Sin datos	273	**16 ✓**
31	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Sachayoj**	480	Sin datos	**294**
32	**CREA**	**Santiago del Estero**	**SotosCueva**	900	500	**0**
33	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Rosello**	13	Sin datos	**Sin datos**
34	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Tierras del Oeste**	1598	Sin datos	**9**
35	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Lilo Viejo**	Sin datos	850	**Sin datos**
36	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Cuatro Bocas**	25	0	**0**
37	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Rio Dulce**	17	19	**Sin datos**
38	**CREA**	**Santiago del Estero**	**La Rosita**	3	Sin datos	**Sin datos**
39	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Colonia Alpina**	1592	556	**Sin datos**
40	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Isla Baja**	1670	76	**14 ✓**
41	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Tomás Young**	1172	170	**12 ✓**
42	**CREA**	**Santiago del Estero**	**El colorado**	8	Sin datos	**Sin datos**
43	**INTA**	**Santiago del Estero**	**Quimilí**	2600	2050	**263**
44	**INTA**	**Santiago del Estero**	**Pampa de los Guanacos**	2600	1820	**223**
45	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Villa Minetti**	486	22	**14**
46	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Villa Minetti**	730	420	**14**
47	**CREA**	**Santa Fe**	**La Pelada**	586	446	**Sin datos**
48	**CREA**	**Santa Fe**	**Ambrosetti**	Perdida	205	**3 ✓**
49	**CREA**	**Santa Fe**	**Arroyo Ceibal**	258	285	**37**
50	**CREA**	**Santa Fe**	**Hersilia**	581	285	**Sin datos**
51	**CREA**	**Santa Fe**	**La Penca y Caraguatá**	547	162	**26**
52	**CREA**	**Santa Fe**	**Ramayón**	469	1054	**35 ✓**
53	**CREA**	**Santa Fe**	**Alejandra**	51	11	**3**
54	**CREA**	**Santa Fe**	**Margarita**	141	14	**6**
55	**CREA**	**Santa Fe**	**Vera y Pintado**	490	320	**24**
56	**CREA**	**Santa Fe**	**Emilia**	6	16	**Sin datos**
57	**CREA**	**Santa Fe**	**La María**	51	11	**Sin datos**
58	**CREA**	**Santa Fe**	**La Osca**	360	175	**16**
59	**CREA**	**Santa Fe**	**Malabrigo**	102	153	**218 ✓**
60	**CREA**	**Santa Fe**	**Soledad**	4	5	**1**
61	**INTA**	**Santa Fe**	**Reconquista**	338	217	**138**
62	**INTA**	**Santa Fe**	**Calchaquí**	7	7	**1**
63	**INTA**	**Santa Fe**	**Logroño**	3217	72	**5 ✓**
64	**INTA**	**Santa Fe**	**San javier**	983	257	**35**
65	**INTA**	**Santa Fe**	**La sarita**	453	219	**1089 ✓**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 20° (17/05 al 02/06), 21° (03/06 al 19/06) y **22° Lectura correspondiente al período del 20 de junio al 04 de julio de 2025**. **Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoria.**

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos *D. maidis*/trampa		
				20° Lectura	21° Lectura	22° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	7	15	6
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	26	Perdida	Perdida
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	32	55	10
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	3	10	2
5	INTA	Corrientes	Sauce	24	9	2
6	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	0	0	0
7	INTA	Corrientes	Mercedes	54	9	11
8	INTA	Corrientes	Virasoro	8	17	8
9	INTA	Corrientes	Goya	782	21	7
10	INTA	Corrientes	Ituzaingo	0	18	Perdida
11	INTA	Corrientes	Esquina	0	0	0
12	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	31	33	9
13	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	Perdida	3	0
14	AAPPCE	Entre Ríos	La paz	0	0	0
15	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	54	121	11
16	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	0	0	0
17	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	0	1	Perdida
18	AAPRESID	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	2
19	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	126	0	5
20	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	28	2	0
21	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	6	17	11
22	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	0	0	0
23	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	34	0	1
24	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	Perdida	Sin datos	2 ✓
25	CREA	Entre Ríos	La Paz	Perdida	21	19 ✓
26	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	Perdida	3	Sin datos
27	CREA	Entre Ríos	Feliciano	86	Sin datos	0 ✓
28	CREA	Entre Ríos	Villa Lila	4	2	Sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

29	CREA	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	0
30	CREA	Entre Ríos	Victoria	Perdida	0	1 ✓
31	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	328	Sin datos	Sin datos
32	CREA	Entre Ríos	San Fernando	Perdida	Sin datos	Sin datos
33	INTA	Entre Ríos	La Paz	5	10	1
34	INTA	Entre Ríos	Nogoya	36	162	70
35	INTA	Entre Ríos	Urdinarrain	83	18	12
36	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	11	59	27
37	INTA	Entre Ríos	Diamante	52	6	0
38	INTA	Entre Ríos	Gualeguay	235	44	19
39	INTA	Entre Ríos	Parana	198	123	104 ✓

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 20° (17/05 al 02/06), 21° (03/06 al 19/06) y **22° Lectura correspondiente al período del 20 de junio al 04 de julio de 2025**. **Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoria.**

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos *D. maidis*/trampa		
				20° Lectura	21° Lectura	22° Lectura
1	AAPRESID	San Luis	La Toma	1	4	0
2	AAPPCE	Córdoba	Corralito	360	326	30
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	346	79	29
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	32	4	4
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	186	57	53
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	650	460	5
7	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	Perdida	13	2
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	220	130	Perdida
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	26	47	2
10	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	427	Perdida	5
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	369	191	34
12	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	80	105	5
13	AAPRESID	Córdoba	Devoto	46	365	4
14	AAPRESID	Córdoba	Eufrasio Loza	772	185	37
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	35	19	3
16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	49	45	4
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	1196	1727	112

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	312	74	6
19	AAPRESID	Córdoba	Obispo trejo	5	5	1
20	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	171	167	17
21	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	0	2	2
22	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	632	540	103
23	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	35	24	7
24	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	137	20	9
25	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	107	166	16
26	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	284	10	40
27	AAPRESID	Córdoba	Hernando	0	0	0
28	CREA	Córdoba	Piquillín	313	738	17
29	CREA	Córdoba	Las Chilcas	Sin datos	61	38 ✓
30	CREA	Córdoba	Sebastián el Cano	251	72	6 ✓
31	CREA	Córdoba	El Tío	Sin datos	43	Sin datos
32	CREA	Córdoba	Colonia Tirolesa	362	337	3
33	CREA	Córdoba	Las Astillas	553	140	23 ✓
34	CREA	Córdoba	Mi Granja	77	152	0
35	CREA	Córdoba	Sacanta	Perdida	11	20 ✓
36	CREA	Córdoba	Sinsacate	Sin datos	22	1
37	CREA	Córdoba	Tala Norte	39	34	1 ✓
38	INTA	Córdoba	Manfredi	1872	49	14
39	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	834	117	2
40	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	4	52	23
41	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	3	3	0
42	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	Perdida	92	1
43	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	Perdida	22	1
44	AAPPCE	Santa Fe	Susana	12	45	11
45	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	438	322	39
46	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	Perdida	1	0
47	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	409	74	21
48	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	8	4	4
49	AAPPCE	Santa Fe	Vila	191	32	8
50	AAPPCE	Santa Fe	López	68	18	3
51	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	4	26	5
52	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	2	5	0
53	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	118	Perdida	Sin datos
54	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	36	0	438
55	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	89	20	1
56	AAPRESID	Santa Fe	La Camila	861	1583	55
57	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	127	102	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

58	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	206	221	171
59	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	1	2	1
61	AAPRESID	Santa Fe	Helvecia	6	2	3
62	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	3	4	Sin datos
63	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	244	70	18 ✓
64	CREA	Santa Fe	Ataliva	5	115	Sin datos
65	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	Perdida	66	8
66	CREA	Santa Fe	Crispi	646	Sin datos	Sin datos
67	CREA	Santa Fe	Esperanza	278	279	Sin datos
68	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	62	49	Sin datos
69	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	169	207	Sin datos
70	CREA	Santa Fe	San Fabián	Perdida	5	1 ✓
71	CREA	Santa Fe	San Martin de las Escobas	840	75	10
72	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	0	7	2 ✓
73	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	Sin datos	0	0 ✓
74	INTA	Córdoba	Marull	Perdida	Sin datos	0
75	INTA	Santa Fe	Centeno	Perdida	186	20
76	INTA	Santa Fe	Rafaela	938	1175	39
77	INTA	Santa Fe	Ceres	2080	229	23
78	INTA	Santa Fe	San Justo	572	326	23

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 20° (17/05 al 02/06), 21° (03/06 al 19/06) y **22° Lectura correspondiente al período del 20 de junio al 04 de julio de 2025**. **Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoria.**

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos *D. maidis*/trampa		
				20° Lectura	21° Lectura	22° Lectura
1	AAPRESID	San Luís	La Angelina	0	0	0
2	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	0	0	0
3	CREA	San Luís	Buena Esperanza	14	20	3 ✓
4	CREA	San Luís	Juan Jorba	32	7	9
5	CREA	San Luís	Los molles	205	823	31 ✓
6	CREA	San Luís	Naschel	53	72	2 ✓
7	CREA	San Luís	San Martín	161	25	0
8	INTA	San Luís	San Luis 1	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

9	INTA	San Luís	Quines	718	3	0
10	AAPPCE	Córdoba	Ana Zumaran	18	14	0
11	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	18	6	7
12	AAPPCE	Córdoba	General Roca	Perdida	32	7
13	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	21	12	11
14	AAPPCE	Córdoba	La playosa	31	19	4
15	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	0	0	0
16	AAPPCE	Córdoba	Tosquita	17	7	5
17	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	20	20	3
18	AAPPCE	Córdoba	Villa María	26	23	1
19	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	6	34	6
20	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	0
21	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	18	14	7
22	AAPRESID	Córdoba	Corral de Bustos	20	8	4
23	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	2	0	0
24	AAPRESID	Córdoba	Idiazabal	2	Perdida	0
25	AAPRESID	Córdoba	Lecueder	0	0	0
26	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	0	0	0
27	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	0
28	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	41	19	2
29	CREA	Córdoba	Chilibroste	110	98	Sin datos
30	CREA	Córdoba	Justiniano Posse	1	Sin datos	Sin datos
31	CREA	Córdoba	Huinca Renanco	1	Sin datos	2 ✓
32	CREA	Córdoba	Arias	7	4	Sin datos
34	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	25	14	4
35	CREA	Córdoba	General Levalle	24	31	4 ✓
36	CREA	Córdoba	La Carlota	13	0	0
37	CREA	Córdoba	Melo	5	4	0
38	CREA	Córdoba	Monte de los Gauchos	102	46	17 ✓
39	CREA	Córdoba	Punta del Agua	94	37	4
40	CREA	Córdoba	Reduccion	147	74	Sin datos
41	CREA	Córdoba	Rio Seco	206	220	3
42	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	Sin datos	5	7
43	CREA	Córdoba	Villa valeria	6	Sin datos	1
44	CREA	Córdoba	Ballesteros	Sin datos	8	2
45	CREA	Córdoba	Monte Buey	93	24	4
46	INTA	Córdoba	Marcos Juarez 2	123	34	9
47	AAPPCE	Santa Fe	Álvarez	20	7	2
48	AAPPCE	Santa Fe	Bustinza	184	26	4
49	AAPPCE	Santa Fe	Godoy	32	8	2

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

50	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	0	1	0
51	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	Perdida	0	Perdida
52	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	152	5	2
53	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	6	2	0
54	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	0	4	3
55	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	8	27	5
56	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	Perdida	28	0
57	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	8	9	5
58	AAPPCE	Santa Fe	Villada	53	19	3
59	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	0	22	0
60	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	23	21	7
61	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	45	18	0
63	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	0	0	0
64	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	0	Perdida	0
65	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	0	61	6
66	AAPRESID	Santa Fe	Villa Cañas	0	0	0
67	AAPRESID	Santa Fe	Pueblo Uranga	27	31	8
68	CREA	Santa Fe	Clucellas	83	52	3
69	CREA	Santa Fe	Maria teresa	0	0	0
71	CREA	Santa Fe	Las Rosas	0	0	0
72	CREA	Santa Fe	Teodelina	0	0	Sin datos
73	INTA	Santa Fe	Pujato	17	19	8 ✓
74	INTA	Santa Fe	Cañada de Gómez	3	34	0
75	AAPPCE	Buenos Aires	Arrecifes	8	20	3
76	AAPPCE	Buenos Aires	La invensible	0	1	0
77	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	Perdida	16	2
78	AAPPCE	Buenos Aires	17 de Agosto	0	0	0
79	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
80	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	Perdida	0	Perdida
81	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
82	AAPPCE	Buenos Aires	Colón	0	0	0
83	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
84	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
85	AAPPCE	Buenos Aires	Ferré	11	5	0
86	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	0
87	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	0	Sin datos	0
88	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	5	4	0
89	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	1	Perdida
90	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
91	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

92	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Los Toldos**	0	0	**0**
93	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Morse**	0	Sin datos	**0**
94	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pasman**	0	0	**0**
95	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pehuajó**	0	0	**0**
96	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pergamino**	0	0	**0**
97	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Ramallo**	1	1	**0**
98	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Roberts**	0	3	**0**
99	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Tres Arroyos**	0	0	**0**
100	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Villa Gral. Savio**	2	1	**0**
101	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Inés Indart**	0	**0**	**0**
102	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pirovano**	0	0	**0**
103	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Zavalía**	0	0	**0**
104	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pigüé**	0	0	**0**
105	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**25 de Mayo Salesiana**	0	0	**0**
106	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Berraondo**	0	0	**0**
107	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Carhue**	0	0	**0**
108	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Casbas**	0	0	**0**
109	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Chascomús**	0	Sin datos	**0**
110	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**La Niña**	0	Sin datos	**0**
112	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Necochea**	0	0	**0**
113	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Paraje Fra Pal**	0	0	**0**
114	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Salto**	0	0	**0**
115	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Trenque Lauquen**	0	0	**0**
116	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Chillar**	0	0	**0**
117	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Sur Bordenave**	0	0	**0**
118	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Puan**	0	0	**0**
119	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Viboras**	0	0	**0**
120	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**12 de Octubre**	0	4	**0**
122	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Ferré**	Perdida	3	**3**
123	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Vedia**	0	4	**6**
124	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**San Miguel de Arcángel**	0	0	**0**
125	**CREA**	**Buenos Aires**	**América**	2	14	**1**
126	**CREA**	**Buenos Aires**	**Arenaza**	0	0	**0**
127	**CREA**	**Buenos Aires**	**Carlos Tejedor**	1	6	**1 ✓**
128	**CREA**	**Buenos Aires**	**Casey**	0	0	**0**
129	**CREA**	**Buenos Aires**	**Daireaux**	0	0	**0**
130	**CREA**	**Buenos Aires**	**General Arenales**	0	0	**Sin datos**
131	**CREA**	**Buenos Aires**	**General Villegas**	4	2	**0**
132	**CREA**	**Buenos Aires**	**Guanaco**	7	2	**0**
133	**CREA**	**Buenos Aires**	**Henderson**	0	2	**0**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

134	**CREA**	**Buenos Aires**	**Mari Lauque**	2	1	**0**
135	**CREA**	**Buenos Aires**	**Moctezuma**	1	1	**0**
136	**CREA**	**Buenos Aires**	**Treinta de Agosto**	0	3	**0**
137	**CREA**	**Buenos Aires**	**Ayacucho**	0	0	**0**
138	**CREA**	**Buenos Aires**	**Gral. Madariaga**	0	0	**0**
139	**CREA**	**Buenos Aires**	**Orense**	0	0	**0**
140	**CREA**	**Buenos Aires**	**Bragado**	0	0	**0**
141	**CREA**	**Buenos Aires**	**San Andrés de Giles**	Sin datos	0	**0**
142	**CREA**	**Buenos Aires**	**San Pedro**	20	25	**2 ✓**
143	**CREA**	**Buenos Aires**	**Alberdi**	0	2	**1 ✓**
144	**CREA**	**Buenos Aires**	**Junín**	0	1	**0**
145	**CREA**	**Buenos Aires**	**Necochea**	0	Sin datos	**0**
146	**CREA**	**Buenos Aires**	**Pergamino**	0	Sin datos	**0**
147	**CREA**	**Buenos Aires**	**Tandil**	Sin datos	Sin datos	**Sin datos**
148	**CREA**	**Buenos Aires**	**Las Armas**	0	0	**0**
149	**CREA**	**Buenos Aires**	**Catriló**	1	0	**0**
150	**INTA**	**Buenos Aires**	**Chivilcoy**	14	11	**2**
151	**INTA**	**Buenos Aires**	**Pergamino**	37	40	**8**
152	**INTA**	**Buenos Aires**	**Conesa**	27	15	**0**
153	**INTA**	**Buenos Aires**	**San antonio de Areco**	13	36	**3**
154	**INTA**	**Buenos Aires**	**Bordenave**	0	0	**0**
155	**INTA**	**Buenos Aires**	**Gral. Villegas**	4	4	**1**
156	**INTA**	**Buenos Aires**	**Ascasubi**	0	0	**0**
157	**INTA**	**Buenos Aires**	**Bolivar**	0	0	**0**
158	**INTA**	**Buenos Aires**	**Pehuajó**	0	0	**0**
159	**INTA**	**Buenos Aires**	**Balcarce**	0	0	**0**
160	**AAPPCE**	**La Pampa**	**Macachín**	0	0	**0**
161	**AAPRESID**	**La Pampa**	**Quemu Quemu**	Perdida	0	**Sin datos**
162	**CREA**	**La Pampa**	**General Pico**	10	6	**0**
163	**CREA**	**La Pampa**	**Quemú Quemú**	2	3	**1**
164	**CREA**	**La Pampa**	**Santa Rosa**	0	0	**0**
165	**INTA**	**La Pampa**	**Anguil 1**	5	0	**0**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos **(AAPPCE)**, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa **(AAPRESID)**, Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes **(CASAFE)**, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas **(CONICET),** Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola **(CREA)**, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres **(EEAOC)**, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria **(INTA)**, Asociación Maíz y Sorgo Argentino **(MAIZAR)**, y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria **(SENASA).**

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.



	Regiones
1	**Noroeste Argentino (NOA):** Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y oeste de Santiago del Estero.
2	**Noreste Argentino (NEA):** Chaco, Formosa, este de Santiago del Estero y norte de Santa Fe.
3	**Litoral:** Entre Ríos y Corrientes.
4	**Zona Centro Norte:** San Luis, centro norte de Córdoba y centro de Santa Fe.
5	**Zona Centro Sur:** sur de Córdoba y Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.
6	**Uruguay**

Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas**. Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de *D. maidis*/trampa
1 a 4 adultos de *D. maidis*/trampa
5 a 20 adultos de *D. maidis*/trampa
21 a 50 adultos de *D. maidis*/trampa
51 a 100 adultos de *D. maidis*/trampa
> 100 adultos de *D. maidis*/trampa