



RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 29

04 de noviembre de 2025



AAPPCE




Aapresid



04 DE NOVIEMBRE DE 2025

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis



Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)

INFORME N°29

14 de octubre al 29 de octubre de 2025.

En este vigésimo noveno informe se relevaron en total 360 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (69 localidades), NEA (68 localidades), Litoral (35 localidades), Centro Norte (69 localidades) y Centro Sur (119 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 6 localidades de Uruguay.

Para cada región se analizó la evolución de los valores de captura de *D. maidis*, considerándose para este análisis solo aquellas localidades con presencia del cultivo de maíz en los últimos tres relevamientos (informes 27, 28 y 29).

En el NOA, a pesar de tratarse de una zona endémica, la población de *D. maidis* continúa evidenciando una marcada retracción. En el 65% de las localidades monitoreadas no se registraron adultos (0/trampa), mientras que en el 21% restante las capturas se mantuvieron en niveles de mera presencia (1 a 4 adultos/trampa). Esta tendencia coincide con la observada en el informe previo, tal como se muestra en la Figura 3.

En el NEA, la población del vector comienza a atravesar un período de estabilidad. En el 75% de las localidades monitoreadas no se registraron detecciones, mientras que el 15% presentó capturas bajas (entre 1 y 4 adultos por trampa), observándose leves variaciones en las categorías intermedias respecto del informe anterior (Figura 5).

En la región del Litoral, se mantiene la estabilidad en cuanto a la ausencia del vector. En el 91% de las localidades monitoreadas no se registraron detecciones, mientras que en el 9% restante las capturas se mantuvieron en niveles bajos, con valores de entre 1 y 4 adultos por trampa (Figura 7).

En la región Centro-Norte, la retracción poblacional del vector continúa acentuándose, con un 90% de las localidades sin detecciones en el presente informe. El 10% restante registró capturas correspondientes a la categoría de 1 a 4 adultos por trampa, lo que confirma una marcada disminución poblacional en la región (Figura 9).

En el Centro-Sur, la dinámica poblacional se mantiene estable y en niveles mínimos, en línea con el informe pasado: el 98% de las localidades no registró detecciones del vector (Figura 11).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Es fundamental sostener el monitoreo de adultos de *D. maidis* a lo largo de todo el año, especialmente durante los períodos de transición estacional —como el que se registra actualmente—, cuando el aumento de las temperaturas y la mayor disponibilidad del hospedero favorecerían su presencia y actividad en numerosas regiones de Argentina.

En las zonas agroecológicas con siembras tempranas de maíz, que ya atravesaron o se encuentran transitando las etapas fenológicas intermedias —en muchos casos, próximas a finalizar el período de susceptibilidad al complejo de enfermedades del CSS—, resulta fundamental intensificar los monitoreos del cultivo. Paralelamente, en las áreas destinadas a siembras tardías adquiere especial relevancia la vigilancia sobre la aparición de maíces guachos. Estas plantas voluntarias actúan como un verdadero “puente verde”, favoreciendo la supervivencia y multiplicación tanto de plagas como de patógenos durante los períodos intermedios. Su detección temprana y eliminación constituyen prácticas esenciales para interrumpir el ciclo del vector y disminuir la presión de inóculo al inicio de la campaña.

El uso de trampas cromáticas debe acompañarse con inspecciones visuales en el cultivo implantado y con muestreos mediante red entomológica, particularmente en cultivos invernales, de servicio y en malezas, que funcionan como refugio de los adultos. La combinación de estas herramientas no solo mejora la detección, sino que también permite caracterizar con mayor precisión la dinámica poblacional del vector a lo largo del año.

En la actualidad, las capturas corresponden principalmente a adultos de *D. maidis* de coloración clara, característicos de las generaciones primaverales. Esta variación estacional en la tonalidad representa un aspecto clave para la correcta identificación del vector a lo largo del año. Además, en gramíneas invernales suele encontrarse un complejo de chicharritas que con frecuencia se confunden con *D. maidis*; por ello, ante cualquier duda, se recomienda recurrir al asesoramiento de un especialista para evitar diagnósticos erróneos.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, donde el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 29° lectura (14/10 al 29/10).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el primer al vigésimo noveno informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*). La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 27° Lectura (12/09 al 27/09), 28° (28/10 al 13/10) y 29° (14/10 al 29/10).

Comentarios Región NOA

Se relevaron 69 localidades, de las cuales el 65 % no registró presencia del vector (Figura 3). La mayor captura se observó en El Bananal (Jujuy), con 111 adultos por trampa, localidad que venía mostrando un incremento sostenido en los últimos informes. Aproximadamente el 11 % de las trampas incluidas en este relevamiento (correspondientes a 8 localidades) se encuentran instaladas en lotes de maíz ya implantados —principalmente destinados a la producción de semillas y choclo—. En estas situaciones no se registraron incrementos sostenidos en las poblaciones del vector (Figura 4).




Figura 4. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NOA, según datos de los informes 27°, 28° y 29°.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)




Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 27° Lectura (12/09 al 27/09), 28° (28/10 al 13/10) y 29° (14/10 al 29/10).

Comentarios Región NEA

Del relevamiento realizado en 68 localidades, en 51 de ellas (**75%**) no se detectó la presencia del vector. Por su parte, el 15% de las localidades se ubicó en la categoría de presencia baja, con capturas de entre 1 y 4 adultos por trampa, según se detalla en las Figuras 5. En esta región, la mayor captura se registró nuevamente en **Comandante Fontana (Formosa)**, con 342 adultos por trampa, consolidándose como el foco neurálgico histórico dentro de esta zona endémica. Aproximadamente el **45%** de las trampas incluidas en este relevamiento (correspondientes a 31 localidades) se encuentran instaladas sobre maíces implantados en fechas tempranas, registrándose un ligero incremento de los niveles promedios de los adultos de *D. maidis* capturados en trampas con el correr de los monitoreos (Figura 6). En esta región será de suma importancia el seguimiento de la evolución de este vector, con foco en la posterior siembra del maíz tardío




Figura 6. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NOA, según datos de los informes 27°, 28° y 29°.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Resumen Región Litoral




Figura 7. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharra del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 27° Lectura (12/09 al 27/09), 28° (28/10 al 13/10) y 29° (14/10 al 29/10).

Comentarios Región Litoral

En la región del Litoral se relevaron 35 localidades, el **91%** de las localidades no presentó detecciones, mientras que el 9% registró capturas inferiores a 5 adultos por trampa, lo que refuerza la magnitud del proceso de estabilidad poblacional (Figuras 7). Cabe destacar que el **95%** de las trampas relevadas (correspondientes a 33 localidades) se encuentran instaladas sobre cultivos de maíz implantados, lo que evidencia la predominancia de siembras tempranas en la región, observándose en ellas valores promedios de captura de *D. maidis*, muy bajos (menos de 1 chicharra por trampa), como se detalla en la Figura 8

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharra del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.




Figura 8. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NOA, según datos de los informes 27°, 28° y 29°.

Resumen Región Centro Norte




Figura 9. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías. La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 27° Lectura (12/09 al 27/09), 28° (28/10 al 13/10) y 29° (14/10 al 29/10).

Comentarios Región Centro Norte

De las 69 localidades relevadas, el **90%** no presentó detecciones de *D. maidis* en trampas. Entre las localidades con capturas, predominó la categoría de baja abundancia (1 a 4 adultos/trampa), que representó el 10% del total (Figuras 9). El **60%** de las trampas relevadas (correspondientes a 42 localidades) se encuentran sobre maíz implantado, sin observarse incrementos de los valores de captura de *D. maidis* con el correr de los monitoreos, registrándose promedios de menos de 1 chacharita por trampa en estas situaciones (Figura 10).




Figura 10. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NOA, según datos de los informes 27°, 28° y 29°.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Resumen Región Centro Sur




Figura 11. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 27° Lectura (12/09 al 27/09), 28° (28/10 al 13/10) y 29° (14/10 al 29/10).

Comentarios Región Centro Sur

De las 119 localidades relevadas, el **98%** no registró detecciones de *D. maidis*, al igual que en el informe anterior. Este resultado consolida la estabilidad en la retracción poblacional en la región (Figuras 11). El **60%** de las localidades relevadas (71 en total) corresponde a lotes con maíz ya implantado, sin observarse incrementos del vector en estas localidades, con capturas prácticamente nulas de *D. maidis* (Figura 12).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.




Figura 12. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NOA, según datos de los informes 27°, 28° y 29°.

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa 27° Lectura (12/09 al 27/09), 28° (28/10 al 13/10) y 29° (14/10 al 29/10).

N° Loc.	Institución	Nombre de trampa	Localidad	27° Lectura	28° Lectura	29° Lectura
1	AGTSA	2025 MERCEDES UY - AGTSA	Mercedes	0		0
2	AGTSA	2025 ACEGUÁ UY - AGTSA	Peñarol	0		0
3	AGTSA	2025 RINCON DEL PINO - AGTSA	Los Arenales	0	0	0
4	AGTSA	2025 NUEVA HELVECIA - AGTSA (SAN PEDRO)	Nueva Helvecia	0	0	0
5	AGTSA	2025 LAS ARMAS	Colonia	0		0
6	AGTSA	2025 CORRALITO - AGTSA	Palmitas	0		0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Comentarios Región Uruguay

En las seis localidades monitoreadas en la República Oriental del Uruguay no se registró la presencia del vector, una tendencia que se mantiene en los últimos tres informes y que está en sintonía con la baja incidencia observada en el litoral argentino.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 27° (12/09 al 27/09), 28° (28/09 al 13/10) y 29° lectura correspondiente al periodo comprendido del 14 al 29 de octubre de 2025. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				27° Lectura	28° Lectura	29° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	3	0	0
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	8	13	Sin datos
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	1	2	0
4	INTA	Jujuy	El Bananal	30	67	111
5	AAPRESID	Salta	Rivadavia	2	2	3
6	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1		1	0
7	CREA	Salta	Antilla	5	3	1
8	CREA	Salta	Ballivián	0	0	0
9	CREA	Salta	Ceibalito	1	0	0
10	CREA	Salta	Copo Quiles	5	4	0
11	CREA	Salta	El Bordo	0	0	0
12	CREA	Salta	El Galpón	17	0	8
13	CREA	Salta	El Tunal	2	3	3
14	CREA	Salta	Embarcación	2	0	0
15	CREA	Salta	Gral Pizarro	2	0	0
16	CREA	Salta	Horcones	0	0	0
17	CREA	Salta	J V Gonzales	0	0	0
18	CREA	Salta	Las Lajitas T3	5	2	0
19	CREA	Salta	Metan 1	0	Perdida	0
20	CREA	Salta	Metan 2	19	4	8
21	CREA	Salta	Mollinedo	4	0	0
22	CREA	Salta	Mosconi	3	2	0
23	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	8	0	7
24	CREA	Salta	Pichanal	0	0	0
25	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

26	CREA	Salta	Santo Domingo	1	1	0
27	CREA	Salta	Saravia	0	0	0
28	CREA	Salta	Tolloche	3	1	1
29	CREA	Salta	Urundel	2	0	0
30	INTA	Salta	Metán	0	0	0
31	CREA	Tucumán	Alto Verde	44	139	62
32	CREA	Tucumán	Burruyacu	1	0	0
33	CREA	Tucumán	Chilca	5	1	0
34	CREA	Tucumán	Garmendia	1	0	
35	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	1	0	0
36	CREA	Tucumán	La Bajada	4	4	2
37	CREA	Tucumán	La Cocha 1	19	12	8
38	CREA	Tucumán	La Cruz	15	2	Perdida
39	CREA	Tucumán	La Invernada	1	2	1
40	CREA	Tucumán	La Virginia	1	0	0
41	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	1	3	4
42	CREA	Tucumán	Las Cejas	12	11	8
43	CREA	Tucumán	Los Pereyra	4	6	2
44	CREA	Tucumán	Los Puestos	0	0	0
45	CREA	Tucumán	Piedrabuena	0	0	0
46	CREA	Tucumán	Rapelli	6	5	1
47	CREA	Tucumán	Río Colorado	2	0	4
48	CREA	Tucumán	Rumi Punco	6	4	2
49	CREA	Tucumán	San Agustín	0	0	0
50	CREA	Tucumán	Tacanas	8	0	6
51	CREA	Tucumán	Taco Ralo	9	5	5
52	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	8	3	0
53	CREA	Tucumán	Trancas	0	0	0
54	CREA	Tucumán	Sunchal	9	4	Sin datos
55	CREA	Tucumán	Viclos	1	1	1
56	INTA	Tucumán	Leales	1	0	0
57	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	0	0	0
58	CREA	Santiago del Estero	El Charco	6	0	0
59	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	0	0	0
60	CREA	Santiago del Estero	Frias 2	0	0	0
61	CREA	Santiago del Estero	Frias	0	0	0
62	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	0	0	0
63	CREA	Santiago del Estero	Lavalle	0	0	0
64	CREA	Santiago del Estero	Nueva Esperanza	4	0	0
65	CREA	Santiago del Estero	Pampa Pozo	0	0	0
66	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	3	2	2

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

67	CREA	Santiago del Estero	San Pedro de Guasayán	35	2	Sin datos
68	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	0	1	0
69	CREA	Santiago del Estero	Vinará	1	3	3
70	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	0	0	0
71	CREA	Santiago del Estero	Fisco	2	1	0
72	CREA	Catamarca	El Abra	3	1	0
73	CREA	Catamarca	Los Altos	0	0	1
74	CREA	Catamarca	Frias	1	0	0

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 27° (12/09 al 27/09), 28° (28/09 al 13/10) y 29° lectura correspondiente al periodo comprendido del 14 al 29 de octubre de 2025. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				27° Lectura	28° Lectura	29° Lectura
1	INTA	Formosa	El colorado	2	0	1
2	INTA	Formosa	Comandante Fontana	181	178	342
3	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	6	Perdida	8
4	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	0	0	0
5	AAPRESID	Chaco	Concepcion del Bermejo (Estanislao)	3	2	1
6	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	0	0	0
7	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	4	3	0
8	CREA	Formosa	Gral. M. Belgrano	4	sin datos	sin datos
9	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	2	0	4
10	INTA	Chaco	Tres Isletas	11	26	11
11	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	0	2	4
12	INTA	Chaco	Las Breñas	Perdida	3	0
13	INTA	Chaco	Juan José Castelli	0	0	3
14	INTA	Chaco	Sylvina	0	0	Perdida
15	INTA	Chaco	Basail	2	2	0
16	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	0	2	11
17	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	0	0	0
18	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	0	0	0
19	AAPRESID	Santiago del Estero	Arbol Blanco	11	0	1
20	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	0	0	0
21	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	1	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

22	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	0	2	0
23	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	6	11	1
24	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	0	0	0
25	CREA	Chaco	Bajo Hondo	0	0	0
26	CREA	Chaco	Las Piedras	4	sin datos	0
27	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	0	0	0
28	CREA	Santiago del Estero	Weisburd		0	sin datos
29	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	0	0	0
30	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	0	0	0
31	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	0	0	2
32	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	0	0	0
33	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	0	0	0
34	INTA	Santiago del Estero	Añatuya			0
35	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	3	2	0
36	AAPPCE	Santa Fe	Villa Minetti	0	Perdida	0
37	AAPRESID	Santa Fe	Villa Minetti	0	0	0
38	CREA	Santa Fe	Emilia	Perdida	sin datos	0
39	INTA	Santa Fe	Reconquista	3	0	0
40	INTA	Santa Fe	Calchaquí	0	0	0
41	INTA	Santa Fe	Logroño	0	0	0
42	INTA	Santa Fe	San javier	0	0	0
43	INTA	Santa Fe	La sarita	4	0	12
44	CREA	Santa Fe	La Pelada	0	0	0
45	CREA	Santa Fe	Ambrosetti	0	0	0
46	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	1	0	0
47	CREA	Santa Fe	Ramayón	0	1	0
48	CREA	Santa Fe	Margarita	0	sin datos	0
49	CREA	Santa Fe	Vera y Pintado	0	0	0
50	CREA	Santa Fe	La María	0	sin datos	0
51	CREA	Santa Fe	La Osca	0	0	0
52	CREA	Santa Fe	Malabrigo	0	8	1
53	CREA	Santa Fe	Soledad	0	0	0
54	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	0	sin datos	0
55	CREA	Chaco	San Bernardo	Perdida	0	0
56	CREA	Santa Fe	Colonia Esther	0	0	0
57	CREA	Chaco	La Montenegrina	3	0	0
58	CREA	Santiago del Estero	Cuatro Bocas	0	0	sin datos
59	CREA	Santiago del Estero	Puna	2	0	0
60	CREA	Formosa	Perin	5	1	5
61	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	0	1	sin datos
62	CREA	Santiago del Estero	Lilo Viejo	0	0	0
63	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	0	0	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbuls maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

64	CREA	Chaco	Palo blanco	0	0	sin datos
65	CREA	Chaco	Pampa del Infierno	sin datos	0	sin datos
66	CREA	Chaco	Castelli	0	sin datos	sin datos
67	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	0	0	sin datos
68	CREA	Chaco	Charata	0	0	0
69	CREA	Santiago del Estero	La Rosita	0	0	0
70	CREA	Chaco	Gancedo	0	0	1
71	CREA	Chaco	Las Breñas	0	0	0
72	CREA	Santiago del Estero	Girardet	0	0	0
73	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	0	0	0
74	CREA	Santiago del Estero	El colorado	0	0	0
75	CREA	Formosa	Las Lomitas	5	7	55
76	CREA	Santiago del Estero	San Pedro de Guasayán	35	2	sin datos
77	CREA	Santiago del Estero	Casares	1	0	sin datos
78	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	0	0	0
79	CREA	Santiago del Estero	Pozo de Toba	1	0	0
80	CREA	Chaco	Otumpa		sin datos	sin datos
81	CREA	Santa Fe	Arroyo Ceibal	0	0	0
82	CREA	Santa Fe	Hersilia	0	sin datos	0

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 27° (12/09 al 27/09), 28° (28/09 al 13/10) y 29° lectura correspondiente al periodo comprendido del 14 al 29 de octubre de 2025. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				27° Lectura	28° Lectura	29° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	0	0	1
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	3	1	sin datos
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	0	3	sin datos
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	1	8	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

5	INTA	Corrientes	Sauce	0	0	0
6	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	0	0	2
7	INTA	Corrientes	Mercedes	0	0	3
8	INTA	Corrientes	Virasoro	0	4	0
9	INTA	Corrientes	Goya	0	0	0
10	INTA	Corrientes	Monte Caseros	0	0	0
11	INTA	Corrientes	Esquina	0	0	0
12	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	0	0	0
13	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	0	0	0
14	AAPPCE	Entre Ríos	La paz	0	0	sin datos
15	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	0	0	0
16	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	0	0	0
17	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	0	0	0
18	AAPRESID	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	0
19	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	0	0	0
20	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	0	0	0
21	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	0	0	0
22	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	0	Perdida	0
23	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	1	Perdida	0
24	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	0	0	0
25	CREA	Entre Ríos	La Paz	0	0	0
26	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	0	0	0
27	CREA	Entre Ríos	Feliciano	0	0	0
28	CREA	Entre Ríos	Gualeguaychu	0	0	0
29	CREA	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	0
30	CREA	Entre Ríos	Victoria	0	0	0
31	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	0	0	0
32	INTA	Entre Ríos	La Paz	0	0	0
33	INTA	Entre Ríos	Nogoya	0	0	0
34	INTA	Entre Ríos	Urdinarrain	0	0	0
35	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	0	0	0
36	INTA	Entre Ríos	Diamante	0	0	0
37	INTA	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	0
38	INTA	Entre Ríos	Parana	0	0	0

Región Centro Norte

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 27° (12/09 al 27/09), 28° (28/09 al 13/10) y 29° lectura correspondiente al periodo comprendido del 14 al 29 de octubre de 2025. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				27° Lectura	28° Lectura	29° Lectura
1	AAPRESID	San Luis	La Toma	0	0	0
2	AAPPCE	Córdoba	Corralito	1	1	0
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	0	0	0
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	0	0	0
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	1	0	1
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	3	2	0
7	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	0	Perdida	0
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	5	2	2
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	0	0
10	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	0	0	0
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	0	1	0
12	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	0	0	0
13	AAPRESID	Córdoba	Devoto	0	0	0
14	AAPRESID	Córdoba	Eufrazio Loza	0	0	0
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	0	Perdida	0
16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	0	0	2
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	3	0	0
18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	0	Perdida	0
19	AAPRESID	Córdoba	Obispo trejo	0	sin datos	0
20	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	0	0	0
21	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	0	1	sin datos
22	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	6	0	0
23	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	0	0	0
24	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	0	0	0
25	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	0	0	0
26	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	0	0	0
27	AAPRESID	Córdoba	Hernando	1	1	2
28	CREA	Córdoba	Piquillín	0	0	0
29	CREA	Córdoba	Las Chilcas	0	0	0
30	CREA	Córdoba	Sebastián el Cano	0	0	0
31	CREA	Córdoba	El Tío	0	0	0
32	CREA	Córdoba	Colonia Tirollesa	0	0	0
33	CREA	Córdoba	Las Astillas	0	0	1
34	CREA	Córdoba	Mi Granja	1	1	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

35	CREA	Córdoba	Sacanta	0	Perdida	0
36	CREA	Córdoba	Sinsacate	1	1	0
37	CREA	Córdoba	Tala Norte	0	0	0
38	INTA	Córdoba	Manfredi	0	0	0
39	INTA	Córdoba	Brinkmann	0	0	0
40	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	0	0	0
41	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	0	Perdida	0
42	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	0	0	0
43	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	0	Perdida	0
44	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	0	Perdida	0
45	AAPPCE	Santa Fe	Susana	0	Perdida	sin datos
46	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	0	0	0
47	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	0	0	0
48	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	0	0	0
49	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	0	0	0
50	AAPPCE	Santa Fe	Vila	4	1	0
51	AAPPCE	Santa Fe	López	0	0	0
52	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	0	Perdida	0
53	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	0	0	0
54	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	0	0	0
55	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	0	0	0
56	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	0	Perdida	Perdida
57	AAPRESID	Santa Fe	La Camila	0	0	0
58	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	0	0	0
59	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	0	0	0
60	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	0	2	sin datos
62	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	3	3	4
63	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	1	0	3
64	CREA	Santa Fe	Ataliva	0	0	0
65	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	0	0	0
66	CREA	Santa Fe	Crispi	0	0	sin datos
67	CREA	Santa Fe	Esperanza	0	6	0
68	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	1	0	0
69	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	0	0	0
70	CREA	Santa Fe	San Fabián	0	0	0
71	CREA	Santa Fe	San Martin de las Escobas	0	0	
72	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	0	0	0
73	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	0	sin datos	sin datos
74	INTA	Santa Fe	Centeno	0	Perdida	0
75	INTA	Santa Fe	Rafaela	0	0	0
76	INTA	Santa Fe	Ceres	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

77	INTA	Santa Fe	San Justo	0	0	Perdida
----	------	----------	-----------	---	---	---------

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 27° (12/09 al 27/09), 28° (28/09 al 13/10) y 29° lectura correspondiente al periodo comprendido del 14 al 29 de octubre de 2025. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				27° Lectura	28° Lectura	29° Lectura
1	AAPRESID	San Luís	La Angelina	0	0	0
2	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	0	Perdida	0
3	CREA	San Luís	Buena Esperanza	0	0	0
4	CREA	San Luís	Juan Jorba	0	0	0
5	INTA	San Luís	San Luis 1	0	0	0
6	INTA	San Luís	Quines	0	0	0
7	AAPPCE	Córdoba	Ana Zumaran	0	0	0
8	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	0	0	0
9	AAPPCE	Córdoba	General Roca	0	0	0
10	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	0	0	0
11	AAPPCE	Córdoba	La playosa	0	0	0
12	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	0	0	0
13	AAPPCE	Córdoba	Tosquita	0	0	0
14	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	0	0	0
15	AAPPCE	Córdoba	Villa María	0	0	0
16	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	0	0	0
17	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	0
18	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	Perdida	0	0
19	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	0	0	Perdida
20	AAPRESID	Córdoba	Lecueder	0	0	0
21	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	0	0	0
22	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	0
23	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	0	0	0
24	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	0	0	0
25	CREA	Córdoba	General Levalle	0	0	sin datos
26	CREA	Córdoba	La Carlota	0	0	0
27	CREA	Córdoba	Melo	0	1	0
28	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	1	1	1
29	CREA	Córdoba	Villa valeria	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

30	CREA	Córdoba	Monte Buey	0	0	0
31	INTA	Córdoba	Marcos Juárez 2	0	0	0
32	AAPPCE	Santa Fe	Álvarez	0	0	1
33	AAPPCE	Santa Fe	Bustanza	0	0	0
34	AAPPCE	Santa Fe	Godoy	1	0	0
35	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	0	Perdida	0
36	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	0	0
37	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	0	Perdida	0
38	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	Perdida	0	0
39	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	0	0	0
40	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	1	0	0
41	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	0	0	0
42	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	0	0	0
43	AAPPCE	Santa Fe	Villada	0	0	0
44	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	0	0	0
45	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	0	0	0
46	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	0	Perdida	0
47	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	0	0	0
48	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	0	0	0
49	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	0	0	0
50	AAPRESID	Santa Fe	Pueblo Uranga	0	0	0
51	CREA	Santa Fe	Clucellas	0	sin datos	sin datos
52	CREA	Santa Fe	Maria teresa	0	sin datos	sin datos
53	INTA	Santa Fe	Pujato	0	sin datos	0
54	INTA	Santa Fe	Cañada de Gómez	0	0	0
55	AAPPCE	Buenos Aires	Arrecifes	0	0	Perdida
56	AAPPCE	Buenos Aires	La invensible	sin datos	0	0
57	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	0	0	0
58	AAPPCE	Buenos Aires	17 de Agosto	0	0	0
59	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
60	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	sin datos	0	0
61	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	Perdida
62	AAPPCE	Buenos Aires	Colón	0	0	0
63	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
64	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
65	AAPPCE	Buenos Aires	Ferré	0	0	0
66	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	0
67	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	0	0	0
68	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	0	0	0
69	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	0	0
70	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	sin datos	0	0
71	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbùlus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

72	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
73	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	0	0	0
74	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	0	0
75	AAPPCE	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	0
76	AAPPCE	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0
77	AAPPCE	Buenos Aires	Ramallo	0	0	0
78	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	0	0	0
79	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
80	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	0	0	0
81	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	sin datos	0	0
82	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	0	0	0
83	AAPPCE	Buenos Aires	Zavalía	0	0	sin datos
84	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	0	0	0
85	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
86	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
87	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	sin datos
88	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	0	0
89	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
90	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	Perdida	0	0
91	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	0	0
92	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	0	0	0
93	AAPRESID	Buenos Aires	Chillar	0	0	0
94	AAPRESID	Buenos Aires	Puan	0	0	0
95	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	Perdida	0
96	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	Perdida	0	0
97	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	0	Perdida	Perdida
98	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
99	CREA	Buenos Aires	América	0	0	0
100	CREA	Buenos Aires	Casey	0	0	sin datos
101	CREA	Buenos Aires	Guanaco	0	0	0
102	CREA	Buenos Aires	Henderson	0	0	0
103	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	0	0	0
104	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	0	0	0
105	CREA	Buenos Aires	Orense	0	0	0
106	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0
107	CREA	Buenos Aires	San Pedro		0	0
108	CREA	Buenos Aires	Alberdi	0	0	0
109	CREA	Buenos Aires	Junín	0	0	0
110	CREA	Buenos Aires	Necochea	0	sin datos	sin datos
111	CREA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0
112	CREA	Buenos Aires	Catriló	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbuls maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

113	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	0	0	0
114	INTA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0
115	INTA	Buenos Aires	Conesa	0	0	0
116	INTA	Buenos Aires	San antonio de Areco	0	0	0
117	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
118	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	0	0	0
119	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	0	0	0
120	INTA	Buenos Aires	Bolivar	0	0	0
121	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	0
122	INTA	Buenos Aires	Balcarce	Perdida	0	0
123	AAPPCE	La Pampa	Macachín	0	0	0
124	CREA	La Pampa	General Pico	0	0	0
125	CREA	La Pampa	Quemú Quemú	0	0	0
126	CREA	La Pampa	Santa Rosa	0	0	0
127	INTA	La Pampa	Anguil 1	Perdida	0	0
128	CREA	Córdoba	Punta del Agua	0	0	0
129	CREA	San Luís	Naschel	0	0	0
130	CREA	Córdoba	Ballesteros	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (**AAPPCE**), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (**AAPRESID**), Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (**CASAFE**), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (**CONICET**), Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (**CREA**), Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (**EEAOC**), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (**INTA**), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (**MAIZAR**), y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (**SENASA**).

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.




Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas.** Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
1 a 4 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
5 a 20 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
21 a 50 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
51 a 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
> 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.