



RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 36

23 de febrero de 2026



AAPPCE




Aapresid



23 DE FEBRERO DE 2026

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis



Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)

INFORME N°36

01 de febrero al 16 de febrero de 2026.

En este trigésimo quinto informe se relevaron en total 331 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (55 localidades), NEA (67 localidades), Litoral (36 localidades), Centro Norte (68 localidades) y Centro Sur (105 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 7 localidades de Uruguay.

Para cada región se evaluó cómo evolucionaron las capturas utilizando dos enfoques: un gráfico de torta para representar el resultado de todas las trampas y un gráfico de barras para mostrar únicamente las trampas instaladas en lotes de maíz en los últimos tres relevamientos (informes 34, 35 y 36). Asimismo, en el presente informe se detalla, el estado fenológico del cultivo de maíz para cada región, según categoría (vegetativo inicial, vegetativo tardío y reproductivo). Adicionalmente, se presentan datos sobre el porcentaje de individuos portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) en localidades de San Agustín (Tucumán), Los Altos (Catamarca) y Las Lajitas (Salta) correspondiente al NOA; Ramayón, Villa Minetti (Santa Fe) y Charata (Chaco) correspondiente al NEA; Concepción del Uruguay (Entre Ríos) correspondiente al LITORAL; San Justo (Santa Fe) y Marcos Juárez (Córdoba) a la región CENTRO-NORTE.

En el NOA, el 98% de las trampas se encuentran actualmente instaladas en cultivos de maíz. En esta región, la población de *D. maidis* continúa atravesando una fase de incremento durante la presente evaluación, en coincidencia con el 57 % de los lotes de maíz tardío que transitan estadios fenológicos iniciales (Ve a V9). En el 62 % de las localidades, las detecciones correspondieron a niveles de captura de entre 1 y 20 adultos por trampa (Figura 3).

En el NEA, el 90% de las trampas se encuentran instaladas en cultivos de maíz, predominando lotes con maíz que se encuentran atravesando etapas vegetativas iniciales (Ve a V8). En esta región la población del vector transita una fase de incremento poblacional. Las categorías de captura que predominaron fueron de 5 a 20 adultos por trampa (31%) y 21 a 50 adultos por trampa (21%), mientras que el 16% de las localidades presentó valores mayores de 100 adultos por trampa (Figura 6).

En la región del Litoral el 83% de las trampas se encuentran instaladas en el cultivo de maíz predominaron las localidades con maíces que se encuentran atravesando las etapas vegetativas tardías y reproductivas (70%), mientras que el 30% al momento de la evaluación se encontraban en vegetativos iniciales. En esta región el 54% de las localidades monitoreadas presentó niveles bajos de captura, con valores comprendidos entre 1 y 20 adultos por trampa; manteniéndose estable la categoría más elevada de capturas (> 100 adultos por trampa), concentrada principalmente en localidades de Entre Ríos y asociada a lotes de maíz tardío (Figura 9).

En la región Centro-Norte, las 68 localidades relevadas cuentan con trampas instaladas en el cultivo de maíz, predominando aquellas que presentan maíces en etapas vegetativas tardías y reproductivas (76%). En esta región continúan registrándose incrementos poblacionales del vector. En el presente informe, el 88% de las localidades monitoreadas presentó detecciones, con predominio de capturas bajas, correspondientes a la categoría de 1 a 20 adultos por trampa (Figura 12).

En el Centro-Sur, donde el 43% de las trampas están instaladas en lotes con cultivo de maíz, la dinámica poblacional se mantiene estable y en niveles mínimos, en línea con el informe pasado: el 85% de las localidades no registró detecciones del vector (Figura 15).

Es fundamental sostener el monitoreo de adultos de *D. maidis* durante todo el año como una herramienta clave para anticipar cambios en su dinámica poblacional, proceso que comienza a manifestarse en todas las zonas agroecológicas bajo estudio, en estrecha asociación con las condiciones ambientales y la presencia de maíces tardíos. Bajo estas condiciones, el monitoreo adquiere un rol estratégico central, dado que el período de mayor susceptibilidad del cultivo coincide con ambientes altamente favorables para la colonización temprana del vector, en estadios del maíz donde sus daños pueden generar impactos significativos. La detección oportuna en estas fases sensibles resulta determinante para reducir el riesgo sanitario y preservar la eficacia de las estrategias de manejo implementadas.

El uso de trampas cromáticas debe acompañarse con inspecciones visuales en el cultivo implantado y con muestreos mediante red entomológica sobre todo en los maíces en estadios reproductivos que se dificulta el conteo de adultos, la combinación de estas herramientas no solo mejora la detección, sino que también permite caracterizar con mayor precisión la dinámica poblacional del vector a lo largo del año.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, en el que el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector que transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 35° lectura (01/02 al 16/02).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el décimo segundo al trigésimo sexto informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 34° (01/01 al 16/01), 35° (17/01 al 31/01) y 36° (01/02 al 16/02).

Comentarios Región NOA

Se relevaron 55 localidades, de las cuales el 93 % registró presencia del vector. En esta región, el 93 % de las localidades (51 sitios) se encontraban establecidas sobre cultivos de maíz. (**Figura 4 y 5**). La categoría más frecuente correspondió a capturas de 5 a 20 adultos por trampa, que representó el 44% de los registros (**Figura 3**). En el presente relevamiento se registra un incremento en las capturas promedio de chicharrita por trampa, en comparación con el monitoreo previo, pasando de **17,88 a 64,61 adultos por trampa (Figura 4)**. Cabe mencionar que, en esta región, predominan lotes de maíz que se encuentran atravesando fases vegetativas tempranas (Ve a V8), que representan un 57% de localidades con cultivo de maíz en el NOA. Las localidades de **El Abra y Los Altos (Catamarca)**, se destacaron por registrar las mayores capturas, con **399 y 1043 adultos por trampa**, respectivamente.




Figura 4. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NOA, según datos de los informes 34°, 35° y 36° (presente informe).




Figura 5. Porcentaje de localidades del **NOA** según categoría correspondiente al estadio fenológico del cultivo: Vegetativo Temprano (Ve a V8), Vegetativo Tardío (V9 a VT) y Reproductivo (R1 a R6).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región NOA

Entre enero y febrero de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en las localidades de San Agustín (Tucumán), Los Altos (Catamarca) y Las Lajitas (Salta), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS), mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región NOA. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
San Agustín	Tucumán	Enero	Maíz cultivado	30	3%
Los Altos	Catamarca	Enero	Maíz cultivado	30	0%
Las Lajitas	Salta	Febrero	Maíz cultivado	30	13%

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)




Figura 6. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 34° (01/01 al 16/01), 35° (17/01 al 31/01) y 36° (01/02 al 16/02).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Región NEA

Del relevamiento efectuado en 67 localidades, en 60 de ellas (90%) se registraron detecciones del vector. Cabe destacar que aproximadamente el 91% de las trampas incluidas en este relevamiento están sobre el cultivo de maíz (61 localidades), de las cuales el 79% corresponden a maíces que están atravesando etapas vegetativas iniciales (Ve a V8), como se detalla en la Figura 8.

Las categorías de captura más representativas fueron las de 5 a 20 y 21 a 50 adultos por trampa, con un 31% y 21% respectivamente (**Figura 6**). Dada esta situación, el valor promedio de captura de *D. maidis* en lotes con maíz fue de **56,49 por trampa**, nivel superior al registrado en el monitoreo anterior (Figura 7). En este contexto, localidades con mayores niveles de captura —en la provincia de Santa Fe y Santiago del Estero— correspondieron a lotes en estadios vegetativos, En particular **Colonia La María y Calchaquí** registraron los valores más elevados, con **799 y 264 adultos por trampa**, seguida por **Roversi**, con **255 adultos por trampa**. **Figura 7 y 8.**




Figura 7. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NEA, según datos de los informes 34°, 35° y 36° (presente informe).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

36° Lectura (01/02 al 16/02) - NEA (57 localidades)




Figura 8. Porcentaje de localidades del **NEA** según categoría correspondiente al estadio fenológico del cultivo: Vegetativo Temprano (Ve a V8), Vegetativo Tardío (V9 a VT) y Reproductivo (R1 a R6).

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región NEA

En enero y febrero de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en las localidades de Ramayón y Villa Minetti (provincia de Santa Fe) y Charata (Chaco), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS), mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región NEA. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
Ramayón	Santa Fe	Enero	Maíz cultivo	30	17%
Villa Minetti	Santa Fe	Enero	Maíz cultivo	30	10%
Charata	Chaco	febrero	Maíz cultivo	63	8%

Resumen Región Litoral

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 9. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 34° (01/01 al 16/01), 35° (17/01 al 31/01) y 36° (01/02 al 16/02).

Comentarios Región Litoral

En la región del Litoral se relevaron 36 localidades, de las cuales el 86% están instaladas sobre cultivos de maíz, principalmente en maíces en etapas reproductivas avanzadas, lo que refleja la predominancia de las siembras tempranas en la región. En el 89% de las localidades se registró detecciones de *D. maidis*, predominando las categorías correspondientes a capturas de 5 a 20 adultos por trampa (36%), como se detalla en la Figura 9. En este monitoreo, se mantuvo estable las detecciones de la categoría de más de **100 adultos por trampa**, representado en un 19% (**Figura 9**). El incremento en las categorías altas ocurrió principalmente en localidades de Entre Ríos. En este contexto, **Villa Hernandarias (Entre Ríos)** se destacó con **484 adultos por trampa** y **Concepción del Uruguay (Entre Ríos)** registró **338 adultos por trampa**.

Por otra parte, los valores promedio de captura de *D. maidis* en trampas instaladas en lotes de maíz se incrementaron, alcanzando niveles por encima de 70 adultos por trampa, valor superior al observado en los informes anteriores, obedeciendo a los altos registros en zonas puntuales como **Villa Hernandarias, Concepción del Uruguay, Colonia Celina, Parana, entre otras (Figura 10)**.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.





Figura 10. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región LITORAL, según datos de los informes 34°, 35° y 36° (presente informe).



La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Figura 11. Porcentaje de localidades del **LITORAL** según categoría correspondiente al estadio fenológico del cultivo: Vegetativo Temprano (Ve a V8), Vegetativo Tardío (V9 a VT) y Reproductivo (R1 a R6).

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región LITORAL

En enero de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en la localidad de Concepción del Uruguay (provincia de Entre Ríos), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de **Corn Stunt Spiroplasma (CSS)**, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región LITORAL.

Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
Concepción del Uruguay	Entre Ríos	Enero	Maíz cultivo	30	13%

Resumen Región Centro Norte




Figura 12. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías


La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 34° (01/01 al 16/01), 35° (17/01 al 31/01) y 36° (01/02 al 16/02).

Comentarios Región Centro Norte

En las 68 localidades relevadas las trampas se encuentran instaladas en el cultivo de maíz, de los cuales el 25 % corresponde a lotes que transitan etapas vegetativas iniciales (Figura 14). En esta región, el 88% de las localidades registró detecciones de *D. maidis* en las trampas, predominando la categoría de 5 a 20 adultos por trampa, que representó un 31% (**Figura 12**). Asimismo, comenzaron a observarse incrementos puntuales en las categorías intermedias y altas (51 a 100 y > 100 adultos por trampa). Las mayores capturas correspondieron a **Sebastián Elcano (Córdoba), con 950 adultos por trampa y Ceres (Santa Fe) con 442 adultos** de *D. maidis*. Estos registros determinaron un aumento del promedio de capturas en la región, con valores superiores a **64,97 adultos por trampa**, confirmando el escenario de incremento poblacional observado con respecto a los monitoreos anteriores (Figura 13).

Recordemos que en todas estas zonas donde coexisten maíces atravesando etapas reproductivas y vegetativas resulta fundamental el monitoreo y la detección temprana para realizar manejos adecuados.



La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Figura 13. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO NORTE, según datos de los informes 34°, 35° y 36° (presente informe).




Figura 14. Porcentaje de localidades del **CENTRO NORTE** según categoría correspondiente al estadio fenológico del cultivo: Vegetativo Temprano (Ve a V8), Vegetativo Tardío (V9 a VT) y Reproductivo (R1 a R6).

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región Centro Norte

En enero de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en las localidades de San Justo (provincia de Santa Fe) y la localidad de Marcos Juárez (Cordoba), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de **Corn Stunt Spiroplasma (CSS)**, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de Corn Stunt Spiroplasma (CSS). Región Centro Norte. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
San Justo	Santa Fe	Enero	Maíz cultivo	30	10%
Marcos Juárez	Córdoba	Enero	Maíz cultivo	30	20%

Resumen Región Centro Sur




Figura 15. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 34° (01/01 al 16/01), 35° (17/01 al 31/01) y 36° (01/02 al 16/02).

Comentarios Región Centro Sur

De las 105 localidades relevadas, el 40% (43 localidades) presentan cultivo de maíz. En este informe, el 86% no registró detecciones de *D. maidis*, resultado que se mantiene estable respecto del informe anterior y consolida un escenario de marcada estabilidad poblacional en la región. Sin embargo, las localidades con mayores capturas correspondieron a Zavalla (Santa Fe) y Marcos Juárez (Córdoba) con **34 y 29 capturas de adultos por trampas**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

respectivamente. En las localidades con cultivo de maíz, se registraron valores bajos de capturas de *D. maidis* (menos de **0,5 chicharritas/trampa**), observándose en esta región una baja proporción de maíces que se encuentran atravesando etapas vegetativas iniciales (Ve a V8), representando un 16% de las localidades con maíz (Figuras 16 y 17).




Figura 16. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO SUR, según datos de los informes 34°, 35° y 36° (**presente informe**).

36° Lectura (01/02 al 16/02) - Centro Sur (43 localidades)




Figura 17. Porcentaje de localidades del **CENTRO SUR** según categoría correspondiente al estadio fenológico del cultivo: Vegetativo Temprano (Ve a V8), Vegetativo Tardío (V9 a VT) y Reproductivo (R1 a R6).

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa 34° (01/01 al 16/01), 35° (17/01 al 31/01) y **36° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 16 de febrero de 2026.**

N° Loc.	Institución	Nombre de trampa	Localidad	34° Lectura	35° Lectura	36° Lectura
1	AGTSA	2025 MERCEDES UY - AGTSA	Mercedes	0	2	2
2	AGTSA	2025 ACEGUÁ UY - AGTSA	Peñarol	0		
3	AGTSA	2025 RINCON DEL PINO - AGTSA	Los Arenales			3
4	AGTSA	2025 NUEVA HELVECIA - AGTSA (SAN PEDRO)	Nueva Helvecia	0	0	4
5	AGTSA	2025 LAS ARMAS	Colonia	0	0	2
6	AGTSA	2025 CORRALITO - AGTSA	Palmitas	0	0	0
7	AGTSA	2025 Durazno - AGTSA	Durazno		1	0
8	AGTSA	2025 Young 2 - AGTSA	Young	1	12	16
9	AGTSA	2026 Young 1 - AGTSA	Young		13	

Comentarios Uruguay

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

En las siete localidades monitoreadas de la República Oriental del Uruguay se registró presencia de **D. maidis** en cinco de ellas. El valor más elevado se observó en la localidad de Young, donde se capturaron **16 adultos por trampa**, consolidándose nuevamente como un punto neurálgico, tal como se había destacado en el informe previo.

Esta situación, en línea con lo observado en el Litoral argentino, se enmarca en un contexto en el que los cultivos de maíz transitan estadios reproductivos avanzados. Esta condición fenológica constituye un factor explicativo clave de la dinámica poblacional registrada y refuerza el escenario de incremento en la incidencia del vector durante el período evaluado.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 34° (01/01 al 16/01), 35° (17/01 al 31/01) y **36° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 16 de febrero de 2026**. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				34° Lectura	35° Lectura	36° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	0	2	4
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	0	0	2
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	0	1	4
4	INTA	Jujuy	El Bananal	69	78	124
5	AAPPCE	Salta	Agua Sucia	6	6	16
6	AAPPCE	Salta	Rio Piedras	Perdida	5	12
7	AAPRESID	Salta	Rivadavia	6	sin datos	11
8	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	2	17	Sin datos
9	CREA	Salta	Antilla	1	1	3
10	CREA	Salta	Ballivián	Perdida	0	0
11	CREA	Salta	Ceibalito	0	16	Sin datos
12	CREA	Salta	Copo Quiles	7	4	Sin datos
13	CREA	Salta	El Bordo	2	sin datos	Sin datos
14	CREA	Salta	El Galpón	0	3	9
15	CREA	Salta	El Tunal	3	Perdida	Sin datos
16	CREA	Salta	Embarcación	Perdida	2	Sin datos
17	CREA	Salta	Gral Pizarro	0	0	11
18	CREA	Salta	Horcones	0	0	Sin datos
19	CREA	Salta	J V Gonzales	5	5	31
20	CREA	Salta	Las Lajitas T3	sin datos	5	Sin datos
21	CREA	Salta	Metan 1	sin datos	4	1
22	CREA	Salta	Metan 2	sin datos	7	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

23	CREA	Salta	Mollinedo	1	0	38
24	CREA	Salta	Mosconi	0	0	5
25	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	1	11	121
26	CREA	Salta	Pichanal	2	3	4
27	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	1	0	Perdida
28	CREA	Salta	Santo Domingo	0	3	44
29	CREA	Salta	Saravia	3	0	1
30	CREA	Salta	Tolloche	Perdida	0	10
31	CREA	Salta	Urundel	sin datos	2	Sin datos
32	INTA	Salta	Metán	0	11	20
33	AAPPCE	Tucumán	Tusquita	0	0	110
34	CREA	Tucumán	Alto Verde	122	214	177
35	CREA	Tucumán	Burruyacu	0	0	6
36	CREA	Tucumán	Chilca	Perdida	1	Sin datos
37	CREA	Tucumán	Garmendia	0	1	0
38	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	4	13	18
39	CREA	Tucumán	La Bajada	3	6	6
40	CREA	Tucumán	La Cocha 1	5	5	7
41	CREA	Tucumán	La Cruz	1	14	Sin datos
42	CREA	Tucumán	La Invernada	2	0	40
43	CREA	Tucumán	La Virginia	3	2	39
44	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	0	27	28
45	CREA	Tucumán	Las Cejas	16	5	14
46	CREA	Tucumán	Los Pereyra	0	1	1
47	CREA	Tucumán	Los Puestos	3	0	0
48	CREA	Tucumán	Piedrabuena	0	0	12
49	CREA	Tucumán	Rapelli	0	0	Sin datos
50	CREA	Tucumán	Río Colorado	1	1	Sin datos
51	CREA	Tucumán	Rumi Punco	7	4	4
52	CREA	Tucumán	San Agustín	7	4	93
53	CREA	Tucumán	Tacanas	0	2	11
54	CREA	Tucumán	Taco Ralo	10	38	13
55	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	148	50	152
56	CREA	Tucumán	Trancas	1	1	13
57	CREA	Tucumán	Viclos	1	2	19
58	INTA	Tucumán	Leales	0	Perdida	105
59	AAPPCE	Tucumán	Tala Pozo	16	20	15
60	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	0	0	4
61	CREA	Santiago del Estero	El Charco	5	Perdida	22
62	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	4	Perdida	Perdida
63	CREA	Santiago del Estero	Frias	0	5	7

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

64	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	1	0	Sin datos
65	CREA	Santiago del Estero	Pampa Pozo	1	1	Sin datos
66	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	0	1	Sin datos
67	CREA	Santiago del Estero	San Pedro de Guasayán	1	4	Sin datos
68	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	1	9	59
69	CREA	Santiago del Estero	Vinará	3	1	6
70	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	1	Perdida	7
71	CREA	Catamarca	El Abra	9	Perdida	399
72	CREA	Catamarca	Los Altos	65	322	1043
73	CREA	Catamarca	Frias	10	4	6

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 34° (01/01 al 16/01), 35° (17/01 al 31/01) y **36° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 16 de febrero de 2026**. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				34° Lectura	35° Lectura	36° Lectura
1	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	35	sin datos	10
2	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	8	26	4
3	AAPRESID	Chaco	Concepcion del Bermejo	7	12	Sin datos
4	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	25	Perdida	0
5	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	0	13	13
6	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	4	0	0
7	INTA	Chaco	Tres Isletas	12	26	21
8	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	7	2	10
9	INTA	Chaco	Las Breñas	28	12	19
10	INTA	Chaco	Juan José Castelli	35	3	65
11	INTA	Chaco	Sylvina	0	0	1
12	INTA	Chaco	Basail	5	2	8
13	CREA	Chaco	Bajo Hondo	14	sin datos	Sin datos
14	CREA	Chaco	Las Piedras	0	4	Sin datos
15	CREA	Chaco	San Bernardo	1	1	1
16	CREA	Chaco	La Montenegrina	2	1	0
17	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	17	49	Sin datos
18	CREA	Chaco	Palo blanco	9	30	Sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

19	CREA	Chaco	Pampa del Infierno	14	8	Sin datos
20	CREA	Chaco	Castelli	20	0	Sin datos
21	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	20	3	Sin datos
22	CREA	Chaco	Charata	sin datos	0	0
23	CREA	Chaco	Gancedo	sin datos	3	2
24	CREA	Chaco	Las Breñas	sin datos	4	0
25	INTA	Formosa	El colorado	2	0	3
26	INTA	Formosa	Comandante Fontana	155	17	134
27	CREA	Formosa	Perin	112	7	Sin datos
28	CREA	Formosa	Las Lomitas	Perdida	41	11
29	AAPPCE	Santa Fe	Villa Minetti	0	sin datos	3
30	AAPPCE	Santa Fe	El Guanagan	2	0	0
31	AAPPCE	Santa Fe	Santa Margarita	0	4	8
32	AAPRESID	Santa Fe	Villa Minetti	0	7	42
33	CREA	Santa Fe	Emilia	5	4	12
34	INTA	Santa Fe	Reconquista	62	44	30
35	INTA	Santa Fe	Calchaquí	33	310	264
36	INTA	Santa Fe	Logroño	0	7	28
37	INTA	Santa Fe	San javier	1	0	168
38	INTA	Santa Fe	La sarita	33	20	0
39	CREA	Santa Fe	La Pelada	0	9	42
40	CREA	Santa Fe	Ambrosetti	10	15	32
41	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	7	6	2
42	CREA	Santa Fe	Ramayón	4	5	49
43	CREA	Santa Fe	Margarita	2	3	103
44	CREA	Santa Fe	Vera y Pintado	2	3	17
45	CREA	Santa Fe	Colonia La María	15	115	799
46	CREA	Santa Fe	La Osca	5	5	5
47	CREA	Santa Fe	Malabrigo	7	35	23
48	CREA	Santa Fe	Soledad	0	0	12
49	CREA	Santa Fe	Colonia Esther	2	Perdida	157
50	CREA	Santa Fe	Arroyo Ceibal	sin datos	1	6
51	CREA	Santa Fe	Hersilia	7	3	14
52	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	5	1	15
53	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	0	3	44
54	AAPPCE	Santiago del Estero	Col. Mackinlay	31	81	Sin datos
55	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	2	20	Sin datos
56	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	5	107	201
57	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	Perdida	4	255
58	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	Perdida	7	14
59	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	0	Perdida	16

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

60	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	0	1	7
61	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	2	2	10
62	CREA	Santiago del Estero	Weisburd	sin datos	0	Sin datos
63	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	0	Perdida	22
64	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	3	3	3
65	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	3	5	13
66	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	1	3	4
67	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	10	1	107
68	INTA	Santiago del Estero	Añatuya	50	30	140
69	INTA	Santiago del Estero	Malbran	0	1	4
70	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	10	42	48
71	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	24	133	36
72	CREA	Santiago del Estero	Puna	sin datos	12	37
73	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	61	68	75
74	CREA	Santiago del Estero	Lilo Viejo	25	0	105
75	CREA	Santiago del Estero	La Rosita	sin datos	2	2
76	CREA	Santiago del Estero	Girardet	sin datos	2	4
77	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	sin datos	1	5
78	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	4	11	57
79	CREA	Santiago del Estero	Pozo de toba	sin datos	4	Sin datos
80	AAPRESID	Santiago del Estero	Otumpa	4	sin datos	Sin datos
81	AAPRESID	Santiago del Estero	Avia Terai	1	11	Sin datos
82	AAPRESID	Santiago del Estero	Ahí Veremos	0	8	44

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 34° (01/01 al 16/01), 35° (17/01 al 31/01) y **36° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 16 de febrero de 2026**. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				34° Lectura	35° Lectura	36° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	131	266	15
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	0	Perdida	17
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	0	36	55
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	0	2	2
5	INTA	Corrientes	Sauce	19	sin datos	27
6	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	Perdida	Perdida	28
7	INTA	Corrientes	Mercedes	27	165	16

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

8	INTA	Corrientes	Virasoro	5	12	5
9	INTA	Corrientes	Goya	5	10	8
10	INTA	Corrientes	Curuzú	24	642	265
11	INTA	Corrientes	Esquina	0	0	12
12	INTA	Corrientes	Monte Caseros	0	3	4
13	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	1	4	11
14	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	0	0	14
15	AAPPCE	Entre Ríos	San Salvador	55	173	208
16	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	1	0	3
17	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	2	1	2
18	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	2	1	312
19	AAPRESID	Entre Ríos	Gualedguay	0	0	0
20	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	3	4	15
21	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	1	1	484
22	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	0	2	6
23	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	0	0	0
24	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	8	39	6
25	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	Perdida	18	Sin datos
26	CREA	Entre Ríos	La Paz	39	Sin datos	59
27	CREA	Entre Ríos	Feliciano	29	16	9
28	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	0	0	1
29	CREA	Entre Ríos	Gualedguaychu	0	Sin datos	0
30	CREA	Entre Ríos	Gualedguay	0	Sin datos	Sin datos
31	CREA	Entre Ríos	Victoria	4	2	6
32	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	9	29	22
33	INTA	Entre Ríos	La Paz	3	28	41
34	INTA	Entre Ríos	Nogoya	0	sin datos	3
35	INTA	Entre Ríos	Urdinarrain	0	0	0
36	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	437	297	338
37	INTA	Entre Ríos	Diamante	0	2	10
38	INTA	Entre Ríos	Gualedguay	0	3	Sin datos
39	INTA	Entre Ríos	Parana	63	88	244
40	AAPPCE	Entre Ríos	Villa Mantero	12	120	140

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 34° (01/01 al 16/01), 35° (17/01 al 31/01) y 36° lectura

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

correspondiente al periodo comprendido del 01 al 16 de febrero de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				34° Lectura	35° Lectura	36° Lectura
1	AAPPCE	Córdoba	Corralito	0	1	0
2	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	0	0	4
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	2	85	69
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	55	22	166
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	1	5	7
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	0	2	5
7	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	0	2	3
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	0	0	3
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	0	0
10	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	4	8	11
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	0	0	2
12	AAPRESID	Córdoba	Devoto	0	0	6
13	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	0	0	Sin datos
14	AAPRESID	Córdoba	Eufrasio Loza	0	1	65
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	0	0	0
16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	0	1	2
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	2	19	26
18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	0	4	2
19	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	0	0	Sin datos
20	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	0	25	26
21	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	0	0	0
22	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	0	0	1
23	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	0	1	Sin datos
24	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	8	28	91
25	CREA	Córdoba	Colonia Tirolesa	2	16	11
26	AAPRESID	Córdoba	Hernando	2	2	Sin datos
27	CREA	Córdoba	Piquillín	13	8	14
28	CREA	Córdoba	Las Chilcas	Perdida	5	10
29	CREA	Córdoba	Sebastián Elcano	63	43	950
30	CREA	Córdoba	El Tío	5	15	148
31	CREA	Córdoba	Las Astillas	1	3	21
32	CREA	Córdoba	Tala Norte	4	38	27
33	CREA	Córdoba	Mi Granja	0	0	Sin datos
34	CREA	Córdoba	Sacanta	3	3	7
35	CREA	Córdoba	Sinsacate	2	8	18

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

36	INTA	Córdoba	Manfredi	1	1	12
37	INTA	Córdoba	Brinkmann	0	3	18
38	voluntarias	Córdoba	Luxardo	0	0	0
39	voluntarias	Córdoba	Colonia Marina	0	0	3
40	voluntarias	Córdoba	Villa Fontana	0	4	5
41	voluntarias	Córdoba	Loma Del Trozo	0	5	10
42	AAPRESID	San Luis	La Toma	0	0	0
43	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	5	76	63
44	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	0	4	11
45	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	3	4	4
46	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	0	0	1
47	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	0	2	6
48	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	60	43	91
49	AAPPCE	Santa Fe	Susana	sin datos	3	Sin datos
50	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	146	244	276
51	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	0	0	0
52	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	1	0	Perdida
53	AAPPCE	Santa Fe	Vila	34	42	66
54	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	0	Sin datos	Sin datos
55	AAPPCE	Santa Fe	López	0	15	19
56	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	0	6	18
57	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	4	6	48
58	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	0	96	324
59	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	0	6	70
60	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	4	4	Sin datos
61	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	0	2	4
62	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	4	36	192
63	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	0	0	Sin datos
64	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	2	1	2
65	CREA	Santa Fe	Ataliva	3	3	14
66	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	1	1	2
67	CREA	Santa Fe	Crispi	0	78	25
68	CREA	Santa Fe	Esperanza	24	132	9
69	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	1	11	14
70	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	0	17	33
71	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	0	6	Sin datos
72	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	1	0	7
73	CREA	Santa Fe	San Fabián	0	0	6
74	CREA	Santa Fe	San Martín de las Escobas	0	0	Sin datos
75	INTA	Santa Fe	Centeno	0	5	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

76	AAPRESID	Santa Fe	Cayasto	1	4	3
77	INTA	Santa Fe	Rafaela	2	117	248
78	INTA	Santa Fe	Ceres	4	86	442
79	INTA	Santa Fe	San Justo	2	394	196
80	voluntarias	Santa Fe	Angelica	0	0	2
81	voluntarias	Santa Fe	Fraga	0	1	9
82	AAPRESID	Santa Fe	San Bernardo	21	21	35

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 34° (01/01 al 16/01), 35° (17/01 al 31/01) y 36° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 16 de febrero de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				34° Lectura	35 ° Lectura	36 °Lectura
1	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	0	0	0
2	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
3	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	0	0
4	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
5	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
6	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
7	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	0
8	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	0	1	1
9	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	2	0	0
10	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	0	0
11	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
12	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0
13	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
14	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	0	0	0
15	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	0	0
16	AAPPCE	Buenos Aires	Rafael Obligado	0	0	0
17	AAPPCE	Buenos Aires	Florentino Ameghino	0	0	0
18	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	0	0	0
19	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
20	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	0	2	0
21	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	sin datos	0	0
22	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

23	AAPPCE	Buenos Aires	Pedro Gamen	0	0	0
24	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	0	0	0
25	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
26	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
27	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	0
28	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	0	0
29	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
30	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	0	0
31	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	0	2
32	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	0	0	0
33	AAPRESID	Buenos Aires	Chillar	0	Sin datos	0
34	AAPRESID	Buenos Aires	Puan	0	0	0
35	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	0	0
36	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	0	0	0
37	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	0	0	0
38	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
39	CREA	Buenos Aires	América	0	0	0
40	CREA	Buenos Aires	Casey	0	0	Sin datos
41	CREA	Buenos Aires	Guanaco	0	0	0
42	CREA	Buenos Aires	Henderson	0	0	0
43	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	0	0	0
44	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	0	0	0
45	CREA	Buenos Aires	Orense	0	0	Sin datos
46	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0
47	CREA	Buenos Aires	San Pedro	0	0	2
48	CREA	Buenos Aires	Alberdi	0	0	0
49	CREA	Buenos Aires	Junín	0	0	0
50	CREA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	1
51	CREA	Buenos Aires	Catriló	0	0	0
52	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	0	0	0
53	INTA	Buenos Aires	Pergamino	1	0	0
54	INTA	Buenos Aires	Conesa	0	0	0
55	INTA	Buenos Aires	San antonio de Areco	0	0	0
56	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
57	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	0	0	0
58	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	0	0	0
59	INTA	Buenos Aires	Bolivar	0	0	0
60	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	0
61	INTA	Buenos Aires	Balcarce	0	0	0
62	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

63	AAPPCE	Córdoba	General Roca	0	0	6
64	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	0	0	0
65	AAPPCE	Córdoba	La playosa	0	1	3
66	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	0	4	0
67	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	0	0	0
68	AAPPCE	Córdoba	Villa María	0	0	0
69	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	0	0	0
70	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	0
71	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	0	0	0
72	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	0	0	0
73	AAPRESID	Córdoba	Lecueder	0	0	Sin datos
74	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	0	0	0
75	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	0
76	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	1	0	Perdida
77	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	0	0	0
78	CREA	Córdoba	General Levalle	sin datos	0	Sin datos
79	CREA	Córdoba	La Carlota	0	0	0
80	CREA	Córdoba	Melo	0	0	0
81	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	0	0	0
82	CREA	Córdoba	Villa valeria	0	0	0
83	CREA	Córdoba	Monte Buey	0	5	Sin datos
84	INTA	Córdoba	Marcos Juarez 2	0	4	29
85	CREA	Córdoba	Ballesteros	0	0	2
86	AAPPCE	Córdoba	Achiras	0	0	0
87	AAPPCE	La Pampa	Macachín	0	0	0
88	CREA	La Pampa	General Pico	0	0	0
89	CREA	La Pampa	Quemú Quemú	0	0	0
90	CREA	La Pampa	Santa Rosa	0	0	Perdida
91	INTA	La Pampa	Anguil 1	0	0	0
92	AAPPCE	La Pampa	Winifreda	0	0	0
93	AAPPCE	La Pampa	Ing. Luiggi	0	0	0
94	AAPRESID	San Luís	La Angelina	0	0	0
95	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	0	0	Perdida
96	CREA	San Luís	Buena Esperanza	0	0	0
97	CREA	San Luís	Juan Jorba	0	0	Sin datos
98	INTA	San Luís	San Luis 1	0	0	Perdida
99	INTA	San Luís	Quines	0	0	1
100	CREA	San Luís	Naschel	0	0	Sin datos
101	AAPPCE	Santa Fe	Álvarez	3	2	3
102	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	0	1	0
103	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

104	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	4	2	4
105	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	3	5	4
106	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	0	0	0
107	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	1	0	0
108	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	0	0	0
109	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	0	0	0
110	AAPPCE	Santa Fe	Villada	0	0	0
111	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	0	1	0
112	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	0	0	0
113	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	1	12	7
114	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	0	0	Sin datos
115	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	0	Sin datos	Sin datos
116	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	0	14	34
117	AAPRESID	Santa Fe	Pueblo Uranga	0	0	Sin datos
118	CREA	Santa Fe	Clucellas	0	0	9
119	INTA	Santa Fe	Pujato	0	0	0
120	INTA	Santa Fe	Cañada de Gómez	0	4	2

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (**AAPPCE**), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (**AAPRESID**), Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (**CASAFE**), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (**CONICET**), Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (**CREA**), Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (**EEAOC**), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (**INTA**), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (**MAIZAR**), y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (**SENASA**).

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas.** Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
1 a 4 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
5 a 20 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
21 a 50 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
51 a 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
> 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.