



RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 37

5 de marzo de 2026



AAPPCE




Aapresid



5 DE MARZO DE 2026

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis



Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)

**INFORME N°37
17 de febrero al 01 de marzo de 2026.**

En este trigésimo séptimo informe se relevaron en total 333 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (60 localidades), NEA (60 localidades), Litoral (38 localidades), Centro Norte (71 localidades) y Centro Sur (104 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 7 localidades de Uruguay.

Para cada región se evaluó cómo evolucionaron las capturas utilizando dos enfoques: un gráfico de torta para representar el resultado de todas las trampas y un gráfico de barras para mostrar únicamente las trampas instaladas en lotes de maíz en los últimos tres relevamientos (informes 35, 36 y 37). Asimismo, en el presente informe se detalla, para cada región, el porcentaje de localidades según la categoría correspondiente a la fenología del maíz.

Adicionalmente, se presentan datos sobre el porcentaje de individuos portadores de *Corn stunt Spiroplasma* (CSS) en distintas localidades monitoreadas de las regiones del NEA, Litoral y Centro Norte. En general, los resultados indicaron bajos niveles de portación del patógeno en todas las localidades analizadas, con excepción de Colonia Alpina (NEA), donde se registró un valor del 33%, nivel superior al observado en el resto de los sitios evaluados.

En el NOA, el 100% de las trampas se encuentran instaladas en maíz. En esta región, la población de *D. maidis* continúa mostrando una fase de incremento, coincidiendo con un predominio de localidades que presentan maíces atravesando estadios fenológicos avanzados (> V9). Asimismo, en el 43% de las localidades se registraron niveles de captura superiores a 50 adultos por trampa (Figura 3).

En el NEA, el 100% de las trampas relevadas se encuentran instaladas en cultivos de maíz y, en la presente evaluación, el 69% de las localidades monitoreadas presentan lotes en estadios fenológicos avanzados (> V9). En este contexto fenológico, la población de *D. maidis* se encuentra transitando una fase de incremento poblacional, con una dinámica similar a la observada en la región del NOA. En el 50 % de las localidades evaluadas se registraron capturas superiores a 50 adultos por trampa (Figura 6).

En la región del Litoral, el 86% de las trampas se encuentran instaladas en el cultivo de maíz y un 71% de las localidades monitoreadas registró capturas. En esta región el 40% de las localidades monitoreadas presentó niveles bajos de captura, con valores comprendidos entre 1 y 20 adultos por trampa (Figura 9). La categoría más elevada de capturas (> 100 adultos por trampa), se mantiene estable con respecto a monitoreos anteriores (18%), concentrándose principalmente en localidades de Entre Ríos y asociada, en su mayoría, a lotes de maíz tardío (Figura 9).

En la región Centro-Norte, el 94% de las localidades relevadas cuentan con trampas instaladas en el cultivo de maíz. En esta región continúan registrándose incrementos poblacionales del vector. En el presente informe, el 90 % de las localidades monitoreadas presentó detecciones, con predominio de capturas correspondiente a la categoría de 5 a 20 adultos por trampa (Figura 12).

En el Centro-Sur, donde el 97% de las trampas están instaladas en lotes con maíz, observándose ligeros incrementos de la dinámica poblacional, predominando aún las localidades en donde no registró detecciones del vector (80%), como se detalla en la Figura 15.

Resulta fundamental sostener el monitoreo de adultos de *D. maidis* durante todo el año, ya que constituye una herramienta clave para anticipar cambios en su dinámica poblacional, proceso que comenzó a evidenciarse en las últimas evaluaciones en todas las zonas agroecológicas bajo estudio. En este contexto, es imprescindible mantener monitoreos activos y sistemáticos, aun cuando la mayor parte de los maíces tardíos se encuentre actualmente en estadios vegetativos avanzados. Si bien estos lotes presentan una menor susceptibilidad al patosistema, la información generada en esta etapa resulta de gran relevancia para comprender la dinámica poblacional del vector a escala regional. No obstante, un porcentaje reducido de cultivos aún transita períodos de susceptibilidad a la infección por los patógenos asociados; por lo tanto, la detección oportuna del vector durante estas fases sensibles resulta determinante para reducir el riesgo sanitario y sostener la eficacia de las estrategias de manejo implementadas.

El uso de trampas cromáticas debe acompañarse con inspecciones visuales en el cultivo implantado y con muestreos mediante red entomológica, la combinación de estas herramientas no solo mejora la detección, sino que también permite caracterizar con mayor precisión la dinámica poblacional del vector a lo largo del año.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, en el que el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector que transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 37° lectura (17/02 al 01/03).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el décimo tercero al trigésimo séptimo informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 35° (17/01 al 31/01), 36° (01/02 al 16/02) y 37° (17/02 al 01/03).

Comentarios Región NOA

Se relevaron 60 localidades, de las cuales el 85% registró presencia del vector. Las categorías más frecuentes correspondieron a capturas de **5 a 20**, **51 a 100** y **> 100 adultos por trampa**, que represento el **25%**, **20%** y **23%** de los registros respectivamente (**Figura 3**). En esta región, el 100% de las trampas se encuentran instaladas sobre cultivo de maíz (**Figura 4 y 5**). En el presente relevamiento se registra un incremento en las capturas promedio de chicharrita por trampa, en comparación con el monitoreo previo, pasando de 64,61 a 105,62 adultos por trampa (**Figura 4**). Este aumento se registró en coincidencia con un predominio de lotes de maíz en fases fenológicas avanzadas: **vegetativos tardíos (37 %)** y **reproductivos (34 %)**. Las localidades de **Termas de Río Hondo (Santiago del Estero)** y **Los Altos (Catamarca)**, se destacaron por registrar las mayores capturas, con **1200** y **890 adultos por trampa**, respectivamente.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 4. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NOA, según datos de los informes 35°, 36° y 37° (presente informe).




Figura 5. Porcentaje de localidades del **NOA** según categoría correspondiente al estadio fenológico del cultivo: Vegetativo Temprano (Ve a V8), Vegetativo Tardío (V9 a VT) y Reproductivo (R1 a R6).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)




Figura 6. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 35° (17/01 al 31/01), 36° (01/02 al 16/02) y 37° (17/02 al 01/03).

Comentarios Región NEA

Del relevamiento efectuado en 60 localidades, en 56 de ellas (93%) se registraron detecciones del vector. Asimismo, las categorías de captura más representativas fueron la de más de 50 adultos por trampa con un 50% (**Figura 6**).

Cabe destacar que el 100% de las trampas incluidas en este relevamiento están sobre el cultivo de maíz de las cuales el 31% corresponde a maíces tardíos recientemente implantados (**Figura 8**). El valor promedio de captura de *D. maidis* en lotes con maíz fue de **97,00 por trampa**, nivel superior al registrado en el monitoreo anterior (**Figura 7**). Las localidades con mayores niveles de captura —en la provincia de Santiago del Estero— correspondieron a lotes en estadios vegetativos avanzados, destacándose entre ellas a **Roversi y Los Juries** con los valores más elevados (**606 y 593 adultos por trampa**), seguida por **Puna**, con **350 adultos por trampa** **Figura 7 y 8**.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 7. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NEA, según datos de los informes 35°, 36° y 37° (presente informe).




Figura 8. Porcentaje de localidades del **NEA** según categoría correspondiente al estadio fenológico del cultivo: Vegetativo Temprano (Ve a V8), Vegetativo Tardío (V9 a VT) y Reproductivo (R1 a R6).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región NEA

En febrero de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en la localidad de Otumpa, Quimilí, Pozo del Toba, Colonia Alpina, Caburé y Roversi (provincia de Santiago del Estero) y Charata, Las Breñas y Gancedo (provincia de Chaco), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS), mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región NEA. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
Otumpa	Santiago del Estero	febrero	Maíz cultivo	30	0%
Quimilí	Santiago del Estero	febrero	Maíz cultivo	30	3%
Pozo del Toba	Santiago del Estero	febrero	Maíz cultivo	28	7%
Colonia Alpina	Santiago del Estero	febrero	Maíz cultivo	30	33%
Caburé	Santiago del Estero	febrero	Maíz cultivo	28	7%
Roversi	Santiago del Estero	febrero	Maíz cultivo	26	7%
Charata	Chaco	febrero	Maíz cultivo	30	0%
Las Breñas	Chaco	febrero	Maíz cultivo	30	10%
Gancedo	Chaco	febrero	Maíz cultivo	30	10%

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Litoral




Figura 9. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 35° (17/01 al 31/01), 36° (01/02 al 16/02) y 37° (17/02 al 01/03).

Comentarios Región Litoral

En la región del Litoral se relevaron 38 localidades, de las cuales el 86% están instaladas sobre cultivos de maíz que actualmente transitan estadios vegetativos tardíos y reproductivos avanzados, lo que refleja la predominancia de siembras tempranas en la región. En el 71% de las localidades se registró detecciones de *D. maidis*, dentro de las categorías con capturas predominaron **1 a 20 adultos por trampa con un 40%**, como se detalla en la **Figura 9**. En este monitoreo se mantuvo estable las detecciones de la categoría de más de **100 adultos por trampa**, representado un 18% (**Figura 9**). El incremento en las categorías altas ocurrió principalmente en localidades de Entre Ríos. En este contexto, localidades de Entre Ríos como **Villa Mantero** se destacó con **1530 adultos por trampa** y **Colonia Celina** registró **892 adultos por trampa**.

Por otra parte, los valores promedio de captura de *D. maidis* en trampas instaladas en lotes de maíz ascendieron a 151,35 adultos por trampa, superando el observado en los informes anteriores, obedeciendo a los altos registros en zonas puntuales como **Villa Mantero, Colonia Celina, Paraná, Santa Elena, entre otras (Figura 10 y 11)**.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 10. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región LITORAL, según datos de los informes 35°, 36° y 37° (presente informe).




Figura 11. Porcentaje de localidades del **LITORAL** según categoría correspondiente al estadio fenológico del cultivo: Vegetativo Temprano (Ve a V8), Vegetativo Tardío (V9 a VT) y Reproductivo (R1 a R6).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región LITORAL

En febrero de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en la localidad de Alcaraz Norte (provincia de Entre Ríos), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de **Corn Stunt Spiroplasma (CSS)**, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región LITORAL.

Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
Alcaraz Norte	Entre Ríos	febrero	Maíz cultivado	30	3%

Resumen Región Centro Norte




Figura 12. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 35° (17/01 al 31/01), 36° (01/02 al 16/02) y 37° (17/02 al 01/03).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Región Centro Norte

En las 71 localidades relevadas, el 94% de las trampas se encuentran instaladas en cultivos de maíz ya implantados, de los cuales sólo el 9% corresponde a lotes que transitan etapas vegetativas iniciales (Figura 14). En esta región, el 90% de las localidades registró detecciones de *D. maidis* en las trampas, predominando la categoría de 5 a 20 adultos por trampa, que representó el 25% del total de localidades monitoreadas (**Figura 12**). Las mayores capturas correspondieron a **Sebastián Elcano (Córdoba), con 1387 adultos por trampa y San Jerónimo Norte (Santa Fe) con 903 adultos** de *D. maidis*. Estos registros se fueron el motivo que ocasionaron un aumento del promedio regional, que se ubicó en valores superiores a **105,21 adultos por trampa**, confirmando el escenario de incremento poblacional observado (Figura 13 y 14).




Figura 13. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO NORTE, según datos de los informes 35°, 36° y 37° (presente informe).




Figura 14. Porcentaje de localidades del **CENTRO NORTE** según categoría correspondiente al estadio fenológico del cultivo: Vegetativo Temprano (Ve a V8), Vegetativo Tardío (V9 a VT) y Reproductivo (R1 a R6).

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región Centro Norte

En febrero de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en las localidades de El Tío, Tala Norte, Sebastián Elcano y Mortero (provincia de Córdoba) y la localidad de Villa Trinidad, San Guillermo y Suardi (Santa Fe), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de **Corn Stunt Spiroplasma (CSS)**, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de Corn Stunt Spiroplasma (CSS). Región Centro Norte. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
El Tío	Córdoba	febrero	Maíz cultivo	30	7%
Tala norte	Córdoba	febrero	Maíz cultivo	30	3%
Sebastián Elcano	Cordoba	febrero	Maíz cultivo	30	7%
Mortero	Cordoba	febrero	Maíz cultivo	30	7%
Villa Trinidad	Santa Fe	febrero	Maíz cultivo	30	3%
San Guillermo	Santa Fe	febrero	Maíz cultivo	30	10%
Suardi	Santa Fe	febrero	Maíz cultivo	30	0%

Aclaración: En el informe técnico anterior (N°36) se consignó erróneamente la localidad Marcos Juárez (Córdoba). La localidad correcta correspondiente al sitio de evaluación fue **Juárez Celman (Córdoba)** con un 20% de portación de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS).

Resumen Región Centro Sur




Figura 15. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 35° (17/01 al 31/01), 36° (01/02 al 16/02) y 37° (17/02 al 01/03).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Región Centro Sur

De las 104 localidades relevadas, el 97% presentan cultivo de maíz. En este informe, el 80% no registró detecciones de *D. maidis*, observándose un ligero aumento poblacional en la región. Las localidades con mayores capturas correspondieron a **Marcos Juárez (Córdoba)** y **Pergamino (Buenos Aires)** con **58 y 21 capturas de adultos por trampas** respectivamente. En las localidades con cultivo de maíz, se registraron valores bajos de capturas de *D. maidis* alrededor de **1,5 chicharritas/trampa**, observándose en esta región tan solo un 5% de las localidades con maíces atravesando etapas vegetativas iniciales (Figuras 16 y 17).




Figura 16. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO SUR, según datos de los informes 35°, 36° y 37° (**presente informe**).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 17. Porcentaje de localidades del **CENTRO SUR** según categoría correspondiente al estado fenológico del cultivo: Vegetativo Temprano (Ve a V8), Vegetativo Tardío (V9 a VT) y Reproductivo (R1 a R6).

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa 35° (17/01 al 31/01), 35° (01/02 al 16/02) y **37° lectura correspondiente al periodo comprendido del 16 de febrero al 01 de marzo de 2026.**

N° Loc.	Institución	Nombre de trampa	Localidad	35° Lectura	36° Lectura	37° Lectura
1	AGTSA	2025 MERCEDES UY - AGTSA	Mercedes	0	2	6
2	AGTSA	2025 ACEGUÁ UY - AGTSA	Peñarol	0		
3	AGTSA	2025 RINCON DEL PINO - AGTSA	Los Arenales		3	6
4	AGTSA	2025 NUEVA HELVECIA - AGTSA (SAN PEDRO)	Nueva Helvecia	0	0	18
5	AGTSA	2025 LAS ARMAS	Colonia	0	0	3
6	AGTSA	2025 CORRALITO - AGTSA	Palmitas	0	0	4
7	AGTSA	2025 Durazno - AGTSA	Durazno		1	52
8	AGTSA	2025 Young 2 - AGTSA	Young	1	12	
9	AGTSA	2026 Young 1 - AGTSA	Young		13	237

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Uruguay

En las siete localidades monitoreadas de la República Oriental del Uruguay se registró la presencia de *D. maidis*. En particular, en las localidades de Young y Durazno se capturaron 237 y 52 adultos por trampa, respectivamente. El valor registrado en Young constituye, hasta el momento, la captura más elevada reportada en el país. Este registro coincide temporalmente con los incrementos poblacionales observados en la región del Litoral argentino.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 35° (17/01 al 31/01), 36° (01/02 al 16/02) y 37° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 de febrero al 01 de marzo de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				35° Lectura	36° Lectura	37° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	2	4	8
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	0	2	6
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	1	4	9
4	INTA	Jujuy	El Bananal	78	124	60
5	AAPPCE	Salta	Agua Sucia	6	16	0
6	AAPPCE	Salta	Rio Piedras	5	12	4
7	AAPRESID	Salta	Rivadavia	sin datos	11	0
8	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	17	Sin datos	43
9	CREA	Salta	Antilla	1	3	17
10	CREA	Salta	Ballivián	0	Sin datos	0
11	CREA	Salta	Ceibalito	16	Sin datos	Perdida
12	CREA	Salta	Copo Quiles	4	Sin datos	sin datos
13	CREA	Salta	El Galpón	3	9	146
14	CREA	Salta	El Tunal	Perdida	Sin datos	sin datos
15	CREA	Salta	Embarcación	2	Sin datos	0
16	CREA	Salta	Gral Pizarro	0	Sin datos	5
17	CREA	Salta	Horcones	0	0	0
18	CREA	Salta	J V Gonzales	5	31	83
19	CREA	Salta	Las Lajitas T3	5	Sin datos	3
20	CREA	Salta	Metan 1	4	1	1
21	CREA	Salta	Metan 2	7	0	2
22	CREA	Salta	Mollinedo	0	38	Perdida
23	CREA	Salta	Mosconi	0	5	12
24	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	11	121	Perdida

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

25	CREA	Salta	Pichanal	3	Sin datos	0
26	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	0	Perdida	240
27	CREA	Salta	Santo Domingo	3	44	159
28	CREA	Salta	Saravia	0	1	16
29	CREA	Salta	Tolloche	0	10	0
30	CREA	Salta	Urundel	2	4	5
31	INTA	Salta	Metán	11	20	119
32	AAPPCE	Tucumán	Tusquita	0	110	21
33	CREA	Tucumán	Alto Verde	214	177	81
34	CREA	Tucumán	Burruyacu	0	6	52
35	CREA	Tucumán	Chilca	1	Sin datos	sin datos
36	CREA	Tucumán	Garmendia	1	0	0
37	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	13	18	85
38	CREA	Tucumán	La Bajada	6	6	11
39	CREA	Tucumán	La Cocha 1	5	7	Perdida
40	CREA	Tucumán	La Cruz	14	12	231
41	CREA	Tucumán	La Invernada	0	40	97
42	CREA	Tucumán	La Virginia	2	39	560
43	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	27	28	158
44	CREA	Tucumán	Las Cejas	5	14	26
45	CREA	Tucumán	Los Pereyra	1	1	10
46	CREA	Tucumán	Los Puestos	0	0	15
47	CREA	Tucumán	Piedrabuena	0	12	124
48	CREA	Tucumán	Rapelli	0	Sin datos	92
49	CREA	Tucumán	Río Colorado	1	2	4
50	CREA	Tucumán	Rumi Punco	4	4	31
51	CREA	Tucumán	San Agustín	4	93	98
52	CREA	Tucumán	Tacanas	2	11	60
53	CREA	Tucumán	Taco Ralo	38	13	69
54	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	50	152	245
55	CREA	Tucumán	Trancas	1	0	0
56	CREA	Tucumán	Viclos	2	19	sin datos
57	INTA	Tucumán	Leales	Perdida	105	273
58	AAPPCE	Tucumán	Tala Pozo	20	15	15
59	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	0	4	7
60	CREA	Santiago del Estero	El Charco	Perdida	22	16
61	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	Perdida	Perdida	Perdida
62	CREA	Santiago del Estero	Frias	5	7	17
63	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	0	Sin datos	144
64	CREA	Santiago del Estero	Pampa Pozo	1	Sin datos	sin datos
65	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	1	Sin datos	88

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

66	CREA	Santiago del Estero	San Pedro de Guasayán	4	Sin datos	sin datos
67	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	9	59	1200
68	CREA	Santiago del Estero	Vinará	1	6	sin datos
69	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	Perdida	7	33
70	CREA	Catamarca	El Abra	Perdida	399	377
71	CREA	Catamarca	Los Altos	322	1043	890
72	CREA	Catamarca	Frias	4	6	58

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 35° (17/01 al 31/01), 36° (01/02 al 16/02) y **37° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 de febrero al 01 de marzo de 2026**. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				35° Lectura	36° Lectura	37° Lectura
1	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	sin datos	10	13
2	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	26	4	sin datos
3	AAPRESID	Chaco	Concepcion del Bermejo	12	Sin datos	17
4	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	Perdida	0	1
5	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	13	13	32
6	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	0	0	4
7	INTA	Chaco	Tres Isletas	26	21	10
8	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	2	10	7
9	INTA	Chaco	Las Breñas	12	19	72
10	INTA	Chaco	Juan José Castelli	3	65	6
11	INTA	Chaco	Sylvina	0	1	3
12	INTA	Chaco	Basail	2	8	5
13	CREA	Santa Fe	La María	115	799	277
14	CREA	Santa Fe	Margarita	3	103	53
15	CREA	Santa Fe	Ramayón	5	49	26
16	CREA	Santa Fe	Soledad	0	12	Perdida
17	CREA	Santa Fe	Hersilia	3	14	6
18	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	6	2	31
19	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	3	3	89
20	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	Perdida	22	15

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

21	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	2	10	124
22	CREA	Santa Fe	Vera y Pintado	3	17	35
23	CREA	Santa Fe	La Osca	5	5	25
24	CREA	Santa Fe	Malabrigo	35	23	52
25	INTA	Formosa	El colorado	0	3	0
26	INTA	Formosa	Comandante Fontana	17	134	55
27	CREA	Santiago del Estero	Pozo de toba	4	Sin datos	87
28	CREA	Santa Fe	Arroyo Ceibal	1	6	87
29	AAPPCE	Santa Fe	Villa Minetti	sin datos	3	118
30	AAPPCE	Santa Fe	El Guanagan	0	0	0
31	AAPPCE	Santa Fe	Santa Margarita	4	8	128
32	AAPRESID	Santa Fe	Villa Minetti	7	42	45
33	CREA	Santiago del Estero	Weisburd	0	Sin datos	sin datos
34	INTA	Santa Fe	Reconquista	44	30	218
35	INTA	Santa Fe	Calchaquí	310	264	318
36	INTA	Santa Fe	Logroño	7	28	117
37	INTA	Santa Fe	San javier	0	168	79
38	INTA	Santa Fe	La sarita	20	0	14
39	CREA	Santa Fe	Emilia	4	12	sin datos
40	CREA	Santa Fe	Ambrosetti	15	32	21
41	CREA	Santa Fe	La Pelada	9	42	6
42	CREA	Chaco	San Bernardo	1	Sin datos	Perdida
43	CREA	Santa Fe	Colonia Esther	Perdida	157	199
44	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	133	36	59
45	CREA	Chaco	La Montenegrina	1	0	0
46	CREA	Santiago del Estero	Puna	12	37	350
47	CREA	Formosa	Perin	7	Sin datos	2
48	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	68	75	62
49	CREA	Santiago del Estero	Lilo Viejo	0	105	sin datos
50	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	49	Sin datos	sin datos
51	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	1	15	68
52	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	3	44	144
53	AAPPCE	Santiago del Estero	Col. Mackinlay	81	Sin datos	148
54	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	20	Sin datos	72
55	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	107	201	593
56	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	4	255	606
57	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	7	14	276
58	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	Perdida	16	20
59	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	1	7	sin datos
60	CREA	Chaco	Palo blanco	30	Sin datos	sin datos
61	CREA	Chaco	Pampa del Infierno	8	Sin datos	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

62	CREA	Chaco	Castelli	0	Sin datos	sin datos
63	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	3	Sin datos	sin datos
64	CREA	Chaco	Charata	0	0	0
65	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	1	107	132
66	INTA	Santiago del Estero	Añatuya	30	140	261
67	INTA	Santiago del Estero	Malbran	1	Sin datos	62
68	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	42	48	302
69	CREA	Santiago del Estero	La Rosita	2	2	Perdida
70	CREA	Chaco	Gancedo	3	2	Perdida
71	CREA	Chaco	Las Breñas	4	0	Perdida
72	CREA	Santiago del Estero	Girardet	2	4	7
73	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	1	5	sin datos
74	CREA	Formosa	Las Lomitas	41	11	37
75	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	11	57	87
76	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	3	4	3
77	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	5	13	sin datos
78	CREA	Chaco	Las Piedras	4	Sin datos	sin datos
79	AAPRESID	Santiago del Estero	Avia Terai	11	Sin datos	sin datos
80	AAPRESID	Santiago del Estero	Ahí Veremos	8	44	20

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 35° (17/01 al 31/01), 36° (01/02 al 16/02) y **37° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 de febrero al 01 de marzo de 2026**. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				35° Lectura	36° Lectura	37° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	266	15	5
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	Perdida	Sin datos	5
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	36	55	18
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	2	2	0
5	INTA	Corrientes	Sauce	sin datos	27	Sin datos
6	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	Perdida	28	3
7	INTA	Corrientes	Mercedes	165	16	7
8	INTA	Corrientes	Virasoro	12	5	2
9	INTA	Corrientes	Goya	10	8	2
10	INTA	Corrientes	Curuzú	642	265	88
11	INTA	Corrientes	Esquina	0	12	Sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

12	INTA	Corrientes	Monte Caseros	3	4	1
13	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	4	11	21
14	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	0	14	53
15	AAPPCE	Entre Ríos	San Salvador	173	208	211
16	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	0	3	0
17	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	1	2	1
18	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	1	312	892
19	AAPRESID	Entre Ríos	Gualedguay	0	0	0
20	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	4	15	204
21	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	1	484	191
22	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	2	6	5
23	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	0	0	3
24	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	39	6	0
25	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	18	Sin datos	261
26	CREA	Entre Ríos	La Paz	Sin datos	59	27
27	CREA	Entre Ríos	Feliciano	16	9	1
28	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	0	1	0
29	CREA	Entre Ríos	Gualedguaychu	Sin datos	0	0
30	CREA	Entre Ríos	Gualedguay	Sin datos	Sin datos	0
31	CREA	Entre Ríos	Victoria	2	6	7
32	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	29	22	2
33	INTA	Entre Ríos	La Paz	28	41	10
34	INTA	Entre Ríos	Nogoya	sin datos	3	0
35	INTA	Entre Ríos	Urdinarrain	0	0	0
36	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	297	338	Perdida
37	INTA	Entre Ríos	Diamante	2	10	56
38	INTA	Entre Ríos	Gualedguay	3	Sin datos	8
39	INTA	Entre Ríos	Parana	88	244	597
40	AAPPCE	Entre Ríos	Villa Mantero	120	140	1530

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 35° (17/01 al 31/01), 36° (01/02 al 16/02) y 37° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 de febrero al 01 de marzo de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				35° Lectura	36° Lectura	37° Lectura
1	AAPPCE	Córdoba	Corralito	1	0	3
2	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	0	4	21
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	85	69	191
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	22	166	252
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	5	7	170
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	2	5	5
7	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	2	3	118
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	0	3	1
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	0	0
10	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	8	11	34
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	0	2	6
12	AAPRESID	Córdoba	Devoto	0	6	sin datos
13	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	0	Sin datos	0
14	AAPRESID	Córdoba	Eufrasio Loza	1	65	470
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	0	0	sin datos
16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	1	2	1
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	19	26	85
18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	4	2	6
20	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	0	Sin datos	0
21	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	25	26	75
22	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	0	0	0
23	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	0	1	1
24	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	1	Sin datos	70
25	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	28	91	194
26	CREA	Córdoba	Colonia Tirolesa	16	11	40
27	AAPRESID	Córdoba	Hernando	2	Sin datos	3
28	CREA	Córdoba	Piquillín	8	14	9
29	CREA	Córdoba	Las Chilcas	5	10	30
30	CREA	Córdoba	Sebastián Elcano	43	950	1387
31	CREA	Córdoba	El Tío	15	148	sin datos
32	CREA	Córdoba	Las Astillas	3	21	34

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

33	CREA	Córdoba	Tala Norte	38	27	83
34	CREA	Córdoba	Mi Granja	0	Sin datos	9
35	CREA	Córdoba	Sacanta	3	7	sin datos
36	CREA	Córdoba	Sinsacate	8	18	sin datos
37	INTA	Córdoba	Manfredi	1	12	3
38	INTA	Córdoba	Brinkmann	3	18	34
39	voluntarias	Córdoba	San Francisco	0	0	12
40	voluntarias	Córdoba	Colonia Marina	0	3	4
41	voluntarias	Córdoba	Villa Fontana	4	5	46
42	voluntarias	Córdoba	Loma Del Trozo	5	10	Perdida
43	AAPRESID	San Luis	La Toma	0	0	0
44	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	76	63	183
45	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	4	11	12
46	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	4	4	3
47	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	0	1	37
48	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	2	6	11
49	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	43	91	46
50	AAPPCE	Santa Fe	Susana	3	Sin datos	sin datos
51	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	244	276	75
52	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	0	0	0
53	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	0	Perdida	0
54	AAPPCE	Santa Fe	Vila	42	66	385
55	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	Sin datos	Sin datos	5
56	AAPPCE	Santa Fe	López	15	19	14
57	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	6	18	22
58	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	6	48	28
59	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	96	324	153
60	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	6	70	330
61	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	4	Sin datos	sin datos
62	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	2	4	45
63	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	36	192	78
64	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	0	Sin datos	4
65	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	1	2	903
66	CREA	Santa Fe	Ataliva	3	14	13
67	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	1	2	63
68	CREA	Santa Fe	Crispi	78	25	sin datos
69	CREA	Santa Fe	Esperanza	132	9	502
70	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	11	14	28
71	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	17	33	24
72	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	6	Sin datos	sin datos
73	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	0	7	19

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

74	CREA	Santa Fe	San Fabián	0	6	17
75	CREA	Santa Fe	San Martín de las Escobas	0	Sin datos	8
76	INTA	Santa Fe	Centeno	5	0	16
77	AAPRESID	Santa Fe	Cayasto	4	Sin datos	20
78	INTA	Santa Fe	Rafaela	117	248	Perdida
79	INTA	Santa Fe	Ceres	86	442	739
80	INTA	Santa Fe	San Justo	394	196	167
81	voluntarias	Santa Fe	Angelica	0	2	10
82	voluntarias	Santa Fe	Fraga	1	9	5
83	AAPRESID	Santa Fe	San Bernardo	21	35	72

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 35° (17/01 al 31/01), 36° (01/02 al 16/02) y 37° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 de febrero al 01 de marzo de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				35 ° Lectura	36 °Lectura	37° Lectura
1	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	0	0	0
2	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
3	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	0	0
4	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
5	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
6	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
7	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	0
8	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	1	1	0
9	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	0	0	0
10	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	0	0
11	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
12	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0
13	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
14	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	0	0	0
15	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

16	AAPPCE	Buenos Aires	Rafael Obligado	0	0	0
17	AAPPCE	Buenos Aires	Florentino Ameghino	0	0	0
18	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	0	0	0
19	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
20	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	2	0	0
21	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	0	0	0
22	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	0	0	0
23	AAPPCE	Buenos Aires	Pedro Gamen	0	0	0
24	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	0	0	0
25	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
26	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
27	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	0
28	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	0	0
29	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
30	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	0	0
31	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	2	0
32	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	0	0	0
33	AAPRESID	Buenos Aires	Chillar	Sin datos	0	sin datos
34	AAPRESID	Buenos Aires	Puan	0	0	0
35	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	0	0
36	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	0	0	sin datos
37	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	0	0	0
38	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
39	CREA	Buenos Aires	América	0	0	0
40	CREA	Buenos Aires	Casey	0	Sin datos	sin datos
41	CREA	Buenos Aires	Guanaco	0	0	0
42	CREA	Buenos Aires	Henderson	0	0	0
43	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	0	0	sin datos
44	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	0	0	sin datos
45	CREA	Buenos Aires	Orense	0	Sin datos	0
46	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0
47	CREA	Buenos Aires	San Pedro	0	2	sin datos
48	CREA	Buenos Aires	Alberdi	0	0	0
49	CREA	Buenos Aires	Junín	0	0	0
50	CREA	Buenos Aires	Pergamino	0	1	0
51	CREA	Buenos Aires	Catriló	0	0	0
52	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	0	0	0
53	INTA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	21
54	INTA	Buenos Aires	Conesa	0	0	Perdida
55	INTA	Buenos Aires	San antonio de Areco	0	0	2

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

56	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
57	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	0	0	1
58	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	0	0	0
59	INTA	Buenos Aires	Bolivar	0	0	0
60	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	0
61	INTA	Buenos Aires	Balcarce	0	0	0
62	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	0	0	1
63	AAPPCE	Córdoba	General Roca	0	6	9
64	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	0	0	6
65	AAPPCE	Córdoba	La playosa	1	3	0
66	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	4	0	0
67	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	0	0	0
68	AAPPCE	Córdoba	Villa María	0	0	0
69	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	0	0	0
70	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	0
71	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	0	0	0
72	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	0	0	0
73	AAPRESID	Córdoba	Lecueder	0	Sin datos	sin datos
74	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	0	0	0
75	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	0
76	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	0	Perdida	sin datos
77	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	0	0	0
78	CREA	Córdoba	General Levalle	0	Sin datos	sin datos
79	CREA	Córdoba	La Carlota	0	0	1
80	CREA	Córdoba	Melo	0	0	sin datos
81	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	0	0	0
82	CREA	Córdoba	Villa valeria	0	0	sin datos
83	CREA	Córdoba	Monte Buey	5	Sin datos	8
84	INTA	Córdoba	Marcos Juarez 2	4	29	58
85	CREA	Córdoba	Ballesteros	0	2	sin datos
86	AAPPCE	Córdoba	Achiras	0	0	0
87	AAPPCE	La Pampa	Macachín	0	0	0
88	CREA	La Pampa	General Pico	0	0	0
89	CREA	La Pampa	Quemú Quemú	0	0	0
90	CREA	La Pampa	Santa Rosa	0	Perdida	0
91	INTA	La Pampa	Anguil 1	0	0	0
92	AAPPCE	La Pampa	Winifreda	0	0	0
93	AAPPCE	La Pampa	Ing. Luiggi	0	0	0
94	AAPRESID	San Luís	La Angelina	0	0	0
95	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	0	Perdida	0
96	CREA	San Luís	Buena Esperanza	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

97	CREA	San Luís	Juan Jorba	0	Sin datos	1
98	INTA	San Luís	San Luis 1	0	Perdida	0
99	INTA	San Luís	Quines	0	1	2
100	CREA	San Luís	Naschel	0	Sin datos	1
101	AAPPCE	Santa Fe	Álvarez	2	3	5
102	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	1	0	0
103	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	0	0
104	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	2	4	5
105	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	5	Sin datos	7
106	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	0	0	1
107	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	0	0	5
108	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	0	0	0
109	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	0	0	0
110	AAPPCE	Santa Fe	Villada	0	0	0
111	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	1	0	0
112	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	0	0	5
113	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	12	7	Perdida
114	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	0	0	0
115	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	14	34	12
116	AAPRESID	Santa Fe	Pueblo Uranga	0	Sin datos	0
117	CREA	Santa Fe	Clucellas	0	9	5
118	INTA	Santa Fe	Pujato	0	0	0
119	INTA	Santa Fe	Cañada de Gómez	4	2	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (**AAPPCE**), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (**AAPRESID**), Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (**CASAFE**), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (**CONICET**), Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (**CREA**), Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (**EEAOC**), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (**INTA**), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (**MAIZAR**), y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (**SENASA**).

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.




Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas.** Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
1 a 4 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
5 a 20 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
21 a 50 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
51 a 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
> 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.