



RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 38


18 de marzo de 2026



AAPPCE



Aapresid



18 DE MARZO DE 2026

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)

INFORME N°38

02 de marzo al 16 de marzo de 2026.

En este trigésimo octavo informe se relevaron en total 319 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (49 localidades), NEA (58 localidades), Litoral (39 localidades), Centro Norte (71 localidades) y Centro Sur (102 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 5 localidades de Uruguay.

Para cada región se evaluó cómo evolucionaron las capturas utilizando dos enfoques: un gráfico de torta para representar el resultado de todas las trampas y un gráfico de barras para mostrar únicamente las trampas instaladas en lotes de maíz en los últimos tres relevamientos (informes 36, 37 y 38).

Adicionalmente, se presentan datos sobre el porcentaje de individuos portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) en dos localidades monitoreadas de la región del NOA. Los resultados indicaron bajos niveles de portación del patógeno en las localidades analizadas correspondiente a febrero.

En el NOA, el 100% de las trampas se encuentran instaladas en maíz. En esta región, la población de *D. maidis* continúa mostrando una fase de incremento, coincidiendo con un predominio de localidades que presentan maíces atravesando estadios fenológicos reproductivo. Las condiciones ambientales adversas provocaron la pérdida de un número considerable de trampas, lo que limitó la disponibilidad de datos en algunos sitios de monitoreo. No obstante, en el 53% de las localidades se registraron niveles de captura superiores a 50 adultos por trampa, predominando la categoría de > 100 chicharritas por trampa (Figura 3).

En el NEA, el 97% de las trampas relevadas se encuentra instalado en cultivos de maíz. Al igual que en el NOA, la mayoría de las localidades monitoreadas presenta lotes en estadios fenológicos reproductivos. En este contexto, la población de *D. maidis* se encuentra en una marcada fase de incremento, mostrando una dinámica similar a la observada en la región del NOA. En el 52% de las localidades evaluadas se registraron capturas superiores a 100 adultos por trampa (Figura 5).

En la región del Litoral, un 79% de las localidades monitoreadas registró capturas, predominando valores comprendidos entre 1 y 20 adultos por trampa (41% de las localidades), como se detalla en la Figura 7.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

En esta región el 67% de las trampas se encuentran instaladas en el cultivo de maíz, observándose incrementos de los niveles poblacionales de *D. maidis* en estas situaciones (Figura 8). Las mismas, ocurrieron en localidades de Entre Ríos principalmente, donde se observó con mayor frecuencia la categoría con > 100 adultos por trampa, asociada en su mayoría, a lotes de maíz tardío (Figura 7).

En la región Centro-Norte, el 99% de las localidades relevadas cuentan con trampas instaladas en el cultivo de maíz predominando estadios fenológicos reproductivos, En este contexto, se registró la presencia de *D. maidis* en el 86% de los sitios monitoreados (Figura 9). En esta región continúan registrándose incrementos poblacionales del vector, predominando captura correspondiente a la categoría con > 100 adultos por trampa (44%), como se detalla en la Figuras 8 y 9.

En el Centro-Sur el 93% de las trampas están instaladas en lotes con maíz con predominio de estadios fenológicos reproductivos. En este monitoreo se observaron ligeros incrementos de la dinámica poblacional de *D. maidis*, destacando que en esta región aún predominan las localidades donde no se registró al vector (70%), como se detalla en las Figuras 11 y 12.

Resulta fundamental sostener el monitoreo de adultos de *D. maidis* durante todo el año, ya que constituye una herramienta clave para anticipar cambios en su dinámica poblacional, proceso que comenzó a evidenciarse en las últimas evaluaciones en todas las zonas agroecológicas bajo estudio. En este contexto, es imprescindible mantener monitoreos activos y sistemáticos, aun cuando la mayor parte de los maíces tardíos se encuentre actualmente en estadios reproductivos. Si bien estos lotes presentan una menor susceptibilidad al patosistema, la información generada en esta etapa resulta de gran relevancia para comprender la dinámica poblacional del vector a escala regional.

El uso de trampas cromáticas debe acompañarse con inspecciones visuales en el cultivo implantado y con muestreos mediante red entomológica, la combinación de estas herramientas no solo mejora la detección, sino que también permite caracterizar con mayor precisión la dinámica poblacional del vector a lo largo del año.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, en el que el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector que transmite al cultivo de maíz.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 38° lectura (02/03 al 16/03).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el décimo tercero al trigésimo octavo informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 36° (01/02 al 16/02), 37° (17/02 al 01/03) y 38° (02/03 al 16/03).

Comentarios Región NOA

Se relevaron 49 localidades, de las cuales el 90% registró presencia del vector. La categoría más frecuente corresponde a > 100 adultos por trampa, que representó el 41% (**Figura 3**). En esta región, el 100% de las trampas se encuentran instaladas sobre cultivo de maíz. En el presente relevamiento se registra un incremento en las capturas promedio de chicharrita por trampa, en comparación con el monitoreo previo, pasando de **105,62 a 128,69 adultos por trampa** (**Figura 4**). Este aumento se registró en coincidencia con un predominio de lotes de maíz en fases fenológicas reproductivas. Las localidades de **El Palomar (Santiago del Estero)** y **Los Altos (Catamarca)**, se destacaron por registrar las mayores capturas, con **672 y 648 adultos por trampa**, respectivamente.




Figura 4. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NOA, según datos de los informes 36°, 37° y 38° (presente informe).

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región NOA

En febrero de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en las localidades de San Agustín (Tucumán) y Los Altos (Catamarca), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de **Corn Stunt Spiroplasma (CSS)**, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de Corn Stunt Spiroplasma (CSS). Región NOA. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
San Agustín	Tucumán	febrero	Maíz cultivado	30	3%
Los Altos	Catamarca	febrero	Maíz cultivado	30	0%

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)




Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 36° (01/02 al 16/02), 37° (17/02 al 01/03) y 38° (02/03 al 16/03).

Comentarios Región NEA

Del relevamiento efectuado en 58 localidades, en 57 de ellas (98%) se registraron detecciones del vector. Asimismo, las categorías de captura más representativas fueron la de más de 100 adultos por trampa con un 52% (**Figura 5**).

Cabe destacar que el 97% de las trampas incluidas en este relevamiento están sobre el cultivo de maíz de las cuales la prevalencia corresponde a maíces en fases fenológicas reproductivas. El valor promedio de captura de *D. maidis* en lotes con maíz tuvo un notable incremento de **97,00 a 240,85 por trampa**, nivel superior al registrado en el monitoreo anterior (**Figura 6**). Las localidades con mayores niveles de captura —en la provincia de Santiago del Estero— destacándose entre ellas a **Roversi y Puna** con los valores más elevados (**1154 y 1100 adultos por trampa**), seguida por **Gancedo (Chaco)**, con **970 adultos por trampa**.




Figura 6. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NEA, según datos de los informes 36°, 37° y 38° (presente informe).

Resumen Región Litoral




Figura 7. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 36° (01/02 al 16/02), 37° (17/02 al 01/03) y 38° (02/03 al 16/03).

Comentarios Región Litoral

En la región del Litoral se relevaron 39 localidades, registrándose en un 79% detecciones de *D. maidis*, con predominio de las categorías de capturas de **1 a 20 adultos por trampa (41%)**, como se detalla en la **Figura 7**. El 67% de las trampas están instaladas sobre cultivos de maíz que actualmente transitan estadios reproductivos avanzados. En el presente relevamiento se registra un incremento en las capturas promedio de chicharrita por trampa, en comparación con el monitoreo previo, pasando de **151,35 a 237,92 adultos por trampa (Figura 8)**. El incremento en las categorías altas ocurrió principalmente en localidades de Entre Ríos. En este contexto, **Villa Mantero** se destacó con **2530 adultos por trampa** y **Paraná** registró **1023 adultos por trampa**.




Figura 8. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región LITORAL, según datos de los informes 36°, 37° y 38° (presente informe).

Resumen Región Centro Norte




Figura 9. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 36° (01/02 al 16/02), 37° (17/02 al 01/03) y 38° (02/03 al 16/03).

Comentarios Región Centro Norte

De las 71 localidades relevadas, el 99% de las trampas se encuentran instaladas en cultivos de maíz ya implantados, con predominancia de fenología reproductiva. En esta región, el 86% de las localidades registró detecciones de ***D. maidis*** en las trampas, predominando la categoría superior a 100 adultos por trampa, que representó el 44% del total de localidades monitoreadas (**Figura 9**). Las mayores capturas correspondieron a **San Jerónimo Norte (Santa Fe), con 1104 adultos por trampa y Esperanza (Santa Fe) con 1032 adultos de *D. maidis***. Estos registros fueron el motivo que produjo un aumento del promedio regional, que se ubicó en valores superiores a **150 adultos por trampa**, confirmando el escenario de incremento poblacional observado (**Figura 10**).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.





Figura 10. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO NORTE, según datos de los informes 36°, 37° y 38° (presente informe).

Resumen Región Centro Sur



La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Figura 11. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 36° (01/02 al 16/02), 37° (17/02 al 01/03) y 38° (02/03 al 16/03).

Comentarios Región Centro Sur

De las 102 localidades relevadas, el 93% presentan cultivo de maíz. En este informe, el 70% no registró detecciones de *D. maidis* (Figura 11). En las localidades con cultivo de maíz, se registraron valores bajos de capturas de *D. maidis* (**4,93 chicharritas/trampa**), nivel ligeramente superior a observado en el monitoreo anterior (Figura 12). Las localidades con mayores capturas correspondieron a **Zavalla y Timbues (Santa Fe)** con **117 y 114 capturas de adultos por trampas** respectivamente.




Figura 12. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO SUR, según datos de los informes 36°, 37° y 38° (presente informe).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa 36° (01/02 al 16/02), 37° (17/02 al 01/03) y 38° (02/03 al 16/03).

N° Loc.	Institución	Nombre de trampa	Localidad	36° Lectura	37° Lectura	38° Lectura
1	AGTSA	2025 MERCEDES UY - AGTSA	Mercedes	2	6	15
2	AGTSA	2025 ACEGUÁ UY - AGTSA	Peñarol			
3	AGTSA	2025 RINCON DEL PINO - AGTSA	Los Arenales			
4	AGTSA	2025 NUEVA HELVECIA - AGTSA (SAN PEDRO)	Nueva Helvecia	0	18	9
5	AGTSA	2025 LAS ARMAS	Colonia	0	3	
6	AGTSA	2025 CORRALITO - AGTSA	Palmitas	0	4	8
7	AGTSA	2025 Durazno - AGTSA	Durazno	1	6	58
8	AGTSA	2025 Young 2 - AGTSA	Young	12	237	446
9	AGTSA	2026 Young 1 - AGTSA	Young	13		

Comentarios Uruguay

En las cinco localidades monitoreadas de la República Oriental del Uruguay se confirmó la presencia de *D. maidis*. La localidad de Young presentó nuevamente el mayor nivel de captura, con un total de 446 adultos por trampa. Este pico poblacional coincide con los incrementos registrados en la región del Litoral argentino.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 36° (01/02 al 16/02), 37° (17/02 al 01/03) y **38° lectura correspondiente al periodo comprendido del 02 al 16 de marzo de 2026**. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				36° Lectura	37° Lectura	38° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	4	8	6
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	2	6	Perdida
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	4	9	4
4	INTA	Jujuy	El Bananal	124	60	41
5	AAPPCE	Salta	Agua Sucia	16	0	5
6	AAPPCE	Salta	Rio Piedras	12	4	8
7	AAPRESID	Salta	Rivadavia	11	0	6
8	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	Sin datos	43	6
9	CREA	Salta	Antilla	3	17	Perdida
10	CREA	Salta	Ballivián	Sin datos	0	Perdida
11	CREA	Salta	Ceibalito	Sin datos	Perdida	Perdida
12	CREA	Salta	Copo Quiles	Sin datos	sin datos	104
13	CREA	Salta	El Bordo	Sin datos	sin datos	284
14	CREA	Salta	El Galpón	9	146	133
15	CREA	Salta	El Tunal	Sin datos	sin datos	Perdida
16	CREA	Salta	Embarcación	Sin datos	0	Perdida
17	CREA	Salta	Gral Pizarro	Sin datos	5	Perdida
18	CREA	Salta	Horcones	0	0	3
19	CREA	Salta	J V Gonzales	31	83	Perdida
20	CREA	Salta	Las Lajitas T3	Sin datos	3	0
21	CREA	Salta	Metan 1	1	1	0
22	CREA	Salta	Metan 2	0	2	6
23	CREA	Salta	Mollinedo	38	Perdida	Perdida
24	CREA	Salta	Mosconi	5	12	Perdida
25	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	121	Perdida	Perdida
26	CREA	Salta	Pichanal	Sin datos	0	Perdida
27	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	Perdida	240	Perdida
28	CREA	Salta	Santo Domingo	44	159	Perdida
29	CREA	Salta	Saravia	1	16	0
30	CREA	Salta	Tolloche	10	0	Perdida
31	CREA	Salta	Urundel	4	5	Perdida
32	INTA	Salta	Metán	20	119	89

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

33	AAPPCE	Tucumán	Tusquita	110	21	54
34	CREA	Tucumán	Alto Verde	177	81	Perdida
35	CREA	Tucumán	Burruyacu	6	52	40
36	CREA	Tucumán	Chilca	Sin datos	sin datos	Perdida
37	CREA	Tucumán	Garmendia	0	0	0
38	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	18	85	48
39	CREA	Tucumán	La Bajada	6	11	15
40	CREA	Tucumán	La Cocha 1	7	Perdida	40
41	CREA	Tucumán	La Cruz	12	231	0
42	CREA	Tucumán	La Invernada	40	97	84
43	CREA	Tucumán	La Virginia	39	560	610
44	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	28	158	140
45	CREA	Tucumán	Las Cejas	14	26	23
46	CREA	Tucumán	Los Pereyra	1	10	126
47	CREA	Tucumán	Los Puestos	0	15	520
48	CREA	Tucumán	Piedrabuena	12	124	320
49	CREA	Tucumán	Rapelli	Sin datos	92	370
50	CREA	Tucumán	Río Colorado	2	4	Perdida
51	CREA	Tucumán	Rumi Punco	4	31	41
52	CREA	Tucumán	San Agustín	93	86	98
53	CREA	Tucumán	Tacanas	11	60	76
54	CREA	Tucumán	Taco Ralo	13	69	18
55	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	152	245	171
56	CREA	Tucumán	Trancas	0	0	Perdida
57	CREA	Tucumán	Viclos	19	sin datos	92
58	INTA	Tucumán	Leales	105	273	Perdida
59	AAPPCE	Tucumán	Tala Pozo	15	15	20
60	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	4	7	40
61	CREA	Santiago del Estero	El Charco	22	16	Perdida
62	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	Perdida	Perdida	672
63	CREA	Santiago del Estero	Frias	7	17	237
64	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	Sin datos	144	101
65	CREA	Santiago del Estero	Pampa Pozo	Sin datos	sin datos	Perdida
66	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	Sin datos	88	135
67	CREA	Santiago del Estero	San Pedro de Guasayán	Sin datos	sin datos	Perdida
68	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	59	1200	240
69	CREA	Santiago del Estero	Vinará	6	sin datos	109
70	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	7	33	250
71	CREA	Catamarca	El Abra	399	377	154
72	CREA	Catamarca	Los Altos	1043	890	648
73	CREA	Catamarca	Frias	6	58	119

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 36° (01/02 al 16/02), 37° (17/02 al 01/03) y **38° lectura correspondiente al periodo comprendido del 02 al 16 de marzo de 2026**. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				36° Lectura	37° Lectura	38° Lectura
1	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	10	13	sin datos
2	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	4	42	98
3	AAPRESID	Chaco	Concepcion del Bermejo	Sin datos	17	sin datos
4	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	0	1	8
5	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	13	32	sin datos
6	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	0	4	27
7	INTA	Chaco	Tres Isletas	21	10	6
8	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	10	7	16
9	INTA	Chaco	Las Breñas	19	72	410
10	INTA	Chaco	Juan José Castelli	65	6	24
11	INTA	Chaco	Sylvina	1	3	33
12	INTA	Chaco	Basail	8	5	27
13	CREA	Santa Fe	La María	799	277	341
14	CREA	Santa Fe	Margarita	103	53	121
15	CREA	Santa Fe	Ramayón	49	26	35
16	CREA	Santa Fe	Soledad	12	Perdida	37
17	CREA	Santa Fe	Hersilia	14	6	37
18	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	2	31	108
19	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	3	89	sin datos
20	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	22	15	sin datos
21	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	10	124	sin datos
22	CREA	Santa Fe	Vera y Pintado	17	35	154
23	CREA	Santa Fe	La Osca	5	25	85
24	CREA	Santa Fe	Malabrigo	23	52	105
25	INTA	Formosa	El colorado	3	0	1
26	INTA	Formosa	Comandante Fontana	134	55	70
27	CREA	Santiago del Estero	Pozo de toba	Sin datos	87	24
28	CREA	Santa Fe	Arroyo Ceibal	6	87	307
29	AAPPCE	Santa Fe	Villa Minetti	3	118	51

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

30	AAPPCE	Santa Fe	El Guanagan	0	0	2
31	AAPPCE	Santa Fe	Santa Margarita	8	128	Perdida
32	AAPRESID	Santa Fe	Villa Minetti	42	45	49
33	CREA	Santiago del Estero	Weisburd	Sin datos	29	sin datos
34	INTA	Santa Fe	Reconquista	30	218	271
35	INTA	Santa Fe	Calchaquí	264	318	151
36	INTA	Santa Fe	Logroño	28	117	98
37	INTA	Santa Fe	San javier	168	79	399
38	INTA	Santa Fe	La sarita	0	14	25
39	CREA	Santa Fe	Emilia	12	sin datos	54
40	CREA	Santa Fe	Ambrosetti	32	21	175
41	CREA	Santa Fe	La Pelada	42	6	sin datos
42	CREA	Chaco	San Bernardo	Sin datos	Perdida	26
43	CREA	Santa Fe	Colonia Esther	157	199	574
44	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	36	59	sin datos
45	CREA	Chaco	La Montenegrina	0	0	0
46	CREA	Santiago del Estero	Puna	37	350	1100
47	CREA	Formosa	Perin	Sin datos	2	2
48	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	75	62	sin datos
49	CREA	Santiago del Estero	Lilo Viejo	105	98	sin datos
50	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	15	68	156
51	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	44	144	375
52	AAPPCE	Santiago del Estero	Col. Mackinlay	Sin datos	148	219
53	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	Sin datos	72	32
54	AAPRESID	Santiago del Estero	Arbol Blanco	Sin datos	sin datos	Perdida
55	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	201	593	957
56	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	255	606	1154
57	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	14	276	380
58	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	16	20	sin datos
59	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	7	sin datos	sin datos
60	CREA	Chaco	Charata	0	0	90
61	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	107	132	262
62	INTA	Santiago del Estero	Añatuya	140	261	758
63	INTA	Santiago del Estero	Malbran	Sin datos	62	570
64	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	48	302	158
65	CREA	Santiago del Estero	La Rosita	2	Perdida	130
66	CREA	Chaco	Gancedo	2	Perdida	970
67	CREA	Chaco	Las Breñas	0	Perdida	580
68	CREA	Santiago del Estero	Girardet	4	7	640
69	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	5	sin datos	580
70	CREA	Formosa	Las Lomitas	11	37	233

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

71	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	57	87	126
72	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	4	3	5
73	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	13	72	65
74	AAPRESID	Santiago del Estero	Ahí Veremos	44	20	Perdida

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 36° (01/02 al 16/02), 37° (17/02 al 01/03) y **38° lectura correspondiente al periodo comprendido del 02 al 16 de marzo de 2026**. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				36° Lectura	37° Lectura	38° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	15	5	3
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	Sin datos	5	13
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	55	18	48
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	2	0	0
5	INTA	Corrientes	Sauce	27	0	4
6	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	28	3	0
7	INTA	Corrientes	Mercedes	16	7	0
8	INTA	Corrientes	Virasoro	5	2	2
9	INTA	Corrientes	Goya	8	2	26
10	INTA	Corrientes	Curuzú	265	88	7
11	INTA	Corrientes	Esquina	12	0	0
12	INTA	Corrientes	Monte Caseros	4	1	10
13	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	11	21	77
14	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	14	53	64
15	AAPPCE	Entre Ríos	San Salvador	208	211	263
16	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	3	0	55
17	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	2	1	2
18	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	312	892	929
19	AAPRESID	Entre Ríos	Guaaleguay	0	0	0
20	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	15	204	434
21	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	484	191	297
22	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	6	5	6
23	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	0	3	4
24	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	6	0	40
25	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	Sin datos	313	307
26	CREA	Entre Ríos	La Paz	59	27	8

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

27	CREA	Entre Ríos	Feliciano	9	1	0
28	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	1	0	1
29	CREA	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	0
30	CREA	Entre Ríos	Gualeguaychu	Sin datos	0	0
31	CREA	Entre Ríos	Victoria	6	7	3
32	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	22	2	3
33	INTA	Entre Ríos	La Paz	41	10	Sin datos
34	INTA	Entre Ríos	Nogoya	3	0	10
35	INTA	Entre Ríos	Urdinarrain	0	0	2
36	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	338	Perdida	62
37	INTA	Entre Ríos	Diamante	10	56	29
38	INTA	Entre Ríos	Gualeguay	Sin datos	8	2
39	INTA	Entre Ríos	Parana	244	597	1023
40	AAPPCE	Entre Ríos	Villa Mantero	140	1530	2530

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 36° (01/02 al 16/02), 37° (17/02 al 01/03) y 38° lectura correspondiente al periodo comprendido del 02 al 16 de marzo de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				36° Lectura	37° Lectura	38° Lectura
1	AAPPCE	Córdoba	Corralito	0	3	6
2	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	4	21	Perdida
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	69	191	260
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	166	252	210
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	7	170	112
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	5	5	0
7	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	3	118	162
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	3	1	1
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	0	sin datos
10	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	11	34	108
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	2	6	49
12	AAPRESID	Córdoba	Devoto	6	0	0
13	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	Sin datos	0	sin datos
14	AAPRESID	Córdoba	Eufrazio Loza	65	470	387
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	0	0	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	2	1	0
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	26	85	328
18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	2	6	10
19	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	Sin datos	0	0
20	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	26	75	298
21	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	0	0	0
22	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	1	1	3
23	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	Sin datos	70	sin datos
24	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	91	194	5
25	CREA	Córdoba	Colonia Tirollesa	11	40	67
26	AAPRESID	Córdoba	Hernando	Sin datos	3	sin datos
27	CREA	Córdoba	Piquillín	14	9	22
28	CREA	Córdoba	Las Chilcas	10	30	67
29	CREA	Córdoba	Sebastián Elcano	950	1387	618
30	CREA	Córdoba	El Tío	148	385	629
31	CREA	Córdoba	Las Astillas	21	34	85
32	CREA	Córdoba	Tala Norte	27	83	102
33	CREA	Córdoba	Mi Granja	Sin datos	9	2
34	CREA	Córdoba	Sacanta	7	sin datos	sin datos
35	CREA	Córdoba	Sinsacate	18	sin datos	17
36	INTA	Córdoba	Manfredi	12	3	22
37	INTA	Córdoba	Brinkmann	Sin datos	34	124
38	voluntarias	Córdoba	Luxardo	0	12	141
39	voluntarias	Córdoba	Colonia Marina	3	4	122
40	voluntarias	Córdoba	Villa Fontana	5	46	480
41	voluntarias	Córdoba	Loma Del Trozo	10	Perdida	320
42	AAPRESID	San Luis	La Toma	0	0	0
43	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	63	183	357
44	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	11	12	6
45	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	4	3	0
46	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	1	37	48
47	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	6	11	19
48	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	91	46	191
49	AAPPCE	Santa Fe	Susana	Sin datos	sin datos	Perdida
50	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	276	75	127
51	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	0	0	0
52	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	Perdida	0	0
53	AAPPCE	Santa Fe	Vila	66	385	365
54	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	Sin datos	5	sin datos
55	AAPPCE	Santa Fe	López	19	14	28
56	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	18	22	21

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

57	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	48	28	315
58	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	324	153	572
59	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	70	330	330
60	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	Sin datos	sin datos	5
61	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	4	45	28
62	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	192	78	237
63	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	Sin datos	4	sin datos
64	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	2	903	1104
65	CREA	Santa Fe	Ataliva	14	13	54
66	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	2	63	48
67	CREA	Santa Fe	Crispi	25	sin datos	198
68	CREA	Santa Fe	Esperanza	9	502	1032
69	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	14	28	0
70	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	33	24	51
71	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	Sin datos	sin datos	sin datos
72	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	7	19	Perdida
73	CREA	Santa Fe	San Fabián	6	17	51
74	CREA	Santa Fe	San Martín de las Escobas	Sin datos	8	12
75	INTA	Santa Fe	Centeno	0	16	31
76	AAPRESID	Santa Fe	Cayasto	Sin datos	20	150
77	INTA	Santa Fe	Rafaela	248	Perdida	377
78	INTA	Santa Fe	Ceres	442	739	408
79	INTA	Santa Fe	San Justo	196	167	314
80	voluntarias	Santa Fe	Angelica	2	10	16
81	voluntarias	Santa Fe	Fraga	9	5	38
82	AAPRESID	Santa Fe	San Bernardo	35	72	21

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 36° (01/02 al 16/02), 37° (17/02 al 01/03) y **38° lectura correspondiente al periodo comprendido del 02 al 16 de marzo de 2026**. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				36 °Lectura	37° Lectura	38° Lectura
1	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	0	0	3
2	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
3	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

4	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
5	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
6	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
7	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	0
8	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	1	0	0
9	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	0	0	2
10	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	0	0
11	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	sin datos
12	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0
13	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
14	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	0	0	0
15	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	0	0
16	AAPPCE	Buenos Aires	Rafael Obligado	0	0	0
17	AAPPCE	Buenos Aires	Florentino Ameghino	0	0	0
18	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	0	0	0
19	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
20	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	0	0	0
21	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	0	0	sin datos
22	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	0	0	0
23	AAPPCE	Buenos Aires	Pedro Gamen	0	0	0
24	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	0	0	Perdida
25	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
26	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
27	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	0
28	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	0	0
29	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
30	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	0	0
31	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	2	0	0
32	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	0	0	0
33	AAPRESID	Buenos Aires	Chillar	0	sin datos	sin datos
34	AAPRESID	Buenos Aires	Puan	0	0	sin datos
35	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	0	0
36	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	0	0	Perdida
37	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	0	0	0
38	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
39	CREA	Buenos Aires	América	0	0	0
40	CREA	Buenos Aires	Guanaco	0	0	0
41	CREA	Buenos Aires	Henderson	0	0	0
42	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	0	0	sin datos
43	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	0	0	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

44	CREA	Buenos Aires	Orense	Sin datos	0	0
45	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0
46	CREA	Buenos Aires	San Pedro	2	0	0
47	CREA	Buenos Aires	Alberdi	0	0	1
48	CREA	Buenos Aires	Junín	0	0	0
49	CREA	Buenos Aires	Pergamino	1	0	0
50	CREA	Buenos Aires	Catriló	0	0	0
51	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	0	0	0
52	INTA	Buenos Aires	Pergamino	0	21	Perdida
53	INTA	Buenos Aires	Conesa	0	Perdida	3
54	INTA	Buenos Aires	San antonio de Areco	0	2	3
55	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
56	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	0	1	2
57	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	0	0	0
58	INTA	Buenos Aires	Bolivar	0	0	0
59	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	4
60	INTA	Buenos Aires	Balcarce	0	0	0
61	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	0	1	6
62	AAPPCE	Córdoba	General Roca	6	9	16
63	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	0	6	10
64	AAPPCE	Córdoba	La playosa	3	0	3
65	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	0	0	0
66	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	0	0	0
67	AAPPCE	Córdoba	Villa María	0	0	1
68	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	0	0	2
69	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	sin datos
70	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	0	0	0
71	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	0	0	0
72	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	0	0	0
73	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	0
74	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	Perdida	sin datos	0
75	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	0	0	4
76	CREA	Córdoba	General Levalle	0	0	0
77	CREA	Córdoba	La Carlota	0	1	4
78	CREA	Córdoba	Melo	0	0	1
79	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	0	0	sin datos
80	CREA	Córdoba	Villa valeria	0	0	0
81	CREA	Córdoba	Monte Buey	Sin datos	8	sin datos
82	INTA	Córdoba	Marcos Juarez 2	29	58	33
83	CREA	Córdoba	Ballesteros	2	0	1
84	CREA	Córdoba	La Brianza	0	2	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

85	AAPPCE	Córdoba	Achiras	0	0	2
86	AAPPCE	La Pampa	Macachín	0	0	sin datos
87	CREA	La Pampa	General Pico	0	0	0
88	CREA	La Pampa	Quemú Quemú	0	0	0
89	CREA	La Pampa	Santa Rosa	Perdida	0	0
90	INTA	La Pampa	Anguil 1	0	0	3
91	AAPPCE	La Pampa	Winifreda	0	0	0
92	AAPPCE	La Pampa	Ing. Luiggi	0	0	0
93	AAPRESID	San Luís	La Angelina	0	0	0
94	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	Perdida	0	0
95	CREA	San Luís	Buena Esperanza	0	0	0
96	CREA	San Luís	Juan Jorba	Sin datos	1	5
97	INTA	San Luís	San Luis 1	Perdida	0	0
98	INTA	San Luís	Quines	1	2	0
99	CREA	San Luís	Naschel	Sin datos	1	4
100	AAPPCE	Santa Fe	Álvarez	3	5	sin datos
101	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	0	0	0
102	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	0	0
103	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	4	5	18
104	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	Sin datos	7	4
105	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	0	1	3
106	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	0	5	114
107	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	0	0	Perdida
108	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	0	0	sin datos
109	AAPPCE	Santa Fe	Villada	0	0	0
110	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	0	0	0
111	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	0	5	25
112	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	7	Perdida	60
113	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	0	0	0
114	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	Sin datos	0	0
115	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	34	12	117
116	AAPRESID	Santa Fe	Pueblo Uranga	Sin datos	0	sin datos
117	CREA	Santa Fe	Clucellas	9	5	0
118	INTA	Santa Fe	Pujato	0	0	4
119	INTA	Santa Fe	Cañada de Gómez	2	1	11

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (**AAPPCE**), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (**AAPRESID**), Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (**CASAFE**), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (**CONICET**), Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (**CREA**), Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (**EEAOC**), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (**INTA**), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (**MAIZAR**), y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (**SENASA**).

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.




Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas.** Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
1 a 4 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
5 a 20 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
21 a 50 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
51 a 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
> 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.