



RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 46


20 de julio de 2026



AAPPCE



Aapresid



20 DE JULIO DE 2026

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)

INFORME N°46
01 de julio al 16 de julio de 2026.

En este cuadragésimo sexto informe se relevaron en total 295 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (51 localidades), NEA (56 localidades), Litoral (31 localidades), Centro Norte (63 localidades) y Centro Sur (94 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 5 localidades de Uruguay.

Para cada región se evaluó cómo evolucionaron las capturas utilizando dos enfoques: un gráfico de torta para representar el resultado de todas las trampas y un gráfico de barras para mostrar únicamente las trampas instaladas en lotes de maíz en los últimos tres relevamientos (informes 44, 45 y 46).

Adicionalmente, se incorporan registros de heladas ocurridas en las distintas zonas agroecológicas durante el período de evaluación, así como información sobre el porcentaje de individuos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Los análisis mediante PCR evidenciaron niveles de portación moderados a altos durante mayo de 2026. En la región NOA se observó una reducción en la proporción de adultos portadores entre mayo y junio, pasando de 30% a 7% en El Abra (Catamarca) y de 20% a 10% en San Agustín (Tucumán). En contraste, en Paraná (región Litoral), los análisis realizados en junio registraron una portación del 20%, confirmando la presencia de adultos potencialmente infectivos en dicha región.

En el NOA, se observó una estabilidad poblacional en la categoría de mayor captura (>100 adultos por trampa), no obstante, los niveles poblacionales continúan siendo elevados, con el 86% de las localidades registrando capturas superiores a 100 adultos por trampa (Figura 3). En esta región, el 50% de las trampas monitoreadas se encuentran instaladas en cultivos de maíz en estado de madurez fisiológica (R6), observándose una marcada disminución del promedio regional de capturas en estas trampas con respecto al informe anterior.

En el NEA, se produjo una leve disminución de las localidades que registraron capturas superiores a 100 adultos por trampa con respecto al informe anterior. En esta región también el 50% de las trampas monitoreadas se encuentran instaladas en cultivos de maíz, predominando lotes en estado de madurez fisiológica (R6), con

niveles promedio de abundancia en las trampas que también evidenciaron una disminución respecto de los registrados en el período anterior (Figura 6).

En el Litoral, el 68% de las localidades evaluadas registró presencia de *D. maidis*, observándose una retracción de las categorías de intermedia abundancia (5 a 20 y 21 a 50 adultos por trampa). En esta región el 32% de las trampas monitoreadas se encuentran instaladas en cultivos de maíz, en estado de madurez fisiológica (R6), registrándose una disminución en los valores promedio de captura de las trampas, incluso más pronunciada que la observada en las regiones endémicas de *D. maidis* (Figura 7).

En la región Centro-Norte, el 95% de los sitios monitoreados registró presencia de *D. maidis*, con una disminución en la proporción de localidades incluidas en la categoría de máxima abundancia (>100 adultos por trampa) respecto del informe anterior. El 38% de las localidades relevadas cuentan con trampas instaladas en cultivos de maíz, en estado de madurez fisiológica (R6). Asimismo, el promedio regional de capturas registrado en estas trampas se redujo aproximadamente a la mitad en comparación con el período previo, evidenciando una marcada retracción poblacional (Figura 9).

En el Centro-Sur, el 70% de las localidades relevadas no registró capturas del vector. El 32% de las trampas monitoreadas se encuentran instaladas en cultivos de maíz, en estado de madurez fisiológica (R6), observándose una disminución del promedio regional de adultos registrados en estas trampas (Figura 11).

Las 5 regiones bajo monitoreo evidenciaron una marcada disminución de las abundancias poblacionales de *D. maidis* respecto del informe anterior. Esta reducción generalizada sugiere que las heladas registradas durante el período, con distinta intensidad, duración y distribución espacial, actuaron como un factor regulador clave de la dinámica poblacional del vector, afectando su supervivencia y contribuyendo a la retracción observada durante la quincena evaluada. Si bien persisten algunos focos de elevada abundancia en áreas endémicas, estos se corresponden principalmente con sitios recientemente cosechados, donde suele registrarse un incremento transitorio de capturas asociado a la concentración de adultos en trampas ubicadas sobre lotes que ingresan a barbecho, un patrón recurrentemente observado en campañas anteriores. En este contexto, resulta fundamental sostener esquemas de monitoreo activos y sistemáticos, aun cuando gran parte de los maíces tardíos transitan las etapas finales previas a la cosecha. La información generada durante este período es estratégica para caracterizar la

dinámica poblacional invernal de *D. maidis* y cuantificar el efecto de las heladas como uno de los principales factores ambientales que regulan su persistencia a escala regional.

Asimismo, la presencia de maíces voluntarios en lotes cosechados continúa representando un componente epidemiológico crítico, al constituir un “puente verde” que favorece la supervivencia y permanencia del vector durante el período intercultivo. El monitoreo de estos hospederos permite identificar focos de persistencia, estimar poblaciones remanentes y mejorar la capacidad predictiva de los sistemas de vigilancia. Por ello, la continuidad del monitoreo durante el período invernal – primaveral resulta esencial para fortalecer la evaluación del riesgo y optimizar la toma de decisiones de manejo a escala regional.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, en el que el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector que transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 46° lectura (1/07 al 16/07).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el trigésimo quinto al cuadragésimo sexto informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 44° (01/06 al 15/06), 45° (16/06 al 30/06) y 46° (01/07 al 16/07).

Comentarios Región NOA

Se relevaron 51 localidades, donde todas registraron presencia del vector. La categoría más frecuente como en el informe anterior correspondió a > 100 adultos por trampa, que representó el **84%** (**Figura 3**). En esta región, el **50%** de las trampas se encuentran instaladas sobre cultivo de maíz. En el presente relevamiento se registra una disminución en las capturas promedio de chicharrita por trampa en lotes de maíz, en comparación con el monitoreo previo, pasando de **807,57 a 455,28 adultos por trampa (Figura 4)**. Las localidades que registraron las mayores capturas fueron **Las Cejas (Tucumán)**, con **4480** adultos por trampa y **Viñalito (Jujuy)**, con **2470** adultos por trampa.




Figura 4. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NOA, según datos de los informes 44°, 45° y 46° (presente informe).

Tabla 1. Registros de fecha, intensidad y duración de heladas durante el periodo del 01 al 16 de julio de 2026 para localidades específicas de la región NOA

Provincia	Localidad	Fecha	Duración (hs:min)	Intensidad (°C)
Tucumán	San Agustín	7/7/2026	01:45	-1,2
	La Cruz	6/7/2026	03:15	-0,5
		7/6/2026	04:00	-1,0
Santiago del Estero	El Charco	7/6/2026	03:30	-2,4
Catamarca	Los Altos	6/7/2026	05:00	-1,6
		7/6/2026	01:00	-1,9

Fuente: <https://agromet.eeaoc.gob.ar/>

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región NOA

Entre mayo y junio de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en las Localidades de **El abra (Catamarca)** y **San Agustín (Tucumán)**, con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de **Corn Stunt Spiroplasma (CSS)**, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región NOA.

Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
El Abra	Catamarca	mayo	Maíz cultivo	30	30%
El Abra	Catamarca	junio	Maíz cultivo	30	7%
San Agustín	Tucumán	mayo	Maíz cultivo	30	20%
San Agustín	Tucumán	junio	Maíz cultivo	30	10%

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)




Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 44° (01/06 al 15/06), 45° (16/06 al 30/06) y 46° (01/07 al 16/07).

Comentarios Región NEA

Del relevamiento efectuado en 56 localidades, registrándose detecciones del vector en el 100%. Asimismo, las categorías de captura más representativas fueron la de más de 100

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

adultos por trampa con un **62% (Figura 5)**. Cabe destacar que el **50%** de las trampas incluidas en este relevamiento están sobre el cultivo de maíz, donde el valor promedio de captura de *D. maidis* registro una marcada disminución respecto al de la quincena anterior, pasando de **759,3 a 433,50 por trampa (Figura 6)**. Las localidades con mayores niveles de captura se ubicaron en las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe, destacándose entre ellas a **Añatuya, La Sarita y Villa Minetti** con los valores más elevados (**1176, 1164 y 1160 adultos por trampa respectivamente**).




Figura 6. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NEA, según datos de los informes 44°, 45° y 46° (presente informe).

Tabla 2. Registros de fecha e intensidad de heladas durante el periodo del 01 al 16 de julio de 2026 para localidades específicas de la región NEA

Provincia	Localidad	Fecha	Intensidad (°C)
Santiago del Estero	Bandera	3/7/2026	-0,5
	Quimilí	6/7/2026	-1,4
		7/7/2026	-2,2
Chaco	Roque Saenz Peña	Sin registro de heladas hasta el 16/7	
	Basail	Sin registro de heladas hasta el 16/7	
	Las Breñas	Sin registro de heladas hasta el 16/7	
Santa Fe	Reconquista	Sin registro de heladas hasta el 16/7	

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Fuente: <https://siga.inta.gob.ar/#/data>

Resumen Región Litoral




Figura 7. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 44° (01/06 al 15/06), 45° (16/06 al 30/06) y 46° (01/07 al 16/07).

Comentarios Región Litoral

En la región del Litoral se relevaron 31 localidades, observándose en un **68%** de ellas detecciones de *D. maidis*, predominando las categorías con capturas de **1 a 4 (36%)** y de **5 a 20 adultos por trampa (23%)**, como se detalla en la **Figura 7**. El 32% de las trampas están instaladas sobre cultivos de maíz que actualmente transitan estadios reproductivos avanzados, registrándose una retracción en las capturas promedio de chicharrita por trampa, en comparación con el monitoreo previo, pasando de **88,75 a 30,83 adultos por trampa (Figura 8)**. La localidad de mayor captura fue representada por **Corrientes** con **174 adultos por trampa**.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 8. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región LITORAL, según datos de los informes 44°, 45° y 46° (presente informe).

Tabla 3. Registros de fecha e intensidad de heladas durante el periodo del 01 al 16 de julio de 2026 para localidades específicas de la región LIROTA

Provincia	Localidad	Fecha	Intensidad (°C)
Entre Ríos	Concepción del Uruguay	1/7/2026	-1,0
		3/7/2026	-3,1
		4/7/2026	-2,2
		7/7/2026	-1,3
Corrientes	Mercedes	3/7/2026	-1,7
	Bella vista	Sin registro de heladas hasta el 16/7	
	Ituzaingó	Sin registro de heladas hasta el 16/7	

Fuente: <https://siga.inta.gob.ar/#/data>

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región LITORAL

En junio de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en la Localidad de **Paraná (Entre Ríos)**, con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de **Corn Stunt Spiroplasma (CSS)**, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presenta el resultados obtenido.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región LITORAL. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
Paraná	Entre Ríos	junio	Maíz voluntario	30	17%

Resumen Región Centro Norte




Figura 9. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 44° (01/06 al 15/06), 45° (16/06 al 30/06) y 46° (01/07 al 16/07).

Comentarios Región Centro Norte

En esta región, el **95%** de las localidades registró detecciones de *D. maidis* en las trampas, predominando la categoría de **5 a 20 adultos por trampa**, que representó el **28%** del total de localidades monitoreadas (**Figura 9**). De las 63 localidades relevadas, el **38%** de las

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

trampas se encuentran instaladas en cultivos de maíz. Las mayores capturas de *D. maidis* correspondieron a **Ceres (Santa Fe) con 2423 adultos y Las Astillas (Córdoba), con 1254 adultos por trampa**. En cuanto al promedio regional, las trampas instaladas en lotes de maíz registraron una marcada disminución en las capturas de *D. maidis*, pasando de **363,73 a 171,95 adultos por trampa** (Figura 10).




Figura 10. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO NORTE, según datos de los informes 44°, 45° y 46° (presente informe).

Tabla 4. Registros de fecha, intensidad y duración de heladas durante el periodo del 01 al 16 de julio de 2026 para localidades específicas de la región CENTRO NORTE

Provincia	Localidad	Fecha	Duración (hs:mm)	Intensidad (°C)
Córdoba	Santa Rosa	3/7/2026	03:30	-4,7
		4/7/2026	01:00	-2,7
		5/7/2026	03:30	-1,6
		6/7/2026	10:20	-4,2
		7/7/2026	09:10	-5,9
	San Francisco	3/7/2026	01:10	-0,4

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

		5/7/2026	03:30	-2,6
		6/7/2026	08:10	-4,7
Santa Fe	Videla	3/7/2026	05:10	-1,6
		6/7/2026	05:30	-1,4
	Rafaela	3/7/2026		-0,8
		6/7/2026		-2,6
San Luis	La Toma	2/7/2026		-0,1
		6/7/2026		-3,7
		7/7/2026		-0,4

Fuentes:

<https://clima.sanluis.gob.ar/InformeTemp.aspx?fechaDesde=2025070321&fechahasta=2025070421>

<https://cordoba.redesclimaticas.com/next/reports?mss=30062,30076,30271,30408,30249>

<https://siga.inta.gob.ar/#/data>

Resumen Región Centro Sur




Figura 11. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 44° (01/06 al 15/06), 45° (16/06 al 30/06) y 46° (01/07 al 16/07).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Región Centro Sur

De las 94 localidades relevadas, en un **70%** no se registró detecciones de *D. maidis* (**Figura 11**). El 32% de las trampas se encontraban instaladas sobre el cultivo de maíz, observándose la mayor captura en la localidad de **Timbúes (Santa Fe)** con **391 capturas de adultos por trampas**. En las localidades monitoreadas con cultivos de maíz, el promedio de capturas de *D. maidis* mostró una disminución respecto del informe previo, descendiendo de **23,93 a 15,59 adultos por trampa (Figuras 12)**.




Figura 12. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO SUR, según datos de los informes 44°, 45° y 46° (presente informe).

Tabla 5. Registros de fecha, intensidad y duración de heladas durante el periodo del 01 al 16 de julio de 2026 para localidades específicas de la región CENTRO SUR

Provincia	Localidad	Fecha	Duración (hs:mm)	Intensidad (°C)
Córdoba	Jovita	2/7/2026	03:50	-2,7
		3/7/2026	10:40	-4,5
		5/7/2026	01:40	-2,1
		6/7/2026	09:30	-4,1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

	Corral de Bustos	7/7/2026	07:20	-4,1
		2/7/2026	03:00	-3,5
		3/7/2026	13:00	-7,1
		4/7/2026	01:30	-1,1
		5/7/2026	02:00	-2,1
		6/7/2026	09:30	-3,8
		7/7/2026	09:10	-4,2
	Eufrasio Loza	6/7/2026		-1,4
		8/7/2026		-2,1
San Luis	La Angelina	2/7/2026		-1,7
		3/7/2026		-3,3
		6/7/2026		-3,1
	Nueva Galia	2/7/2026		-2,5
		3/7/2026		-2,5
		6/7/2026		-1,4
		7/7/2026		-0,6
	Naschel	1/7/2026		-2,9
		2/7/2026		-0,7
		5/7/2026		-0,3
		6/7/2026		-6,5
		7/7/2026		-4,2
		8/7/2026		-1,0
		9/7/2026		-0,8
		11/7/2026		-1,7
Buenos Aires	Las Armas	1/7/2026		-0,6
		2/7/2026		-4,4
		3/7/2026		-3,1
		4/7/2026		-4,3
		5/7/2026		-3,7
		7/7/2026		-1,5
	25 de mayo	1/7/2026		-0,5
		2/7/2026		-3,0
		3/7/2026		-4,7
		4/7/2026		-4,2
		6/7/2026		-0,8
		7/7/2026		-2,4
	San Pedro	2/7/2026		-0,4
		3/7/2026		-3,5
		4/7/2026		-2,8
		6/7/2026		-1,5
		7/7/2026		-1,5

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

	Ferré	2/7/2026	-0,5
		3/7/2026	-5,5
		4/7/2026	-1,2
		6/7/2026	-2,0
		7/7/2026	-1,2
	Bordenave	2/7/2026	-5,5
		3/7/2026	-7,6
		4/7/2026	-4,2
		5/7/2026	-0,4
		6/7/2026	-8,5
		7/7/2026	-2,6
	Trenque Lauquen	2/7/2026	-4,7
		3/7/2026	-7,6
		4/7/2026	-0,5
		6/7/2026	-3,0
		7/7/2026	-1,0

Fuentes:

<https://clima.sanluis.gob.ar/InformeTemp.aspx?fechaDesde=2025070321&fechahasta=2025070421>

<https://cordoba.redesclimaticas.com/next/reports?mss=30062,30076,30271,30408,30249>

<https://siga.inta.gob.ar/#/data>

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa 44° (01/06 al 15/06), 45° (16/06 al 30/06) y 46° (01/07 al 16/07).

N° Loc.	Institución	Nombre de trampa	Localidad	44° Lectura	45° Lectura	46° Lectura
1	AGTSA	2025 MERCEDES UY - AGTSA	Mercedes	10	4	0
2	AGTSA	2025 ACEGUÁ UY - AGTSA	Peñarol			
3	AGTSA	2025 RINCON DEL PINO - AGTSA	Los Arenales			
4	AGTSA	2025 NUEVA HELVECIA - AGTSA (SAN PEDRO)	Nueva Helvecia	14	17	3
5	AGTSA	2025 LAS ARMAS	Colonia			0
6	AGTSA	2025 CORRALITO - AGTSA	Palmitas		2	2
7	AGTSA	2025 Durazno - AGTSA	Durazno	13	0	
8	AGTSA	2025 Young 2 - AGTSA	Young	37	6	2
9	AGTSA	2026 Young 1 - AGTSA	Young			

Comentarios Uruguay

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Durante el período evaluado se registró la presencia de ***D. maidis*** en tres de las cinco localidades monitoreadas de la República Oriental del Uruguay. Sin embargo, las localidades de **Nueva Helvecia, Palmitas y Young** presentaron capturas inferiores a **5 adultos por trampa**, reflejando un marcado proceso de retracción poblacional del vector. Este comportamiento resulta consistente con lo observado en la región Litoral de Argentina, donde también se evidenció una disminución significativa de las abundancias poblacionales de ***D. maidis***.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 44° (01/06 al 15/06), 45° (16/06 al 30/06) y 46° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 16 de julio de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				44° Lectura	45° Lectura	46° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	5	15	6
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	25	20	12
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	8	10	15
4	INTA	Jujuy	El Bananal	2218	1414	908
5	INTA	Jujuy	Viñalito	1802	3771	2470
6	AAPPCE	Salta	Agua Sucia	sin datos	298	354
7	AAPPCE	Salta	Rio Piedras	213	583	315
8	AAPRESID	Salta	Rivadavia	895	169	395
9	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	sin datos	587	910
10	CREA	Salta	Antilla	sin datos	630	450
11	CREA	Salta	Ceibalito	620	451	sin datos
12	CREA	Salta	Copo Quiles	sin datos	2700	sin datos
13	CREA	Salta	El Bordo	sin datos	4500	sin datos
14	CREA	Salta	El Galpón	sin datos	1180	1920
15	CREA	Salta	El Tunal	sin datos	622	654
16	CREA	Salta	Horcones	160	55	sin datos
17	CREA	Salta	J V Gonzales	260	50	sin datos
18	CREA	Salta	Las Lajitas T3	576	246	945
19	CREA	Salta	Metan 1	Perdida	161	187
20	CREA	Salta	Metan 2	1880	1268	1112
21	CREA	Salta	Mosconi	110	52	22
22	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	1880	Perdida	sin datos
23	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	930	538	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

24	CREA	Salta	Santo Domingo	1990	655	sin datos
25	CREA	Salta	Saravia	2320	2080	sin datos
26	CREA	Salta	Tolloche	650	61	sin datos
27	INTA	Salta	Metán	316	608	472
28	AAPPCE	Tucumán	Tusquita	2976	1796	775
29	CREA	Tucumán	Alto Verde	315	86	161
30	CREA	Tucumán	Burruyacu	sin datos	480	120
31	CREA	Tucumán	Garmendia	sin datos	280	85
32	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	503	852	335
33	CREA	Tucumán	La Bajada	21	14	22
34	CREA	Tucumán	La Cocha 1	258	317	203
35	CREA	Tucumán	La Cruz	sin datos	894	66
36	CREA	Tucumán	La Invernada	161	172	402
37	CREA	Tucumán	La Virginia	1736	456	187
38	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	3228	562	603
39	CREA	Tucumán	Las Cejas	sin datos	918	4480
40	CREA	Tucumán	Los Pereyra	2900	326	178
41	CREA	Tucumán	Los Puestos	sin datos	440	640
42	CREA	Tucumán	Piedrabuena	1230	Perdida	245
43	CREA	Tucumán	Rapelli	sin datos	2000	410
44	CREA	Tucumán	Río Colorado	350	243	197
45	CREA	Tucumán	Rumi Punco	198	420	184
46	CREA	Tucumán	San Agustín	586	873	132
47	CREA	Tucumán	Tacanas	1010	39	140
48	CREA	Tucumán	Taco Ralo	397	410	156
49	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	559	674	398
50	CREA	Tucumán	Trancas	Perdida	1760	451
51	CREA	Tucumán	Viclos	1200	Perdida	133
52	INTA	Tucumán	Leales	450	389	11
53	AAPPCE	Tucumán	Tala Pozo	340	240	60
54	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	788	226	223
55	CREA	Santiago del Estero	El Charco	23	130	320
56	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	3096	651	1610
57	CREA	Santiago del Estero	Frias	535	653	337
58	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	2560	660	800
59	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	2400	230	sin datos
60	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	sin datos	1600	2040
61	CREA	Santiago del Estero	Vinará	sin datos	578	643
62	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	sin datos	Perdida	Perdida
63	CREA	Catamarca	El Abra	801	388	263

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

64	CREA	Catamarca	Los Altos	115	1049	989
65	INTA	Catamarca	Los Altos	1420	115	21

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 44° (01/06 al 15/06), 45° (16/06 al 30/06) y 46° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 16 de julio de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				44° Lectura	45° Lectura	46° Lectura
1	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	1816	2120	sin datos
2	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	56	147	Perdida
3	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	43	sin datos	sin datos
4	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	91	215	648
5	INTA	Chaco	Tres Isletas	Sin datos	sin datos	817
6	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	299	345	550
7	INTA	Chaco	Las Breñas	1029	940	946
8	INTA	Chaco	Juan José Castelli	44	1431	243
9	INTA	Chaco	Sylvina	21	5	41
10	INTA	Chaco	Basail	243	198	38
11	CREA	Santa Fe	La María	61	33	102
12	CREA	Santa Fe	Margarita	37	5	58
13	CREA	Santa Fe	Ramayón	52	304	406
14	CREA	Santa Fe	Soledad	1196	996	106
15	CREA	Santa Fe	Hersilia	82	425	1050
16	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	271	69	35
17	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	sin datos	0	sin datos
18	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	sin datos	0	sin datos
19	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	sin datos	0	43
20	CREA	Santa Fe	Vera y Pintado	85	65	Perdida
21	CREA	Santa Fe	La Osca	98	158	438
22	CREA	Santa Fe	Malabrigo	75	241	840
23	INTA	Formosa	El colorado	33	38	69
24	INTA	Formosa	Comandante Fontana	608	Perdida	31
25	CREA	Santiago del Estero	Pozo de toba	sin datos	800	sin datos
26	CREA	Santa Fe	Arroyo Ceibal	83	209	Perdida
27	AAPPCE	Santa Fe	Villa Minetti	Perdida	sin datos	sin datos
28	AAPPCE	Santa Fe	Santa Margarita	Perdida	sin datos	162

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

29	AAPRESID	Santa Fe	Villa Minetti	1158	1320	1160
30	CREA	Santiago del Estero	Weisburd	sin datos	1512	sin datos
31	INTA	Santa Fe	Reconquista	276	834	1008
32	INTA	Santa Fe	Calchaquí	169	281	157
33	INTA	Santa Fe	Logroño	1450	1080	331
34	INTA	Santa Fe	San javier	13	86	148
35	INTA	Santa Fe	La sarita	302	1589	1164
36	CREA	Santa Fe	Emilia	38	15	16
37	CREA	Santa Fe	Ambrosetti	154	675	480
38	CREA	Santa Fe	La Pelada	90	38	6
39	CREA	Chaco	San Bernardo	40	18	16
40	CREA	Santa Fe	Colonia Esther	168	10	11
41	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	29	12	11
42	CREA	Chaco	La Montenegrina	0	7	Perdida
43	CREA	Santiago del Estero	Puna	1147	469	Perdida
44	CREA	Formosa	Perin	sin datos	215	469
45	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	sin datos	sin datos	80
46	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	sin datos	sin datos	203
47	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	2000	1450	Perdida
48	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	3650	2151	423
49	AAPPCE	Santiago del Estero	Col. Mackinlay	29	6	sin datos
50	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	Sin datos	2151	sin datos
51	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	284	283	59
52	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	3127	1088	39
53	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	82	73	sin datos
54	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	700	250	sin datos
55	CREA	Chaco	Palo blanco	sin datos	sin datos	123
56	CREA	Chaco	Pampa del Infierno	sin datos	sin datos	730
57	CREA	Chaco	Castelli	sin datos	sin datos	8
58	CREA	Chaco	Bajo Hondo	sin datos	sin datos	5
59	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	sin datos	sin datos	71
60	CREA	Chaco	Charata	sin datos	1760	166
61	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	1800	727	870
62	INTA	Santiago del Estero	Añatuya	2940	1832	1176
63	INTA	Santiago del Estero	Malbran	1970	281	2
64	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	1247	1837	675
65	CREA	Santiago del Estero	La Rosita	sin datos	1250	200
66	CREA	Chaco	Gancedo	sin datos	530	Perdida
67	CREA	Chaco	Las Breñas	sin datos	720	200
68	CREA	Santiago del Estero	Girardet	sin datos	1280	240
69	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	sin datos	2000	200

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

70	CREA	Santiago del Estero	El colorado	sin datos	1300	250
71	CREA	Formosa	Las Lomitas	257	240	254
72	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	51	421	Perdida
73	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	217	68	27
74	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	sin datos	974	1040
75	CREA	Chaco	Las Piedras	43	sin datos	sin datos
76	AAPRESID	Santiago del Estero	Avia Terai	550	300	sin datos
77	AAPRESID	Santiago del Estero	Ahí Veremos	38	sin datos	sin datos

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 44° (01/06 al 15/06), 45° (16/06 al 30/06) y 46° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 16 de julio de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				44° Lectura	45° Lectura	46° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	7	8	3
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	Perdida	38	Perdida
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	Sin datos	185	174
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	5	7	1
6	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	2	0	4
7	INTA	Corrientes	Mercedes	1	1	3
8	INTA	Corrientes	Virasoro	0	0	4
9	INTA	Corrientes	Goya	7	5	0
10	INTA	Corrientes	Curuzú	3	2	0
11	INTA	Corrientes	Esquina	Sin datos	sin datos	45
12	INTA	Corrientes	Monte Caseros	18	9	2
13	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	78	9	0
14	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	38	8	0
15	AAPPCE	Entre Ríos	San Salvador	Perdida	45	13
16	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	481	97	18
17	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	24	4	1
18	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	0	17	9
19	AAPRESID	Entre Ríos	Guaqueguay	8	0	0
20	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	423	224	12
21	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	73	5	2

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

22	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	68	13	6
23	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	6	5	0
24	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	120	28	sin datos
25	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	57	47	sin datos
26	CREA	Entre Ríos	La Paz	6	4	16
27	CREA	Entre Ríos	Feliciano	7	0	sin datos
28	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	43	6	Perdida
29	CREA	Entre Ríos	Gualeguay	12	15	0
30	CREA	Entre Ríos	Guauguaychu	0	0	0
31	CREA	Entre Ríos	Victoria	0	0	sin datos
32	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	98	15	2
33	INTA	Entre Ríos	María Grande	24	2	1
34	INTA	Entre Ríos	Nogoya	Sin datos	28	0
35	INTA	Entre Ríos	Villaguay	3	0	1
36	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	113	397	4
37	INTA	Entre Ríos	Diamante	364	27	5
38	INTA	Entre Ríos	Gualeguay	81	2	0
39	INTA	Entre Ríos	Parana	699	58	51
40	AAPPCE	Entre Ríos	Villa Mantero	10	5	0

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 44° (01/06 al 15/06), 45° (16/06 al 30/06) y 46° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 16 de julio de 2026. Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				44° Lectura	45° Lectura	46° Lectura
1	AAPPCE	Córdoba	Corralito	200	151	0
2	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	112	32	4
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	723	46	10
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	202	16	2
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	2390	78	137
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	480	164	22
7	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	756	49	107
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	190	68	12
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	0	sin datos
10	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	72	30	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	856	626	196
12	AAPRESID	Córdoba	Devoto	94	12	sin datos
13	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	1	2	2
14	AAPRESID	Córdoba	Eufrasio Loza	2500	2240	sin datos
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	302	111	5
16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	110	60	45
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	5306	686	306
18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	289	177	98
19	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	409	86	46
20	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	950	238	sin datos
21	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	210	310	138
22	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	200	18	sin datos
23	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	560	920	sin datos
24	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	204	0	23
25	AAPRESID	Córdoba	Hernando	sin datos	0	3
26	CREA	Córdoba	Colonia Tirolesa	21	9	4
27	CREA	Córdoba	Piquillín	1238	157	52
28	CREA	Córdoba	Las Chilcas	3000	2900	39
29	CREA	Córdoba	Sebastián Elcano	532	138	174
30	CREA	Córdoba	El Tío	sin datos	45	228
31	CREA	Córdoba	Las Astillas	798	233	1254
32	CREA	Córdoba	Tala Norte	1245	752	95
33	CREA	Córdoba	Mi Granja	1106	453	484
34	CREA	Córdoba	Sacanta	1120	640	7
35	CREA	Córdoba	Sinsacate	925	687	235
36	INTA	Córdoba	Manfredi	846	49	30
37	INTA	Córdoba	San Francisco	62	48	32
38	INTA	Córdoba	Brinkmann	122	754	170
39	AAPRESID	San Luis	La Toma	20	18	sin datos
40	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	2300	110	Sin datos
41	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	143	32	14
42	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	214	6	7
43	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	39	2	1
44	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	48	31	12
45	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	233	22	23
46	AAPPCE	Santa Fe	Pilar	125	28	16
47	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	63	5	Sin datos
48	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	6	8	0
49	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	32	22	2
50	AAPPCE	Santa Fe	Vila	120	5	2
51	AAPPCE	Santa Fe	López	204	33	7

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

52	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	217	57	32
53	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	57	7	14
54	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	17	4	sin datos
55	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	474	64	10
56	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	240	sin datos	sin datos
57	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	94	79	22
58	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	1040	388	69
59	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	43	0	5
60	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	1	3	2
61	AAPRESID	Santa Fe	San Bernardo	464	59	19
62	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	0	10	7
63	CREA	Santa Fe	Ataliva	74	3	5
64	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	387	39	4
65	CREA	Santa Fe	Crispi	198	41	18
66	CREA	Santa Fe	Esperanza	87	0	5
67	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	45	14	4
68	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	23	6	1
69	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	92	0	0
70	CREA	Santa Fe	San Fabián	6	3	1
71	CREA	Santa Fe	San Martín de las Escobas	120	17	4
72	CREA	Santa Fe	Clucellas	sin datos	sin datos	3
73	INTA	Santa Fe	Centeno	81	11	9
74	INTA	Santa Fe	Rafaela	378	143	287
75	INTA	Santa Fe	Ceres	523	1936	2423
76	INTA	Santa Fe	San Justo	223	505	sin datos

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 44° (01/06 al 15/06), 45° (16/06 al 30/06) y 46° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 16 de julio de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				44° Lectura	45° Lectura	46° Lectura
1	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	42	29	4
2	AAPPCE	Buenos Aires	América	4	0	0
3	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	0	sin datos
4	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
5	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

6	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
7	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	0
8	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	4	1	0
9	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	5	9	1
10	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	5	0	0
11	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
12	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0
13	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
14	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	1	0	0
15	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	0	0
16	AAPPCE	Buenos Aires	Rafael Obligado	0	0	0
17	AAPPCE	Buenos Aires	Florentino Ameghino	0	0	0
18	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	1	0	0
19	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
20	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	11	6	2
21	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	0	0	0
22	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	1	0	0
23	AAPPCE	Buenos Aires	Pedro Gamen	0	0	0
24	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	0	0	0
25	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
26	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
27	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	0
28	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	0	0
29	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
30	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	0	0
31	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	0	sin datos
32	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	1	0	0
33	AAPRESID	Buenos Aires	Puan	0	0	sin datos
34	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	0	sin datos
35	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	0	0	0
36	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	46	Perdida	0
37	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
38	CREA	Buenos Aires	América	1	0	0
39	CREA	Buenos Aires	Guanaco	0	0	0
40	CREA	Buenos Aires	Henderson	0	0	0
41	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	0	0	0
42	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	0	0	0
43	CREA	Buenos Aires	Orense	0	0	0
44	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0
45	CREA	Buenos Aires	San Pedro	7	2	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

46	CREA	Buenos Aires	Alberdi	0	1	0
47	CREA	Buenos Aires	Junín	3	0	0
48	CREA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0
49	CREA	Buenos Aires	Catriló	0	0	1
50	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	6	0	0
51	INTA	Buenos Aires	Pergamino	161	10	4
52	INTA	Buenos Aires	Conesa	72	8	3
53	INTA	Buenos Aires	San antonio de Areco	89	12	3
54	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
55	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	2	1	1
56	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	0	0	Perdida
57	INTA	Buenos Aires	Bolivar	0	0	0
58	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	3	0	Perdida
59	INTA	Buenos Aires	Balcarce	0	0	0
60	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	35	5	0
61	AAPPCE	Córdoba	General Roca		0	0
62	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	48	7	0
63	AAPPCE	Córdoba	La playosa	0	0	0
64	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	20	1	0
65	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	4	0	0
66	AAPPCE	Córdoba	Villa María	0	3	0
67	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	29	5	0
68	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	0
69	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	36	12	4
70	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	12	3	0
71	AAPRESID	Córdoba	Lecueder	0	0	sin datos
72	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	0	0	sin datos
73	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	sin datos
74	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	0	13	3
75	AAPRESID	Córdoba	Pegasano		0	1
76	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	19	8	6
77	CREA	Córdoba	General Levalle	10	7	5
78	CREA	Córdoba	La Carlota	48	21	3
79	CREA	Córdoba	Melo	23	5	5
80	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	20	9	6
81	CREA	Córdoba	Villa valeria	sin datos	0	1
82	CREA	Córdoba	Monte Buey	92	sin datos	sin datos
83	INTA	Córdoba	Marcos Juarez 2	132	5	0
84	CREA	Córdoba	Ballesteros	31	6	1
85	CREA	Córdoba	La Brianza	45	7	0
86	AAPPCE	Córdoba	Achiras	31	2	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

87	AAPPCE	La Pampa	Macachín	0	0	0
88	CREA	La Pampa	General Pico	9	5	0
89	CREA	La Pampa	Quemú Quemú	0	0	0
90	CREA	La Pampa	Santa Rosa	0	0	sin datos
91	INTA	La Pampa	Anguil 1	0	0	0
92	AAPPCE	La Pampa	Winifreda	0	0	0
93	AAPPCE	La Pampa	Ing. Luiggi	0	0	0
94	AAPRESID	San Luís	La Angelina	0	0	sin datos
95	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	0	0	sin datos
96	CREA	San Luís	Buena Esperanza	9	14	0
97	CREA	San Luís	Juan Jorba	4	4	2
98	INTA	San Luís	San Luis 1	26	10	3
99	CREA	San Luís	Naschel	5	7	2
100	AAPPCE	Santa Fe	Álvarez	sin datos	2	sin datos
101	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	19	1	0
102	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	0	0
103	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	36	8	1
104	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	45	10	1
105	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	6	1	0
106	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	426	784	391
107	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	3	1	0
108	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	271	15	3
109	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	16	7	0
110	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	59	28	7
111	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	23	6	Perdida
112	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	sin datos	0	sin datos
113	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	47	10	2
114	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	53	2	0
115	INTA	Santa Fe	Pujato	134	20	17
116	INTA	Santa Fe	Cañada de Gómez	104	5	0
117	AAPPCE	Santa Fe	Los Quirquinchos	0	2	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbuls maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (**AAPPCE**), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (**AAPRESID**), Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (**CASAFE**), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (**CONICET**), Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (**CREA**), Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (**EEAOC**), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (**INTA**), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (**MAIZAR**), y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (**SENASA**).

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.




Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas.** Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
1 a 4 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
5 a 20 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
21 a 50 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
51 a 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
> 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.