



RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 48

18 de agosto de 2026



AAPPCE




Aapresid



18 DE AGOSTO DE 2026

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis



Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)

INFORME N°48

01 de agosto al 17 de agosto de 2026

En este cuadragésimo octavo informe se relevaron en total 310 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (46 localidades), NEA (66 localidades), Litoral (36 localidades), Centro Norte (56 localidades) y Centro Sur (106 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 5 localidades de Uruguay.

Para cada región se evaluó cómo evolucionaron las capturas utilizando dos enfoques: un gráfico de torta para representar el resultado de todas las trampas y un gráfico de barras para comparar los valores de captura de los meses de julio y agosto de 2026 con los de iguales meses del 2025.

Adicionalmente, se presentan datos sobre el porcentaje de individuos de *D. maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) en cuatro localidades monitoreadas de la región Centro-Norte y una del NEA. Los resultados evidenciaron ausencia del patógeno en Colonia Alpina (Santiago del Estero), mientras que en las localidades evaluadas de Córdoba y Santa Fe (San Francisco, Freyre, Ceres y San Guillermo) se registraron niveles bajos a moderados de portación de CSS.

En la región NOA se evidenció una marcada retracción de las localidades comprendidas en la categoría de mayor abundancia (>100 adultos por trampa), cuya proporción disminuyó del 73% al 41%. Asimismo, la categoría de ausencia del vector alcanzó el 9% de las localidades relevadas (Figura 3).

En la región NEA también se observó una marcada disminución en la proporción de localidades con capturas superiores a 100 adultos por trampa respecto del informe anterior, pasando del 44% al 17%. La ausencia del vector se registró en el 21% de las localidades relevadas en esta región, evidenciando una retracción poblacional más pronunciada que la observada en la región NOA (Figura 5).

En la región Litoral, en el 64% de las localidades evaluadas no se registró presencia de *D. maidis*, consolidando la retracción poblacional observada en la región. Asimismo, el 19% de las localidades se ubicó en la categoría de menor abundancia, con capturas inferiores a 5 adultos por trampa (Figura 7).

En la región Centro-Norte, y en concordancia con la tendencia observada en las regiones mencionadas anteriormente, se evidenció una retracción poblacional de *D. maidis*, con una disminución de las localidades incluidas en la categoría de máxima abundancia (>100 adultos por trampa), que pasó del 19% al 7% respecto del informe anterior. La categoría de ausencia del vector aumentó del 13% al 32% entre ambas evaluaciones (Figura 9).

En la región Centro-Sur, el 90% de las localidades relevadas no registró capturas de *D. maidis*, mientras que el 10% restante se ubicó en la categoría de menor abundancia, con capturas inferiores a 5 adultos por trampa (Figura 11).

En todas las regiones bajo estudio se evidenció una retracción poblacional de *D. maidis* durante la primera quincena de agosto. A pesar de esta tendencia general, las regiones del NOA y NEA (áreas endémicas de vector) y Centro-Norte (área de transición), continúan presentando mayores abundancias del vector, en comparación a igual periodo del 2025. En las regiones de Litoral y Centro-Sur se intensificó la retracción poblacional observada en los últimos informes, alcanzando un escenario de baja abundancia, similar al registrado durante igual periodo del 2025.

En este contexto, resulta fundamental sostener un monitoreo activo y sistemático de *D. maidis*, principalmente en las zonas con maíces implantados, para detectar tempranamente cambios en la abundancia del vector de cara a la nueva campaña. Asimismo, es clave mantener el control de los maíces voluntarios, evitando la continuidad de un “puente verde” que favorezca su supervivencia y permanencia entre campañas. Finalmente, las condiciones ambientales, incluida la posible ocurrencia de heladas tardías, aún podrían contribuir a profundizar la retracción de las poblaciones durante la transición invierno-primavera.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, en el que el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 48ª lectura (01/08 al 17/08).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el vigésimo cuarto al cuadragésimo octavo informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas 46° (01/07 al 16/07), 47° (17/07 al 31/07) y 48° (01/08 al 17/08).

Comentarios Región NOA

Se relevaron 46 localidades, donde el 91% de las trampas registraron presencia del vector. La categoría más frecuente correspondió a > 100 adultos por trampa, que representó el **41%**. No obstante, se observó una marcada retracción de esta categoría respecto del relevamiento previo (**Figura 3**). Las localidades que registraron las mayores capturas fueron **Las Cejas (Tucumán)**, con **1640** adultos por trampa y **Las Lajitas (Salta)**, con **691** adultos por trampa. La comparación interanual indica que, si bien en ambos años se observa una retracción poblacional hacia agosto, en 2026 esta ocurre partiendo de niveles de abundancia sustancialmente mayores. De hecho, en la primera quincena de agosto de 2026 las capturas fueron aproximadamente **2,4 veces** superiores a las registradas en el mismo período de 2025 (**Figura 4**).




Figura 4. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* durante la primera y segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto de 2025 y 2026 en la región NOA.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)




Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 46° (01/07 al 16/07), 47° (17/07 al 31/07) y 48° (01/08 al 17/08).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Región NEA

Del relevamiento efectuado en 66 localidades, se registraron detecciones del vector en el 79% de ellas. La categoría de captura más representativa fue la de 5 a 20 adultos por trampa con un **23% (Figura 5)**. Las localidades con mayores niveles de captura se ubicaron en la provincia de Chaco, destacándose entre ellas **Pampa del Infierno y Gancedo** con los valores más elevados (**525 y 500 adultos por trampa** respectivamente). En la región NEA, durante 2026 se registraron abundancias de *Dalbulus maidis* superiores a las observadas en 2025. Sin embargo, a partir de la primera quincena de julio de 2026 se evidenció una marcada retracción poblacional, con una reducción de las capturas de 332,87 a 63,91 adultos/trampa en la primera quincena de agosto. A pesar de esta disminución, los niveles se mantuvieron superiores a los registrados en el mismo período de 2025. (Figura 6).




Figura 6. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* durante la primera y segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto de 2025 y 2026 en la región NEA.

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. NEA

En el mes de agosto de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en la Localidad de Colonia Alpina (Santiago del Estero), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de **Corn Stunt Spiroplasma (CSS)**, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región NEA.

Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
Colonia Alpina	Santiago del Estero	agosto	Maíz cosechado	16	0%

Resumen Región Litoral




Figura 7. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 46° (01/07 al 16/07), 47° (17/07 al 31/07) y 48° (01/08 al 17/08).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Región Litoral

En la región del Litoral se relevaron 36 localidades, predominando la categoría de **ausencia del vector (64%)**. En el resto de las localidades (36%) hubo capturas de *Dalbulus maidis*, con niveles promedios bajos (< 21 chicharritas por trampa), como se detalla en la **Figura 7**. Las localidades de mayores capturas fueron representadas por **Corrientes y Mercedes** ambas con **16 adultos por trampa**. En la región Litoral, las abundancias de *Dalbulus maidis* fueron similares entre campañas al inicio de julio. Sin embargo, durante 2026 las capturas se mantuvieron relativamente elevadas hasta la segunda quincena de julio, para luego registrar una marcada retracción en la primera quincena de agosto (2,58 adultos/trampa). Aun así, este valor fue superior al observado en el mismo período de 2025 (1,09 adultos/trampa) (**Figura 8**).




Figura 8. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* durante la primera y segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto de 2025 y 2026 en la región LITORAL.

Resumen Región Centro Norte




Figura 9. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 46° (01/07 al 16/07), 47° (17/07 al 31/07) y 48° (01/08 al 17/08).

Comentarios Región Centro Norte

En esta región, en un 32% de las localidades relevadas no se registró al vector. En aquellas donde hubo capturas (68%), predominaron las categorías de **1 a 4 adultos por trampa (27%)** y **5 a 20 adultos por trampa (16%)**, como se detalla en la **Figura 9**. Las mayores capturas de *D. maidis* correspondieron a **Eufracio Loza con 590 adultos y Las Chilcas con 291 adultos por trampa**, ambas perteneciente a la provincia de Córdoba. En esta región, durante 2026 se registraron abundancias de *Dalbulus maidis* marcadamente superiores a las observadas en 2025. No obstante, se evidenció una retracción sostenida desde la primera quincena de julio, con una disminución de 135,84 a 29,55 adultos/trampa en la primera quincena de agosto de 2026. A pesar de esta reducción, las capturas permanecieron considerablemente por encima de las registradas en igual período de 2025. (**Figura 10**).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 10. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* durante la primera y segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto de 2025 y 2026 en la región CENTRO NORTE.

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región Centro Norte

En el mes de agosto de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en las Localidades de San Guillermo y Ceres (Santa Fe) y San Francisco y Freyre (Córdoba), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de **Corn Stunt Spiroplasma (CSS)**, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de Corn Stunt Spiroplasma (CSS). Región Centro Norte. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
San Guillermo	Santa Fe	agosto	Maíz voluntario	30	7%
Ceres	Santa Fe	agosto	Maíz cosechado	30	17%
San Francisco	Córdoba	agosto	Maíz voluntario	30	10%
Freyre	Córdoba	agosto	Maíz voluntario	30	13%

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Centro Sur




Figura 11. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 46° (01/07 al 16/07), 47° (17/07 al 31/07) y 48° (01/08 al 17/08).

Comentarios Región Centro Sur

De las 106 localidades relevadas, en un **90%** no se registró detecciones de *D. maidis* (**Figura 11**), observándose la mayor captura en la localidad de **Timbúes (Santa Fe)** con **4 adultos**. Durante julio de 2026 las capturas de *Dalbulus maidis* fueron superiores a las registradas en 2025. Sin embargo, se observó una marcada retracción poblacional durante el período analizado, disminuyendo de 4,45 a 0,18 adultos/trampa en la primera quincena de agosto, alcanzando incluso valores inferiores a los registrados en igual período de 2025 (**Figura 12**).




Figura 12. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* durante la primera y segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto de 2025 y 2026 en la región CENTRO SUR.

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa 46° (01/07 al 16/07), 47° (17/07 al 31/07) y 48° (01/08 al 16/08).

N° Loc.	Institución	Nombre de trampa	Localidad	46° Lectura	47° Lectura	48° Lectura
1	AGTSA	2025 MERCEDES UY - AGTSA	Mercedes	0		0
2	AGTSA	2025 NUEVA HELVECIA - AGTSA (SAN PEDRO)	Nueva Helvecia	3		0
3	AGTSA	2025 LAS ARMAS	Colonia	0	1	0
4	AGTSA	2025 CORRALITO - AGTSA	Palmitas	2		0
5	AGTSA	2025 Young 2 - AGTSA	Young	2	21	0

Comentarios Uruguay

Durante el período evaluado, no se registró presencia de *D. maidis* en ninguna de las cinco localidades monitoreadas de la República Oriental del Uruguay. Este escenario resulta concordante con la marcada retracción poblacional observada en la región Litoral, donde predominan las localidades con ausencia del vector.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 46° (01/07 al 16/07), 47° (17/07 al 31/07) y 48° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 17 de agosto de 2026. Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				46° Lectura	47° Lectura	48° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	6	2	0
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	12	10	5
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	15	12	10
4	INTA	Jujuy	El Bananal	908	1195	Perdida
5	INTA	Jujuy	Viñalito	2470	758	228
6	AAPPCE	Salta	Agua Sucia	354	552	84
7	AAPPCE	Salta	Rio Piedras	315	481	58
8	AAPRESID	Salta	Rivadavia	395	59	0
9	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	910	570	182
10	CREA	Salta	Antilla	450	sin datos	sin datos
11	CREA	Salta	Copo Quiles	sin datos	sin datos	28
12	CREA	Salta	El Galpón	1920	1910	648
13	CREA	Salta	El Tunal	654	723	sin datos
14	CREA	Salta	Las Lajitas T3	945	919	691
15	CREA	Salta	Metan 1	187	90	21
16	CREA	Salta	Metan 2	1112	696	454
17	CREA	Salta	Mosconi	22	18	10
18	INTA	Salta	Metán	472	104	408
19	AAPPCE	Tucumán	Tusquita	775	479	242
20	CREA	Tucumán	Alto Verde	161	120	8
21	CREA	Tucumán	Burruyacu	120	210	550
22	CREA	Tucumán	Garmendia	85	56	30
23	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	335	114	10
24	CREA	Tucumán	La Bajada	22	14	5
25	CREA	Tucumán	La Cocha 1	203	200	62
26	CREA	Tucumán	La Cruz	66	1386	321
27	CREA	Tucumán	La Invernada	402	498	64
28	CREA	Tucumán	La Virginia	187	136	93
29	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	603	297	617
30	CREA	Tucumán	Las Cejas	4480	5000	1640
31	CREA	Tucumán	Los Pereyra	178	Perdida	18

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

32	CREA	Tucumán	Los Puestos	640	269	230
33	CREA	Tucumán	Piedrabuena	245	223	103
34	CREA	Tucumán	Rapelli	410	sin datos	420
35	CREA	Tucumán	Río Colorado	197	98	6
36	CREA	Tucumán	Rumi Punco	184	148	39
37	CREA	Tucumán	San Agustín	132	212	177
38	CREA	Tucumán	Tacanas	140	40	178
39	CREA	Tucumán	Taco Ralo	156	171	21
40	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	398	254	177
41	CREA	Tucumán	Trancas	451	sin datos	sin datos
42	CREA	Tucumán	Viclos	133	54	64
43	INTA	Tucumán	Leales	11	12	0
44	AAPPCE	Tucumán	Tala Pozo	60	sin datos	30
45	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	223	186	73
46	CREA	Santiago del Estero	El Charco	320	123	166
47	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	1610	983	125
48	CREA	Santiago del Estero	Frias	337	224	93
49	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	800	213	22
50	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	200	197	84
51	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	2040	680	480
52	CREA	Santiago del Estero	Vinará	643	Perdida	86
53	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	Perdida	680	0
54	CREA	Catamarca	El Abra	263	395	247
55	CREA	Catamarca	Los Altos	989	639	313
56	INTA	Catamarca	Los Altos	21	8	sin datos

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 46° (01/07 al 16/07), 47° (17/07 al 31/07) y 48° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 17 de agosto de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				46° Lectura	47° Lectura	48° Lectura
1	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	sin datos	23	20
2	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	Perdida	112	0
3	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	sin datos	sin datos	43
4	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	648	133	4

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

5	INTA	Chaco	Tres Isletas	817	72	15
6	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	550	455	525
7	INTA	Chaco	Las Breñas	946	266	28
8	INTA	Chaco	Juan José Castelli	243	296	28
9	INTA	Chaco	Sylvina	41	13	0
10	INTA	Chaco	Basail	38	44	25
11	CREA	Santa Fe	La María	102	36	0
12	CREA	Santa Fe	Margarita	58	35	sin datos
13	CREA	Santa Fe	Ramayón	406	Perdida	1
14	CREA	Santa Fe	Soledad	106	15	4
15	CREA	Santa Fe	Hersilia	1050	34	8
16	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	35	26	0
17	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	sin datos	350	sin datos
18	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	sin datos	335	Perdida
19	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	43	53	Perdida
20	CREA	Santa Fe	Vera y Pintado	0	sin datos	sin datos
21	CREA	Santa Fe	La Osa	438	Perdida	7
22	CREA	Santa Fe	Malabrigo	840	95	12
23	INTA	Formosa	El colorado	69	52	63
24	INTA	Formosa	Comandante Fontana	31	117	208
25	CREA	Santa Fe	Arroyo Ceibal	Perdida	2	0
26	AAPPCE	Santa Fe	Villa Minetti	sin datos	8	4
27	AAPPCE	Santa Fe	Santa Margarita	162	142	16
28	AAPRESID	Santa Fe	Villa Minetti	1160	sin datos	sin datos
29	INTA	Santa Fe	Reconquista	1008	11	11
30	INTA	Santa Fe	Calchaquí	157	72	11
31	INTA	Santa Fe	Logroño	331	50	2
32	INTA	Santa Fe	San javier	148	11	0
33	INTA	Santa Fe	La sarita	1164	190	7
34	CREA	Santa Fe	Emilia	16	sin datos	0
35	CREA	Santa Fe	Ambrosetti	480	75	1
36	CREA	Santa Fe	La Pelada	6	2	0
37	CREA	Chaco	San Bernardo	16	sin datos	0
38	CREA	Santa Fe	Crespo		2	0
39	CREA	Santa Fe	Colonia Esther	11	10	0
40	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	11	7	12
41	CREA	Chaco	La Montenegrina	Perdida	2	1
42	CREA	Santiago del Estero	Puna	Perdida	1025	17
43	CREA	Formosa	Perin	469	33	sin datos
44	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	80	235	11
45	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	203	450	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

46	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	Perdida	13	Perdida
47	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	423	762	147
48	AAPPCE	Santiago del Estero	Col. Mackinlay	sin datos	19	8
49	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	sin datos	sin datos	130
50	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	sin datos	5	220
51	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	59	258	22
52	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	39	24	sin datos
53	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	sin datos	sin datos	49
54	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	sin datos	84	26
55	CREA	Chaco	Palo blanco	123	42	5
56	CREA	Chaco	Pampa del Infierno	730	440	55
57	CREA	Chaco	Castelli	8		24
58	CREA	Chaco	Bajo Hondo	5	15	3
59	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	71	31	3
60	CREA	Chaco	Charata	166	200	250
61	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	870	235	7
62	INTA	Santiago del Estero	Añatuya	1176	908	84
63	INTA	Santiago del Estero	Malbran	2	0	0
64	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	675	1118	59
65	CREA	Santiago del Estero	La Rosita	200	220	300
66	CREA	Chaco	Gancedo	Perdida	550	500
67	CREA	Chaco	Las Breñas	200	200	0
68	CREA	Santiago del Estero	Girardet	240	300	300
69	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	200	450	400
70	CREA	Santiago del Estero	El colorado	250	400	400
71	CREA	Formosa	Las Lomitas	254	46	sin datos
72	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	Perdida	217	29
73	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	27	21	49
74	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	1040	763	63
75	CREA	Chaco	Las Piedras	sin datos	0	0
76	AAPRESID	Santiago del Estero	Avia Terai	sin datos	120	sin datos
77	AAPRESID	Santiago del Estero	Ahí Veremos	sin datos	sin datos	58
78	AAPPCE	Santiago del Estero	La Victoria			6

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 46° (01/07 al 16/07), 47° (17/07 al 31/07) y 48° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 17 de agosto de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				46° Lectura	47° Lectura	48° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	3	1	Perdida
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	Perdida	0	10
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	174	208	16
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	1	9	13
5	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	4	6	13
6	INTA	Corrientes	Mercedes	3	7	16
7	INTA	Corrientes	Virasoro	4	3	3
8	INTA	Corrientes	Goya	0	1	0
9	INTA	Corrientes	Curuzú	0	Perdida	0
10	INTA	Corrientes	Esquina	45	0	0
11	INTA	Corrientes	Monte Caseros	2	0	14
12	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	0	1	3
13	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	0	Perdida	0
14	AAPPCE	Entre Ríos	San Salvador	13	9	1
15	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	18	18	1
16	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	1	1	0
17	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	9	1	0
18	AAPRESID	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	0
19	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	12	2	0
20	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	2	0	0
21	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	6	1	0
22	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	0	0	0
23	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	12	6	Perdida
24	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	Perdida	0	0
25	CREA	Entre Ríos	La Paz	16	3	1
26	CREA	Entre Ríos	Feliciano	0	0	0
27	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	Perdida	0	Perdida
28	CREA	Entre Ríos	Gualeguay	0	2	0
29	CREA	Entre Ríos	Gualeguaychu	0	0	0
30	CREA	Entre Ríos	Victoria	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

31	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	2	2	1
32	INTA	Entre Ríos	María Grande	1	19	0
33	INTA	Entre Ríos	Nogoya	0	0	0
34	INTA	Entre Ríos	Villaguay	1	0	0
35	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	4	1	0
36	INTA	Entre Ríos	Diamante	5	2	0
37	INTA	Entre Ríos	Gualedguay	0	0	0
38	INTA	Entre Ríos	Parana	51	48	1
39	AAPPCE	Entre Ríos	Villa Mantero	0	0	0

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 46° (01/07 al 16/07), 47° (17/07 al 31/07) y 48° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 17 de agosto de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				46° Lectura	47° Lectura	48° Lectura
1	AAPPCE	Córdoba	Corralito	0	34	Perdida
2	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	4	22	1
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	10	37	4
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	2	1	3
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	137	293	127
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	22	56	Sin datos
7	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	107	179	29
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	12	18	Sin datos
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	0	sin datos
10	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	28	14	sin datos
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	196	260	155
12	AAPRESID	Córdoba	Devoto	46	13	3
13	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	2	0	sin datos
14	AAPRESID	Córdoba	Eufasio Loza	2320	800	590
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	5	7	Perdida
16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	45	120	76
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	306	674	sin datos
18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	98	101	57
19	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	46	53	0
20	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	496	211	32

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

21	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	138	150	sin datos
22	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	69	56	60
23	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	86	sin datos	sin datos
24	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	23	30	27
25	AAPRESID	Córdoba	Hernando	3	sin datos	sin datos
26	CREA	Córdoba	Colonia Tirollesa	4	42	sin datos
27	CREA	Córdoba	Piquillín	52	18	1
28	CREA	Córdoba	Las Chilcas	39	sin datos	251
29	CREA	Córdoba	Sebastián Elcano	174	24	5
30	CREA	Córdoba	El Tío	228	59	44
31	CREA	Córdoba	Las Astillas	1254	441	sin datos
32	CREA	Córdoba	Tala Norte	95	26	39
33	CREA	Córdoba	Mi Granja	484	89	12
34	CREA	Córdoba	Sacanta	7	40	0
35	CREA	Córdoba	Sinsacate	235	26	4
36	INTA	Córdoba	Manfredi	30	22	16
37	INTA	Córdoba	San Francisco	32	25	Perdida
38	INTA	Córdoba	Brinkmann	170	99	23
39	AAPRESID	San Luis	La Toma	8	8	5
40	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	7	64	16
41	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	14	4	3
42	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	7	8	Perdida
43	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	1	28	0
44	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	12	4	1
45	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	23	108	Perdida
46	AAPPCE	Santa Fe	Pilar	16	Sin datos	Perdida
47	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	4	146	35
48	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	0	0	0
49	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	2	0	2
50	AAPPCE	Santa Fe	Vila	2	0	Perdida
51	AAPPCE	Santa Fe	López	7	6	2
52	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	32	29	6
53	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	14	0	1
54	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	sin datos	sin datos	0
55	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	10	8	2
56	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	0	3	0
57	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	22	6	0
58	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	69	17	0
59	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	5	32	5
60	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	2	sin datos	2
61	AAPRESID	Santa Fe	San Bernardo	19	6	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

62	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	7	7	3
63	CREA	Santa Fe	Ataliva	5	6	0
64	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	4	8	0
65	CREA	Santa Fe	Crispi	18	4	0
66	CREA	Santa Fe	Esperanza	5	0	0
67	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	4	5	sin datos
68	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	1	0	0
69	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	sin datos	1	0
70	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	0	3	0
71	CREA	Santa Fe	San Fabián	1	0	0
72	CREA	Santa Fe	San Martín de las Escobas	4	21	6
73	CREA	Santa Fe	Clucellas	3	11	0
74	INTA	Santa Fe	Centeno	9	37	0
75	INTA	Santa Fe	Rafaela	287	100	5
76	INTA	Santa Fe	Ceres	2423	463	2
77	INTA	Santa Fe	San Justo	sin datos	Perdida	Perdida

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 46° (01/07 al 16/07), 47° (17/07 al 31/07) y 48° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 17 de agosto de 2026. Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				46° Lectura	47° Lectura	48° Lectura
1	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	4	3	1
2	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
3	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	0	0
4	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
5	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
6	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
7	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	0
8	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	0	0	0
9	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	1	0	0
10	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	0	0
11	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
12	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0
13	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
14	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

15	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	0	0
16	AAPPCE	Buenos Aires	Rafael Obligado	0	0	0
17	AAPPCE	Buenos Aires	Florentino Ameghino	0	0	0
18	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	0	0	0
19	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
20	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	2	0	0
21	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	0	sin datos	sin datos
22	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	0	0	0
23	AAPPCE	Buenos Aires	Pedro Gamen	0	0	0
24	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	0	0	0
25	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
26	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
27	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	0
28	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	0	0
29	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
30	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	0	0
31	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	sin datos	0	0
32	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	0	0	sin datos
33	AAPRESID	Buenos Aires	Chillar	sin datos	0	0
34	AAPRESID	Buenos Aires	Puan	sin datos	sin datos	Perdida
35	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	0	0
36	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	0	0	0
37	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	0	1	sin datos
38	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
39	CREA	Buenos Aires	América	0	0	0
40	CREA	Buenos Aires	Casey	sin datos	0	0
41	CREA	Buenos Aires	Guanaco	0	0	0
42	CREA	Buenos Aires	Henderson	0	0	0
43	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	0	0	sin datos
44	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	0	0	sin datos
45	CREA	Buenos Aires	Orense	0	0	0
46	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0
47	CREA	Buenos Aires	San Pedro	1	0	0
48	CREA	Buenos Aires	Alberdi	0	0	0
49	CREA	Buenos Aires	Junín	0	0	0
50	CREA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0
51	CREA	Buenos Aires	Catriló	1	0	0
52	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	0	0	Perdida
53	INTA	Buenos Aires	Pergamino	4	1	0
54	INTA	Buenos Aires	Conesa	3	0	2

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

55	INTA	Buenos Aires	San antonio de Areco	3	2	0
56	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
57	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	1	0	0
58	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	Perdida	0	0
59	INTA	Buenos Aires	Bolivar	0	0	0
60	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	Perdida	0	0
61	INTA	Buenos Aires	Balcarce	0	0	0
62	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	0	1	0
63	AAPPCE	Córdoba	General Roca	0	0	0
64	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	0	2	0
65	AAPPCE	Córdoba	La playosa	0	0	0
66	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	0	0	0
67	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	0	0	0
68	AAPPCE	Córdoba	Villa María	0	0	0
69	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	0	1	0
70	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	0
71	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	4	Perdida	2
72	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	0	0	0
73	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	1	1	0
74	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	0
75	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	3	0	0
76	AAPRESID	Córdoba	Pegasano	1	0	0
77	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	6	1	1
78	CREA	Córdoba	General Levalle	5	1	0
79	CREA	Córdoba	La Carlota	3	1	2
80	CREA	Córdoba	Melo	5	4	0
81	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	6	2	1
82	CREA	Córdoba	Villa valeria	1	1	0
83	CREA	Córdoba	Monte Buey	sin datos	5	sin datos
84	INTA	Córdoba	Marcos Juarez 2	0	0	0
85	CREA	Córdoba	Ballesteros	1	3	sin datos
86	CREA	Córdoba	La Brianza	0	3	0
87	AAPPCE	Córdoba	Achiras	0	0	0
88	AAPPCE	La Pampa	Macachín	0	0	0
89	CREA	La Pampa	General Pico	0	0	0
90	CREA	La Pampa	Quemú Quemú	0	0	0
91	CREA	La Pampa	Santa Rosa	0	0	0
92	INTA	La Pampa	Anguil 1	0	0	0
93	AAPPCE	La Pampa	Winifreda	0	0	0
94	AAPPCE	La Pampa	Ing. Luiggi	0	sin datos	0
95	AAPRESID	San Luís	La Angelina	0	0	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

96	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	0	0	0
97	CREA	San Luís	Buena Esperanza	0	3	0
98	CREA	San Luís	Juan Jorba	2	1	0
99	INTA	San Luís	San Luis 1	3	0	0
100	CREA	San Luís	Naschel	2	2	3
101	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	0	0	0
102	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	0	0
103	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	1	3	0
104	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	1	5	1
105	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	0	0	0
106	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	391	191	4
107	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	0	0	0
108	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	3	0	0
109	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	0	0	0
110	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	7	5	0
111	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	Perdida	0	Perdida
112	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	0	0	0
113	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	2	11	0
114	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	0	1	0
115	INTA	Santa Fe	Pujato	17	16	1
116	INTA	Santa Fe	Cañada de Gómez	0	0	0
117	AAPPCE	Santa Fe	Los Quirquinchos	0	0	0

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (**AAPPCE**), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (**AAPRESID**), Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (**CASAFE**), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (**CONICET**), Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (**CREA**), Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (**EEAOC**), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (**INTA**), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (**MAIZAR**), y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (**SENASA**).

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.




Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas.** Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
1 a 4 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
5 a 20 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
21 a 50 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
51 a 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
> 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa