



RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 49


01 de septiembre de 2026



AAPPCE



Aapresid



01 DE SEPTIEMBRE DE 2026

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)

INFORME N°49

18 de agosto al 31 de agosto de 2026

En este cuadragésimo noveno informe se relevaron en total 317 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (42 localidades), NEA (66 localidades), Litoral (35 localidades), Centro Norte (68 localidades) y Centro Sur (106 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 5 localidades de Uruguay.

Para cada región se evaluó cómo evolucionaron las capturas utilizando dos enfoques: un gráfico de torta para representar el resultado de todas las trampas y un gráfico de barras para comparar los valores de captura de los meses de julio y agosto de 2026 con los de iguales meses del 2025.

Adicionalmente, se presentan datos sobre el porcentaje de individuos de *D. maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) en dos localidades monitoreadas del NOA y una de la región Centro-Norte. Los resultados evidenciaron ausencia de detección del patógeno en Los Altos (Catamarca) durante julio y agosto, y en Río Primero (Córdoba) durante agosto. En contraste, en San Agustín (Tucumán) se registraron bajos niveles de portación de CSS, con valores del 3% en julio y del 13% en agosto.

En la región NOA se evidenció una fuerte retracción poblacional de *D. maidis*, con una marcada caída de las localidades con >100 adultos por trampa, que pasaron del 74% al 43% y finalmente al 10% en las últimas tres lecturas. En paralelo, la población se desplazó hacia niveles de menor abundancia, predominando actualmente la categoría de 5 a 20 adultos por trampa (40%), lo que confirma una clara tendencia de descenso regional del vector (Figura 3).

En la región NEA se profundizó la retracción poblacional de *D. maidis*, con una marcada reducción de las localidades con >100 adultos por trampa, que disminuyeron del 44% al 17% y finalmente al 5% en las últimas tres lecturas. Paralelamente, la ausencia del vector aumentó del 3% al 21% y alcanzó el 27% en la segunda quincena de agosto (Figura 5).

En la región Litoral se consolidó la retracción poblacional de *D. maidis*, con un aumento sostenido de localidades con ausencia del vector, que pasó del 40% al 64%

y alcanzó el 68% en las últimas tres lecturas. Asimismo, el 26% de las localidades presentó capturas de apenas 1 a 4 adultos por trampa, confirmando un escenario regional caracterizado por muy baja abundancia del vector (Figura 7).

En la región Centro-Norte se profundizó la retracción poblacional de *D. maidis*, con una marcada reducción de las localidades con >100 adultos por trampa, que disminuyeron del 19% al 7% y finalmente al 3% en las últimas tres lecturas. En paralelo, la ausencia del vector aumentó del 13% al 34% y alcanzó el 38%, mientras que el 40% de las localidades presentó capturas de apenas 1 a 4 adultos por trampa, consolidando un escenario regional de baja abundancia del vector (Figura 9).

En la región Centro-Sur se mantuvo un escenario de muy baja abundancia de *D. maidis*, con ausencia del vector en el 93% de las localidades relevadas. El 7% restante presentó capturas de apenas 1 a 4 adultos por trampa, sin registros en categorías superiores, consolidando a esta región como la de menor presencia del vector (Figura 11).

En todas las regiones evaluadas se consolidó una retracción poblacional de *D. maidis* durante agosto, con una disminución generalizada de las categorías de mayor abundancia y un desplazamiento hacia niveles de captura bajos o ausencia del vector. No obstante, las regiones NOA y NEA (áreas endémicas) y Centro-Norte (área de transición) aún mantienen niveles poblacionales superiores a los registrados en igual período de 2025, particularmente en localidades puntuales. En contraste, en las regiones Litoral y Centro-Sur la retracción se profundizó, configurando un escenario de muy baja abundancia y elevada proporción de localidades sin detección del vector, similar al observado durante el mismo período de 2025.

En este escenario, resulta fundamental mantener un monitoreo activo y sistemático de *D. maidis*, especialmente en aquellas zonas donde comienzan a implantarse los primeros maíces, a fin de detectar tempranamente posibles cambios en la abundancia del vector de cara a la nueva campaña. Asimismo, continúa siendo prioritario el control de maíces voluntarios, evitando la continuidad del “puente verde” que puede favorecer la supervivencia y persistencia del vector entre campañas. Finalmente, la evolución de las condiciones ambientales durante la transición invierno-primavera, incluida la eventual ocurrencia de heladas tardías, podría contribuir a profundizar la retracción poblacional observada.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, en el que el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 49ª lectura (18/08 al 31/08).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el vigésimo quinto al cuadragésimo noveno informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas 47° (17/07 al 31/07), 48° (01/08 al 17/08) y 49° (18/08 al 31/08).

Comentarios Región NOA

Se relevaron 42 localidades, donde el 98% de las trampas registraron presencia del vector. La categoría más frecuente correspondió de 5 a 20 adultos por trampa, que representó el **40%**. No obstante, se observó una marcada retracción de la máxima categoría respecto del relevamiento previo (**Figura 3**). Las localidades que registraron las mayores capturas fueron **Las Cejas (Tucumán)**, con **495** adultos por trampa y **Metán (Salta)**, con **400** adultos por trampa. Durante agosto de 2026 se profundizó la retracción poblacional de *D. maidis*, con capturas que descendieron de **457,51 adultos/trampa** a fines de julio a **46,05** en la segunda quincena de agosto. A pesar de esta reducción cercana al 90%, los valores se mantuvieron superiores a los registrados en 2025, evidenciando una mayor abundancia del vector en la región (**Figura 4**).




Figura 4. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región NOA, correspondiente a la segunda quincena de julio y a la primera y segunda quincena de agosto de 2025 y 2026.

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. NOA

En el mes de julio de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en las Localidades de San Agustín (Tucumán) y Los Altos (Catamarca), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de **Corn Stunt Spiroplasma (CSS)**, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región NOA.

Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
San Agustín	Tucumán	julio	Trigo	30	3%
Los Altos	Catamarca	julio	Trigo	30	0%
San Agustín	Tucumán	agosto	Trigo	30	13%
Los Altos	Catamarca	agosto	Trigo	30	0%

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)




Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 47° (17/07 al 31/07), 48° (01/08 al 17/08) y 49° (18/08 al 31/08).

Comentarios Región NEA

Del relevamiento realizado en 66 localidades, se detectó la presencia de *D. maidis* en el **73%** de los sitios monitoreados. La categoría de captura predominante correspondió a **1–4 adultos por trampa**, representando el **35%** de las localidades evaluadas (**Figura 5**). Las mayores abundancias se concentraron en la provincia de Chaco, destacándose **Pampa del Infierno**, con el máximo registro del período, alcanzando **612 adultos por trampa**. Durante agosto de 2026 se profundizó la retracción poblacional de *Dalbulus maidis*, con capturas que descendieron de **186,82 adultos/trampa** a fines de julio a **20,17** en la segunda quincena de agosto. Si bien la abundancia se redujo cerca del **90%**, los valores se mantuvieron marcadamente superiores a los registrados en 2025 (**Figura 6**).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 6. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región NEA, correspondiente a la segunda quincena de julio y a la primera y segunda quincena de agosto de 2025 y 2026.

Resumen Región Litoral




Figura 7. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 47° (17/07 al 31/07), 48° (01/08 al 17/08) y 49° (18/08 al 31/08).

Comentarios Región Litoral

En la región del Litoral se relevaron 35 localidades, con un marcado predominio de la ausencia del vector (**68%**). En el 32% restante se registró presencia de *D. maidis*, aunque con niveles de abundancia bajos (**< 5 adultos por trampa**), como se detalla en la **Figura 7**. Entre las localidades previamente monitoreadas, **Mercedes** presentó la mayor captura, con 5 adultos por trampa. Cabe destacar la incorporación, por primera vez, de la provincia de **Misiones a la Red Nacional de Monitoreo**, a través de la localidad de **Montecarlo**, donde se registraron **157 adultos por trampa**, constituyendo la mayor captura de la región durante este período. Durante agosto de 2026 se profundizó la retracción poblacional de *Dalbulus maidis*, con capturas que descendieron de **9,49 adultos/trampa** a fines de julio a **0,59** en la segunda quincena de agosto. La abundancia del vector se redujo más del **90%**, alcanzando hacia fines de agosto valores prácticamente similares a los registrados en 2025 (**Figura 8**).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 8. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Litoral, correspondiente a la segunda quincena de julio y a la primera y segunda quincena de agosto de 2025 y 2026.

Resumen Región Centro Norte




Figura 9. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 47° (17/07 al 31/07), 48° (01/08 al 17/08) y 49° (18/08 al 31/08).

Comentarios Región Centro Norte

En esta región, en un 38% de las localidades relevadas no se registró al vector. En aquellas donde hubo capturas (62%), predominaron las categorías de **1 a 4 adultos por trampa (40%)**, como se detalla en la **Figura 9**. Las mayores capturas de *D. maidis* correspondieron a **San Guillermo (Santa Fe) con 65 adultos**. Durante agosto de 2026 se profundizó la retracción poblacional de *Dalbulus maidis*, con capturas que descendieron de **74,04 adultos/trampa** a fines de julio a **5,47** en la segunda quincena de agosto. Si bien los valores se mantuvieron por encima de 2025, la abundancia del vector se redujo más del 90% durante el período analizado (**Figura 10**).




Figura 10. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Centro-Norte, correspondiente a la segunda quincena de julio y a la primera y segunda quincena de agosto de 2025 y 2026.

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región Centro Norte

En el mes de agosto de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en las Localidad de Rio Primero (Córdoba), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS), mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región Centro Norte. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
Rio Primero	Córdoba	agosto	Maíz voluntario	30	0%

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Centro Sur




Figura 11. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 47° (17/07 al 31/07), 48° (01/08 al 17/08) y 49° (18/08 al 31/08).

Comentarios Región Centro Sur

De las 106 localidades relevadas, en un **93%** no se registró detecciones de *D. maidis* (**Figura 11**), observándose la mayor captura en las localidades de **Ballestero y Pegasano (Córdoba)** con **3 adultos**. Durante agosto de 2026 se profundizó la retracción poblacional de *Dalbulus maidis*, con capturas que descendieron de **2,40 adultos/trampa** a fines de julio a **0,12** en la segunda quincena de agosto. Si bien 2026 partió de niveles superiores a 2025, hacia fines de agosto la abundancia del vector se redujo a valores mínimos (**Figura 12**).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 12. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Centro-Sur, correspondiente a la segunda quincena de julio y a la primera y segunda quincena de agosto de 2025 y 2026.

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa 47° (17/07 al 31/07), 48° (01/08 al 17/08) y 49° (18/08 al 31/08).

N° Loc.	Institución	Nombre de trampa	Localidad	47° Lectura	48° Lectura	49° Lectura
1	AGTSA	2025 MERCEDES UY - AGTSA	Mercedes		0	0
2	AGTSA	2025 NUEVA HELVECIA - AGTSA (SAN PEDRO)	Nueva Helvecia		0	0
3	AGTSA	2025 LAS ARMAS	Colonia	1	0	0
4	AGTSA	2025 CORRALITO - AGTSA	Palmitas		0	0
5	AGTSA	2025 Young 2 - AGTSA	Young	21	0	0

Comentarios Uruguay

Durante el período evaluado, no se registró presencia de *D. maidis* en ninguna de las cinco localidades monitoreadas de la República Oriental del Uruguay. Este escenario resulta concordante con la marcada retracción poblacional observada en la región Litoral, donde predominan las localidades con ausencia del vector.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 47° (17/07 al 31/07), 48° (01/08 al 17/08) y 49° lectura correspondiente al periodo comprendido del 18 al 31 de agosto de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				47° Lectura	48° Lectura	49° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	2	0	0
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	10	5	2
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	12	10	4
4	INTA	Jujuy	El Bananal	1195	Perdida	143
5	INTA	Jujuy	Viñalito	758	228	19
6	AAPPCE	Salta	Agua Sucia	552	84	sin datos
7	AAPPCE	Salta	Rio Piedras	481	58	16
8	AAPRESID	Salta	Rivadavia	59	0	1
9	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	570	182	25
10	CREA	Salta	Copo Quiles	sin datos	28	sin datos
11	CREA	Salta	El Galpón	1910	648	51
12	CREA	Salta	El Tunal	723	sin datos	sin datos
13	CREA	Salta	Las Lajitas T3	919	691	sin datos
14	CREA	Salta	Metan 1	90	21	5
15	CREA	Salta	Metan 2	696	454	18
16	CREA	Salta	Mosconi	18	10	3
17	INTA	Salta	Metán	104	408	400
18	AAPPCE	Tucumán	Tusquita	479	242	15
19	CREA	Tucumán	Alto Verde	120	8	1
20	CREA	Tucumán	Burruyacu	210	550	7
21	CREA	Tucumán	Garmendia	56	30	14
22	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	114	10	11
23	CREA	Tucumán	La Bajada	14	5	5
24	CREA	Tucumán	La Cocha 1	200	62	26
25	CREA	Tucumán	La Cruz	1386	321	6
26	CREA	Tucumán	La Invernada	498	64	16
27	CREA	Tucumán	La Virginia	136	93	38
28	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	297	617	97
29	CREA	Tucumán	Las Cejas	5000	1640	495
30	CREA	Tucumán	Los Pereyra	Perdida	18	16
31	CREA	Tucumán	Los Puestos	269	230	10

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

32	CREA	Tucumán	Piedrabuena	223	103	33
33	CREA	Tucumán	Rapelli	sin datos	420	73
34	CREA	Tucumán	Río Colorado	98	6	1
35	CREA	Tucumán	Rumi Punco	148	39	12
36	CREA	Tucumán	San Agustín	212	177	39
37	CREA	Tucumán	Tacanas	40	178	63
38	CREA	Tucumán	Taco Ralo	171	21	17
39	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	254	177	23
40	CREA	Tucumán	Trancas	sin datos	sin datos	sin datos
41	CREA	Tucumán	Viclos	54	64	Perdida
42	INTA	Tucumán	Leales	12	0	Perdida
43	AAPPCE	Tucumán	Tala Pozo	sin datos	30	20
44	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	186	73	45
45	CREA	Santiago del Estero	El Charco	123	166	5
46	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	983	125	sin datos
47	CREA	Santiago del Estero	Frias	224	93	5
48	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	213	22	4
49	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	197	84	89
50	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	680	480	115
51	CREA	Santiago del Estero	Vinará	Perdida	86	11
52	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	680	Perdida	Perdida
53	CREA	Catamarca	El Abra	395	247	47
54	CREA	Catamarca	Los Altos	639	313	59
55	CREA	Catamarca	Frias	sin datos	sin datos	19
56	INTA	Catamarca	Los Altos	8	3	2

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 47° (17/07 al 31/07), 48° (01/08 al 17/08) y 49° lectura correspondiente al periodo comprendido del 18 al 31 de agosto de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				47° Lectura	48° Lectura	49° Lectura
1	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	23	20	sin datos
2	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	sin datos	sin datos	101
3	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	112	0	0
4	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	sin datos	43	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

5	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	133	4	0
6	INTA	Chaco	Tres Isletas	72	15	4
7	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	455	525	612
8	INTA	Chaco	Las Breñas	266	28	1
9	INTA	Chaco	Juan José Castelli	296	28	2
10	INTA	Chaco	Sylvina	13	0	0
11	INTA	Chaco	Saenz Peña			2
12	INTA	Chaco	Basail	44	25	10
13	CREA	Santa Fe	La María	36	0	0
14	CREA	Santa Fe	Margarita	35	sin datos	0
15	CREA	Santa Fe	Ramayón	Perdida	1	0
16	CREA	Santa Fe	Soledad	15	4	0
17	CREA	Santa Fe	Hersilia	34	8	sin datos
18	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	26	0	1
19	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	350	sin datos	11
20	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	335	Perdida	6
21	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	53	Perdida	0
22	CREA	Santa Fe	La Osca	Perdida	7	6
23	CREA	Santa Fe	Malabrigo	95	12	3
24	INTA	Formosa	El colorado	52	63	3
25	INTA	Formosa	Comandante Fontana	117	208	124
26	CREA	Santa Fe	Arroyo Ceibal	2	0	0
27	AAPPCE	Santa Fe	Villa Minetti	8	4	0
28	AAPPCE	Santa Fe	Santa Margarita	142	16	6
29	AAPRESID	Santa Fe	Villa Minetti	sin datos	sin datos	5
30	CREA	Santiago del Estero	Weisburd	sin datos	sin datos	15
31	INTA	Santa Fe	Reconquista	11	11	1
32	INTA	Santa Fe	Calchaquí	72	11	4
33	INTA	Santa Fe	Logroño	50	2	1
34	INTA	Santa Fe	San javier	11	0	11
35	INTA	Santa Fe	La sarita	190	7	2
36	CREA	Santa Fe	Emilia	sin datos	0	0
37	CREA	Santa Fe	Ambrosetti	75	1	0
38	CREA	Santa Fe	La Pelada	2	0	0
39	CREA	Chaco	San Bernardo	sin datos	0	0
40	CREA	Santa Fe	Crespo	2	0	0
41	CREA	Santa Fe	Colonia Esther	10	0	0
42	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	7	12	2
43	CREA	Chaco	La Montenegrina	2	1	3
44	CREA	Santiago del Estero	Puna	1025	17	1
45	CREA	Formosa	Perin	33	sin datos	60

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

46	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	235	11	10
47	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	450	1	7
48	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	13	Perdida	24
49	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	762	147	13
50	AAPPCE	Santiago del Estero	Col. Mackinlay	19	8	2
51	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	sin datos	130	sin datos
52	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	5	220	sin datos
53	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	258	22	3
54	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	24	sin datos	sin datos
55	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	sin datos	49	sin datos
56	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	84	26	10
57	CREA	Chaco	Palo blanco	42	5	1
58	CREA	Chaco	Pampa del Infierno	440	55	9
59	CREA	Chaco	Castelli		24	2
60	CREA	Chaco	Bajo Hondo	15	3	5
61	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	31	3	1
62	CREA	Chaco	Charata	200	250	Perdida
63	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	235	7	0
64	INTA	Santiago del Estero	Añatuya	908	84	Perdida
65	INTA	Santiago del Estero	Malbran	0	0	1
66	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	1118	59	8
67	CREA	Santiago del Estero	La Rosita	220	300	20
68	CREA	Chaco	Gancedo	550	500	5
69	CREA	Chaco	Las Breñas	200	Perdida	Perdida
70	CREA	Santiago del Estero	Girardet	300	300	100
71	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	450	400	100
72	CREA	Santiago del Estero	El colorado	400	400	Perdida
73	CREA	Formosa	Las Lomitas	46	sin datos	0
74	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	217	29	3
75	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	21	49	7
76	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	763	63	2
77	CREA	Chaco	Las Piedras	0	0	sin datos
78	AAPRESID	Santiago del Estero	Avia Terai	120	sin datos	sin datos
79	AAPRESID	Santiago del Estero	Ahí Veremos	sin datos	58	sin datos
80	AAPPCE	Santiago del Estero	La Victoria		6	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 47° (17/07 al 31/07), 48° (01/08 al 17/08) y 49° lectura correspondiente al periodo comprendido del 18 al 31 de agosto de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				47° Lectura	48° Lectura	49° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	1	Perdida	1
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	0	10	4
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	208	16	0
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	9	13	sin datos
5	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	6	13	2
6	INTA	Corrientes	Mercedes	7	16	5
7	INTA	Corrientes	Virasoro	3	3	0
8	INTA	Corrientes	Goya	1	0	1
9	INTA	Corrientes	Curuzú	Perdida	0	0
10	INTA	Corrientes	Esquina	0	0	0
11	INTA	Corrientes	Monte Caseros	0	14	3
12	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	1	3	sin datos
13	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	Perdida	0	sin datos
14	AAPPCE	Entre Ríos	San Salvador	9	1	sin datos
15	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	18	1	sin datos
16	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	1	0	0
17	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	1	0	0
18	AAPRESID	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	0
19	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	2	0	0
20	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	0	0	0
21	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	1	0	0
22	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	0	0	0
23	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	6	Perdida	1
24	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	0	0	0
25	CREA	Entre Ríos	La Paz	3	1	0
26	CREA	Entre Ríos	Feliciano	0	0	0
27	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	0	Perdida	0
28	CREA	Entre Ríos	Gualeguay	2	0	0
29	CREA	Entre Ríos	Guauguaychu	0	0	0
30	CREA	Entre Ríos	Victoria	0	0	0
31	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	2	1	1
32	INTA	Entre Ríos	Maria Grande	19	0	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

33	INTA	Entre Ríos	Nogoya	0	0	0
34	INTA	Entre Ríos	Villaguay	0	0	0
35	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	1	0	0
36	INTA	Entre Ríos	Diamante	2	0	0
37	INTA	Entre Ríos	Gualeduay	0	0	0
38	INTA	Entre Ríos	Parana	48	1	1
39	AAPPCE	Entre Ríos	Villa Mantero	0	0	0
40	INTA	Misiones	Montecarlo			157

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 47° (17/07 al 31/07), 48° (01/08 al 17/08) y 49° lectura correspondiente al periodo comprendido del 18 al 31 de agosto de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				47° Lectura	48° Lectura	49° Lectura
1	AAPPCE	Córdoba	Corralito	34	Perdida	0
2	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	22	1	0
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	37	4	3
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	1	3	1
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	293	127	27
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	56	Sin datos	sin datos
7	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	179	29	5
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	18	Sin datos	sin datos
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	0	0
10	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	14	sin datos	6
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	260	155	28
12	AAPRESID	Córdoba	Devoto	13	3	1
13	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	0	sin datos	0
14	AAPRESID	Córdoba	Eufasio Loza	800	590	57
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	7	Perdida	0
16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	120	76	2
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	674	sin datos	2
18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	101	57	7
19	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	53	0	4
20	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	211	32	3
21	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	150	sin datos	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

22	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	56	60	20
23	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	30	27	2
24	CREA	Córdoba	Colonia Tirolesa	42	sin datos	20
25	CREA	Córdoba	Piquillín	18	1	3
26	CREA	Córdoba	Las Chilcas	sin datos	251	Perdida
27	CREA	Córdoba	Sebastián Elcano	24	5	0
28	CREA	Córdoba	El Tío	59	44	5
29	CREA	Córdoba	Las Astillas	441	sin datos	28
30	CREA	Córdoba	Tala Norte	26	39	1
31	CREA	Córdoba	Mi Granja	89	12	3
32	CREA	Córdoba	Sacanta	40	0	1
33	CREA	Córdoba	Sinsacate	26	4	0
34	INTA	Córdoba	Manfredi	22	16	0
35	INTA	Córdoba	San Francisco	25	Perdida	12
36	INTA	Córdoba	Brinkmann	99	23	5
37	AAPRESID	San Luis	La Toma	8	5	0
38	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	64	16	4
39	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	4	3	Perdida
40	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	8	Perdida	1
41	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	28	0	0
42	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	4	1	1
43	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	108	Perdida	22
44	AAPPCE	Santa Fe	Pilar	Sin datos	Perdida	3
45	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	146	35	65
46	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	0	0	sin datos
47	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	0	2	sin datos
48	AAPPCE	Santa Fe	Vila	0	Perdida	3
49	AAPPCE	Santa Fe	López	6	2	4
50	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	29	6	5
51	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	0	1	0
52	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	sin datos	0	0
53	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	8	2	0
54	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	3	0	0
55	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	6	0	4
56	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	17	0	2
57	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	32	5	2
58	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	sin datos	2	0
59	AAPRESID	Santa Fe	San Bernardo	6	sin datos	1
60	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	7	3	3
61	CREA	Santa Fe	Ataliva	6	0	0
62	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	8	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

63	CREA	Santa Fe	Crispi	4	0	0
64	CREA	Santa Fe	Esperanza	0	0	2
65	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	5	Perdida	sin datos
66	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	0	0	0
67	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	1	0	0
68	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	3	0	0
69	CREA	Santa Fe	San Fabián	0	0	0
70	CREA	Santa Fe	San Martín de las Escobas	21	6	0
71	CREA	Santa Fe	Clucellas	11	0	1
72	INTA	Santa Fe	Centeno	37	0	1
73	INTA	Santa Fe	Rafaela	100	5	2
74	INTA	Santa Fe	Ceres	463	2	0
75	INTA	Santa Fe	San Justo	Perdida	Perdida	0

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 47° (17/07 al 31/07), 48° (01/08 al 17/08) y 49° lectura correspondiente al periodo comprendido del 18 al 31 de agosto de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				47° Lectura	48° Lectura	49° Lectura
1	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	3	1	0
2	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
3	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	0	0
4	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
5	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
6	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
7	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	0
8	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	0	0	0
9	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	0	0	0
10	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	0	0
11	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
12	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0
13	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
14	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	0	0	sin datos
15	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	0	Perdida
16	AAPPCE	Buenos Aires	Rafael Obligado	0	0	sin datos
17	AAPPCE	Buenos Aires	Florentino Ameghino	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

18	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	0	0	0
19	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
20	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	0	0	0
21	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	sin datos	sin datos	0
22	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	0	0	0
23	AAPPCE	Buenos Aires	Pedro Gamen	0	0	0
24	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	0	0	sin datos
25	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
26	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
27	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	0
28	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	0	0
29	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
30	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	0	Perdida
31	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	0	0
32	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	0	sin datos	0
33	AAPRESID	Buenos Aires	Chillar	0	0	sin datos
34	AAPRESID	Buenos Aires	Puan	sin datos	Perdida	sin datos
35	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	0	0
36	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	0	0	0
37	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	1	0	0
38	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
39	CREA	Buenos Aires	América	0	0	0
40	CREA	Buenos Aires	Casey	0	0	sin datos
41	CREA	Buenos Aires	Guanaco	0	0	0
42	CREA	Buenos Aires	Henderson	0	0	0
43	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	0	sin datos	0
44	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	0	sin datos	0
45	CREA	Buenos Aires	Orense	0	0	0
46	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0
47	CREA	Buenos Aires	San Pedro	0	0	0
48	CREA	Buenos Aires	Alberdi	0	0	0
49	CREA	Buenos Aires	Junín	0	0	0
50	CREA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0
51	CREA	Buenos Aires	Catriló	0	0	0
52	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	0	Perdida	0
53	INTA	Buenos Aires	Pergamino	1	0	0
54	INTA	Buenos Aires	Conesa	0	2	0
55	INTA	Buenos Aires	San antonio de Areco	2	0	0
56	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
57	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

58	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	0	0	0
59	INTA	Buenos Aires	Bolivar	0	0	0
60	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	0
61	INTA	Buenos Aires	Balcarce	0	0	0
62	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	1	0	0
63	AAPPCE	Córdoba	General Roca	0	0	0
64	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	2	0	0
65	AAPPCE	Córdoba	La playosa	0	0	0
66	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	0	0	0
67	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	0	0	0
68	AAPPCE	Córdoba	Villa María	0	0	0
69	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	1	0	0
70	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	0
71	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	Perdida	2	0
72	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	0	0	0
73	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	1	0	1
74	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	0
75	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	0	0	0
76	AAPRESID	Córdoba	Pegasano	0	0	3
77	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	1	1	2
78	CREA	Córdoba	General Levalle	1	0	0
79	CREA	Córdoba	La Carlota	1	2	0
80	CREA	Córdoba	Melo	4	0	0
81	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	2	1	0
82	CREA	Córdoba	Villa valeria	1	0	0
83	CREA	Córdoba	Monte Buey	5	sin datos	0
84	INTA	Córdoba	Marcos Juarez 2	0	0	0
85	CREA	Córdoba	Ballesteros	3	sin datos	3
86	CREA	Córdoba	La Brianza	3	0	0
87	AAPPCE	Córdoba	Achiras	0	0	0
88	AAPPCE	La Pampa	Macachín	0	0	0
89	CREA	La Pampa	General Pico	0	0	0
90	CREA	La Pampa	Quemú Quemú	0	0	0
91	CREA	La Pampa	Santa Rosa	0	0	0
92	INTA	La Pampa	Anguil 1	0	0	0
93	AAPPCE	La Pampa	Winifreda	0	0	0
94	AAPPCE	La Pampa	Ing. Luiggi	sin datos	0	0
95	AAPRESID	San Luís	La Angelina	0	sin datos	0
96	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	0	0	0
97	CREA	San Luís	Buena Esperanza	3	0	0
98	CREA	San Luís	Juan Jorba	1	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

99	INTA	San Lu�s	San Luis 1	0	0	0
100	CREA	San Lu�s	Naschel	2	3	0
101	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	0	0	0
102	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	0	0
103	AAPPCE	Santa Fe	M�ximo Paz	3	0	0
104	AAPPCE	Santa Fe	San Jer�nimo Sur	5	1	1
105	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	0	0	1
106	AAPPCE	Santa Fe	Timb�es	191	4	2
107	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	0	0	0
108	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	0	0	0
109	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	0	0	0
110	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	5	0	0
111	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	0	Perdida	0
112	AAPRESID	Santa Fe	Cha�ar Ladeado	0	0	0
113	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	11	0	0
114	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	1	0	0
115	INTA	Santa Fe	Pujato	16	1	Perdida
116	INTA	Santa Fe	Ca�ada de G�mez	0	0	0
117	AAPPCE	Santa Fe	Los Quirquinchos	0	0	0

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del ma z transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afect  gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarroll  una Red Nacional de Monitoreo con trampas crom ticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencion ndose a la Asociaci n Argentina de Protecci n Profesional de Cultivos Extensivos (**AAPPCE**), Asociaci n Argentina de Productores en Siembra Directa (**AAPRESID**), C mara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (**CASAFE**), Consejo Nacional de Investigaciones Cient ficas y T cnicas (**CONICET**), Consorcios Regionales de Experimentaci n Agr cola (**CREA**), Estaci n Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (**EEAOC**), Instituto Nacional de Tecnolog a Agropecuaria (**INTA**), Asociaci n Ma z y Sorgo Argentino (**MAIZAR**), y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (**SENASA**).

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas crom ticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de ma z en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infecci n estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma

La informaci n detallada en este informe est  sujeta a modificaciones que podr an surgir al momento de las auditor as de las trampas crom ticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del ma z (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

(CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.




Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas.** Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
1 a 4 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
5 a 20 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
21 a 50 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
51 a 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
> 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa