



RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 51

02 de octubre de 2026



AAPPCE



Aapresid



02 DE OCTUBRE DE 2026

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz, *Dalbulus maidis*

INFORME N°51

16 de septiembre al 01 de octubre de 2026

En este quincuagésimo primer informe se relevaron en total 340 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (62 localidades), NEA (73 localidades), Litoral (33 localidades), Centro Norte (68 localidades) y Centro Sur (104 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 3 localidades de Uruguay.

Para cada región se evaluó cómo evolucionaron las capturas utilizando dos enfoques: un gráfico de torta para representar el resultado de todas las trampas y un gráfico de líneas para comparar los valores de captura de los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 con los de iguales periodos del 2026.

Adicionalmente, se presentan los porcentajes de individuos de *D. maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) en dos localidades: Montecarlo (Misiones), en la región Litoral, y San Guillermo (Santa Fe), en Centro Norte. Durante septiembre, no se detectó el patógeno en los individuos analizados de Montecarlo, mientras que en San Guillermo se registró un 3% de portación.

En la región NOA continúa la retracción poblacional de *D. maidis*, con un desplazamiento hacia categorías de menor abundancia. La proporción de localidades sin capturas aumentó hasta el 24%, mientras que la categoría de 1 a 4 adultos por trampa fue la predominante (42%). Estos resultados confirman la tendencia de descenso de las poblaciones del vector a escala regional (Figura 3).

En la región NEA también se profundizó la retracción poblacional de *D. maidis*. La ausencia del vector se registró en el 58% de las localidades, mientras que la categoría de 1 a 4 adultos por trampa representó el 21%, consolidando la tendencia hacia niveles de menor abundancia regional (Figura 5).

En la región Litoral, las poblaciones de *D. maidis* se mantuvieron en niveles muy bajos, con ausencia del vector en el 85% de las localidades. El 15% restante registró capturas de entre 1 y 4 adultos por trampa, consolidando un escenario de muy baja abundancia regional (Figura 7).

En la región Centro Norte continuó la reducción de las poblaciones de *D. maidis*, con un aumento de las localidades sin capturas del 61% al 75% en el último relevamiento. Las localidades con presencia del vector se distribuyeron exclusivamente entre las categorías de 1 a 4 adultos por trampa (21%) y de 5 a 20 adultos por trampa (4%), consolidando un escenario de baja abundancia regional (Figura 9).

En el Centro Sur, en el 98% de las localidades no se registró a *D. maidis*, consolidando a esta región como la de menor presencia del vector (Figura 11).

A su vez, el Litoral presentó la mayor proporción de trampas instaladas en lotes de maíz temprano (67%), seguido por el NEA (30%), Centro Norte (28%), Centro Sur (12%) y el NOA (5%). En la tabla general de localidades de cada región, las trampas ubicadas sobre maíz implantado están identificadas con el símbolo “✓”.

En todas las regiones se continúa observando una retracción poblacional de *D. maidis* finalizando el mes de septiembre del 2026, con una disminución marcada de las categorías de mayor abundancia y un desplazamiento hacia niveles de captura bajos o de ausencia del vector (Figuras 1 y 2). Las regiones endémicas del NOA y NEA son las que tuvieron los mayores promedios de abundancia, ligeramente superiores a los registrados en igual período de 2025, aunque estos no alcanzaron los 10 adultos por trampa. En contraste, en el Litoral, Centro norte y Centro-Sur la retracción se profundizó, configurando un escenario de muy baja abundancia, con una elevada proporción de localidades donde no se detectó el vector, similar a lo observado durante el mismo período de 2025.

Bajo este escenario, resulta clave mantener un monitoreo activo y sistemático de *Dalbulus maidis*, considerando dos aspectos fundamentales:

✓ **Manejo de maíces voluntarios:** constituye un punto clave y prioritario, para interrumpir la continuidad del “puente verde”, evitando de esta forma la supervivencia y el mantenimiento del vector y del complejo de patógenos asociados al achaparramiento entre campañas.

✓ **Monitoreo de chicharrita en lotes con maíz de primera:** el monitoreo frecuente, desde la emergencia del cultivo, permitirá detectar tempranamente la presencia del vector. En estos maíces, las condiciones ambientales iniciales, suelen ser menos favorables para el desarrollo de la plaga, con una evolución más lenta de sus poblaciones. Este aspecto puede ofrecer ventajas a la hora de definir la adopción de algunas estrategias de manejo, basada en el monitoreo y detección del vector, con el objeto de minimizar su evolución y futuros daños sobre los maíces de primera y/o las siembras tardías de este cultivo.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Además, las condiciones ambientales durante la primavera, como amplitud térmica, podría contribuir a profundizar la retracción poblacional observada.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, en el que el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 51° lectura (16/09 al 01/10).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el vigésimo septimo al quincuagésimo primer informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 49° (18/08 al 31/08), 50° (01/09 al 15/09) y 51° (16/09 al 01/10).

Comentarios Región NOA

Se relevaron 62 localidades, de las cuales el **76%** registró presencia de *D. maidis*. Las categorías de 1 a 20 adultos por trampa fueron las más frecuentes y concentraron el **66%** de las localidades relevadas (**Figura 3**). **Huasa Pampa (Tucumán)** fue la única localidad ubicada en la categoría de mayor abundancia, con **202 adultos por trampa** (**Figura 3 y Tabla Región NOA**).

Durante la segunda quincena de septiembre de 2026 se continuó profundizando la retracción poblacional de *D. maidis*, con capturas que descendieron de **18,15 adultos/trampa** (1° quincena de septiembre) a **8,34 adultos/trampa** (2° quincena de

septiembre). A pesar de esta reducción, por encima del 54%, los valores se mantuvieron superiores a los registrados en iguales periodos del 2025 (**Figura 4**).




Figura 4. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región NOA, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 y 2026.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)




Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 49° (18/08 al 31/08), 50° (01/09 al 15/09) y 51° (16/09 al 01/10).

Comentarios Región NEA

Del relevamiento realizado en 73 localidades, en un **42%** se detectó la presencia de *D. maidis* (**Figura 5**). Dentro de la categoría de presencia la más frecuente fue la comprendida entre los niveles de **1 a 4 adultos por trampa**, representando el **22%** de las localidades relevadas en este monitoreo (**Figura 5**). La mayor abundancia se concentró en **Comandante Fontana** (Formosa), con un valor **177 adultos por trampa**, (**Figura 5 y Tabla Región NEA**).

Durante la segunda quincena de septiembre de 2026 se mantuvieron valores similares de la poblacional de *D. maidis*, con capturas de **5,24 adultos/trampa** (1° quincena de septiembre) a **6,85 adultos/trampa** (2° quincena de septiembre). En esta región los niveles de captura mantienen valores ligeramente superiores a los registrados en igual período del 2025. (**Figura 6**).




Figura 6. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región NEA, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 y 2026.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Litoral




Figura 7. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 49° (18/08 al 31/08), 50° (01/09 al 15/09) y 51° (16/09 al 01/10).

Comentarios Región Litoral

En la región Litoral se relevaron 33 localidades y la proporción sin capturas de *D. maidis* se mantuvo estable en el **85%**. La categoría de **1 a 4 adultos por trampa** predominó entre las localidades con presencia del vector y representó el **15%** del total relevado (**Figura 7**). **Montecarlo** (Misiones), **Copra y Monte Caseros** (Corrientes) registraron **3 adultos por trampa cada una**, destacando la marcada disminución de las capturas en **Montecarlo** respecto del monitoreo anterior (**Figura 7 y Tabla Región Litoral**).

Durante la segunda quincena de septiembre de 2026 el valor promedio de capturas (**0,36 chicharritas por trampa**) fue semejante al registrado en igual periodo del 2025 (**Figura 8**).




Figura 8. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Litoral, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 y 2026.

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región Litoral

En el mes de septiembre de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en las Localidad de Montecarlo (Misiones), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de **Corn Stunt Spiroplasma (CSS)**, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de Corn Stunt Spiroplasma (CSS). Región Litoral. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
Montecarlo	Misiones	septiembre	Maíz	30	0%

Resumen Región Centro Norte




Figura 9. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 49° (18/08 al 31/08), 50° (01/09 al 15/09) y 51° (16/09 al 01/10).

Comentarios Región Centro Norte

En esta región, se incrementaron las localidades que no registraron al vector, pasando de un **61% a un 75%** en este último informe (**Figura 9**). En aquellas localidades donde hubo capturas, solo se registraron las categorías de 1 a 4 adultos por trampa (**21%**), como se detalla en la **Figura 9**. Las mayores capturas de *D. maidis* corresponden a localidades de la provincia de Córdoba: **Colonia Tirolesa, Las Chilcas y Capilla Sitón, con 5 adultos por trampa (Tabla Región Centro Norte)**.

Durante la segunda quincena de septiembre de 2026 el valor promedio de capturas continuó disminuyendo, pasando de **1,65 chicharritas por trampa** (1° quincena de septiembre) a **0,60 adultos/trampa** (2° quincena de septiembre). Si bien los valores se mantuvieron levemente por encima de lo registrado en igual período del 2025, la abundancia del vector se redujo cerca de un 64% durante el período analizado (**Figura 10**).




Figura 10. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Centro-Norte, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 y 2026.

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región Centro Norte

En el mes de septiembre de 2026 se realizaron colectas de adultos de *D. maidis* en las Localidad de San Guillermo (Santa Fe), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS), mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región Centro Norte. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de <i>D. maidis</i>	% Portadores
San Guillermo	Santa Fe	septiembre	Maíz	30	3%

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Centro Sur




Figura 11. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 49° (18/08 al 31/08), 50° (01/09 al 15/09) y 51° (16/09 al 01/10).

Comentarios Región Centro Sur

De las 104 localidades relevadas, un **98%** no tuvieron detecciones de *D. maidis*, consolidándose la ausencia del vector en esta región (**Figura 11 y Tabla Región Centro Sur**).

Durante la primera segunda de septiembre de 2026 el valor promedio de capturas fue de **0,02 chicharritas por trampa**, nivel semejante a lo registrado durante el 2025 (**Figura 12**).




Figura 12. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Centro-Sur, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 y 2026.

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa. Lecturas 49° (16/08 al 31/08), 50° (01/09 al 15/09) y 51° (16/09 al 01/10).

N° Loc.	Institución	Localidad	49° Lectura	50° Lectura	51° Lectura
1	AGTSA	Mercedes	0	0	0
2	AGTSA	Nueva Helvecia	0	0	sin datos
3	AGTSA	Colonia	0	0	0
4	AGTSA	Palmitas	0	0	0
5	AGTSA	Young	0	0	sin datos

Comentarios Uruguay

Durante el período evaluado, no se registró presencia de *D. maidis* en ninguna de las tres localidades monitoreadas de la República Oriental del Uruguay. Este escenario resulta concordante con la marcada retracción poblacional observada en las restantes zonas de estudio.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 49° (16/08 al 31/08), 50° (01/09 al 15/09) y 51° lectura correspondiente al periodo comprendido del 16 de septiembre al 01 de octubre de 2026.

Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas implantadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				49° Lectura	50° Lectura	51° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	0	5	3
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	2	1	0
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	4	7	1
4	INTA	Jujuy	El Bananal	143	3	1
5	INTA	Jujuy	Viñalito	19	8	5
6	AAPPCE	Salta	Rio Piedras	16	sin datos	sin datos
7	AAPPCE	Salta	Quebrachal			5
8	AAPRESID	Salta	Rivadavia	1	3	4
9	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	25	6	1
10	CREA	Tucumán	Piedrabuena	33	18	0
11	CREA	Salta	Ceibalito	sin datos	sin datos	0
12	CREA	Tucumán	Alto Verde	1	2	0
13	CREA	Tucumán	La Invernada	16	7	2
14	CREA	Salta	El Galpón	51	39	23
15	CREA	Salta	El Tunal	sin datos	18	0
16	CREA	Salta	Embarcación	sin datos	sin datos	1
17	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	154	2	sin datos
18	CREA	Salta	Horcones	sin datos	sin datos	1
19	CREA	Catamarca	Los Altos	59	50	4
20	CREA	Salta	Las Lajitas T3	122	6	2
21	CREA	Salta	Metan 1	5	2	1
22	CREA	Salta	Metan 2	18	26	13
23	CREA	Salta	Mollinedo	sin datos	sin datos	0
24	CREA	Salta	Mosconi	3	1	1
25	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	sin datos	sin datos	0
26	CREA	Salta	Pichanal	sin datos	sin datos	2
27	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	sin datos	sin datos	0
28	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	11	401	202
29	CREA	Catamarca	El Abra	47	4	1
30	CREA	Salta	Tolloche	sin datos	sin datos	0
31	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	45	19	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

32	INTA	Salta	Metán	400	31	21
33	AAPPCE	Tucumán	Tusquita	15	12	4
34	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	115	40	22
35	CREA	Tucumán	Burruyacu	7	4	0
36	CREA	Tucumán	Garmendia	14	3	0
37	CREA	Salta	Copo Quiles	sin datos	13	0
38	CREA	Salta	Antilla	sin datos	0	2
39	CREA	Tucumán	La Cruz	6	0	1
40	CREA	Tucumán	Río Colorado	1	0	0✓
41	CREA	Tucumán	La Cocha 1	26	18	22
42	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	97	49	5
43	CREA	Tucumán	Las Cejas	495	22	23
44	CREA	Tucumán	Los Pereyra	16	12	12
45	CREA	Tucumán	Rumi Punco	12	6	13
46	CREA	Tucumán	Taco Ralo	17	6	12
47	CREA	Tucumán	Rapelli	73	10	29
48	CREA	Tucumán	La Bajada	5	2	2
49	CREA	Tucumán	La Virginia	38	14	1
50	CREA	Tucumán	San Agustín	39	8	1
51	CREA	Tucumán	Tacanas	63	9	11
52	CREA	Tucumán	Los Puestos	10	2	9
53	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	23	14	8✓
54	CREA	Tucumán	Viclos	Perdida	1	0
55	INTA	Tucumán	Leales	Perdida	0	1
56	AAPPCE	Tucumán	Tala Pozo	20	10	10
57	CREA	Santiago del Estero	El Charco	11	1	0
58	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	4	0	4
59	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	89	5	2
60	CREA	Santiago del Estero	Vinará	sin datos	6	5
61	CREA	Santiago del Estero	Frias	5	1	2
62	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	Perdida	34	12
63	CREA	Catamarca	Frias	19	5	8✓
64	INTA	Catamarca	Los Altos	2	0	1
65	CREA	Catamarca	Frias	sin datos	19	5

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 49° (16/08 al 31/08), 50° (01/09 al 15/09) y 51° lectura correspondiente al periodo comprendido del 16 de septiembre al 01 de octubre de 2026.

Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas implantadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				49° Lectura	50° Lectura	51° Lectura
1	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	11	1	3
2	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	6	1	0
3	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	0	1	0
4	CREA	Santiago del Estero	Weisburd	15	0	6
5	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	2	4	6
6	CREA	Santiago del Estero	Puna	1	0	0
7	CREA	Santiago del Estero	Cabure			2
8	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	10	10	2
9	CREA	Santiago del Estero	Lilo Viejo			14
10	CREA	Santiago del Estero	Casares			0
11	CREA	Santiago del Estero	Vilelas			Perdida
12	CREA	Santiago del Estero	Añatuya			2
13	CREA	Santiago del Estero	Pozo del Toba		0	4
14	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	24	9	2
15	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	13	25	23
16	CREA	Santiago del Estero	Otumpa	0	5	0
17	AAPPCE	Santiago del Estero	Col. Mackinlay	2	1	0✓
19	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	sin datos	sin datos	0
20	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	sin datos	sin datos	0
21	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	3	0	0
22	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	sin datos	0	sin datos
23	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	sin datos	1	sin datos
24	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	10	15	7
25	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	0	1	1
26	INTA	Santiago del Estero	Añatuya	Perdida	Perdida	0
27	INTA	Santiago del Estero	Malbran	1	0	0
28	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	8	3	2
29	CREA	Santiago del Estero	La Rosita	20	sin datos	sin datos
30	CREA	Santiago del Estero	Girardet	100	Perdida	0
31	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	100	Perdida	Perdida
32	CREA	Santiago del Estero	El colorado	Perdida	sin datos	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

33	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	3	3	0
34	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	7	2	1
35	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	2	0	0
36	AAPRESID	Santiago del Estero	Ahí Veremos	sin datos	sin datos	27
37	AAPPCE	Santiago del Estero	La Victoria	1	1	1✓
38	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	sin datos	sin datos	15
39	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	101	47	0
40	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	0	0	0✓
41	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	sin datos	sin datos	38
42	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	0	0	0
43	INTA	Chaco	Tres Isletas	4	11	3
44	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	612	45	82
45	INTA	Chaco	Las Breñas	1	0	0
46	INTA	Chaco	Juan José Castelli	2	2	2
47	INTA	Chaco	Sylvina	0	0	0✓
48	INTA	Chaco	Saenz Peña	2	5	21✓
49	INTA	Chaco	Basail	10	1	0✓
50	CREA	Santa Fe	San Bernardo	0	0	0✓
51	CREA	Chaco	La Montenegrina	3	0	0
52	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	7	0	0
53	CREA	Chaco	Palo blanco	1	0	0
54	CREA	Chaco	Pampa del Infierno	9	0	Perdida
55	CREA	Chaco	Castelli	2	1	0
56	CREA	Chaco	Bajo Hondo	5	4	15
57	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	1	0	0
58	CREA	Chaco	Charata	Perdida	0	0
59	CREA	Chaco	Gancedo	5	1	Perdida
60	CREA	Chaco	Las Breñas	Perdida	0	0
61	CREA	Chaco	Las Piedritas Emilia	sin datos	sin datos	0✓
62	INTA	Formosa	El Colorado	3	0	0
63	INTA	Formosa	Comandante Fontana	124	119	177
64	CREA	Formosa	Perin	60	1	5
65	CREA	Formosa	Las Lomitas	0	10	8✓
66	CREA	Santa Fe	La María	0	0	0✓
67	CREA	Santa Fe	Margarita	0	sin datos	0✓
68	CREA	Santa Fe	Ramayón	0	0	0✓
69	CREA	Santa Fe	Soledad	0	2	0✓
70	CREA	Santa Fe	Hersilia	sin datos	3	4
71	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	1	0	0✓
72	CREA	Santa Fe	La Osca	6	2	sin datos
73	CREA	Santa Fe	Malabrigo	3	3	7

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

74	CREA	Santa Fe	Arroyo Ceibal	0	0	0✓
75	AAPPCE	Santa Fe	Villa Minetti	0	0	Perdida
76	AAPPCE	Santa Fe	Santa Margarita	6	0	3
77	AAPRESID	Santa Fe	Villa Minetti	5	sin datos	34
72	INTA	Santa Fe	Reconquista	1	0	0✓
78	INTA	Santa Fe	Calchaquí	4	11	1✓
79	INTA	Santa Fe	Logroño	1	1	0
80	INTA	Santa Fe	San Javier	11	1	0
81	INTA	Santa Fe	La Sarita	2	2	1
82	CREA	Santa Fe	Emilia	0	0	0✓
83	CREA	Santa Fe	Ambrosetti	0	0	1✓
84	CREA	Santa Fe	La Pelada	0	1	0
85	CREA	Santa Fe	Crespo	0	0	0✓
86	CREA	Santa Fe	Colonia Esther	0	0	0✓
87	AAPPCE	Santiago del Estero	Fortín Inca			1
88	CREA	Santiago del Estero	Cabure			2
89	CREA	Santa Fe	Crespo	0	0	0
90	CREA	Santa Fe	Colonia Esther	0	0	0

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 49° (16/08 al 31/08), 50° (01/09 al 15/09) y 51° lectura correspondiente al periodo comprendido del 16 de septiembre al 01 de octubre de 2026. Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas implantadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				49° Lectura	50° Lectura	51° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	1	1	0✓
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	4	0	2✓
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	0	0	0
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	7	8	1✓
5	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	2	3	3
6	INTA	Corrientes	Mercedes	5	4	0
7	INTA	Corrientes	Virasoro	0	0	0✓
8	INTA	Corrientes	Goya	1	0	0✓
9	INTA	Corrientes	Curuzú	0	0	0✓
10	INTA	Corrientes	Esquina	0	0	0
11	INTA	Corrientes	Monte Caseros	3	1	3✓
12	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	0	0	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

13	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	0	0	sin datos
14	AAPPCE	Entre Ríos	San Salvador	sin datos	0	0
15	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	1	0	sin datos
16	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	0	0	0✓
17	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	0	0	0✓
18	AAPRESID	Entre Ríos	Gualedguay	0	0	0✓
19	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	0	0	0✓
20	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	0	0	0✓
21	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	0	0	0✓
22	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	0	0	0✓
23	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	1	0	0✓
24	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	0	0	sin datos
25	CREA	Entre Ríos	La Paz	0	0	0✓
26	CREA	Entre Ríos	Feliciano	0	0	0✓
27	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	0	0	0✓
28	CREA	Entre Ríos	Gualedguay	0	0	0✓
29	CREA	Entre Ríos	Gualedguaychu	0	0	sin datos
30	CREA	Entre Ríos	Victoria	0	0	0✓
31	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	1	sin datos	sin datos
32	INTA	Entre Ríos	Maria Grande	1	0	0
33	INTA	Entre Ríos	Nogoya	0	0	0✓
34	INTA	Entre Ríos	Villaguay	0	0	0
35	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	0	0	0
36	INTA	Entre Ríos	Diamante	0	0	0
37	INTA	Entre Ríos	Gualedguay	0	0	0
38	INTA	Entre Ríos	Parana	1	0	0
39	AAPPCE	Entre Ríos	Villa Mantero	0	0	sin datos
40	INTA	Misiones	Montecarlo	157	67	3✓

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 49° (16/08 al 31/08), 50° (01/09 al 15/09) y 51° lectura correspondiente al periodo comprendido del 16 de septiembre al 01 de octubre de 2026.

Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas implantadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				49° Lectura	50° Lectura	51° Lectura
1	AAPPCE	Córdoba	Corralito	0	0	0
2	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	0	0	0✓

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	3	2	0
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	1	0	0
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	27	1	3
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	sin datos	1	4
7	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	5	1	2
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	sin datos	1	1
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	0	sin datos
10	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	6	0	0
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	28	5	5
12	AAPRESID	Córdoba	Devoto	1	0	0
13	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	0	sin datos	sin datos
14	AAPRESID	Córdoba	Eufrazio Loza	57	20	0
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	0	sin datos	Perdida
16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	2	2	1
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	2	0	1
18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	7	4	0
19	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	4	0	0
20	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	3	sin datos	0
21	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	0	0	0
22	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	20	0	0
23	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	sin datos	Perdida	sin datos
24	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	2	0	0
25	CREA	Córdoba	Colonia Tirolesa	20	9	5
26	CREA	Córdoba	Piquillín	3	0	1
27	CREA	Córdoba	Las Chilcas	Perdida	8	5
28	CREA	Córdoba	Sebastián Elcano	0	1	2
29	CREA	Córdoba	El Tío	5	11	sin datos
30	CREA	Córdoba	Las Astillas	28	9	0✓
31	CREA	Córdoba	Tala Norte	1	1	0
32	CREA	Córdoba	Mi Granja	3	1	0✓
33	CREA	Córdoba	Sacanta	1	1	sin datos
34	CREA	Córdoba	Sinsacate	0	0	0
35	INTA	Córdoba	Manfredi	0	0	0
36	INTA	Córdoba	San Francisco	12	0	0
37	INTA	Córdoba	Brinkmann	5	0	0
38	AAPRESID	San Luis	La Toma	0	0	0
39	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	4	0	0
40	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	Perdida	1	0
41	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	1	0	0✓
42	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	0	0	Perdida
43	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	1	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

44	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	22	4	2
45	AAPPCE	Santa Fe	Pilar	3	0	0
46	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	65	11	1✓
47	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	sin datos	0	0✓
48	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	sin datos	0	0
49	AAPPCE	Santa Fe	Vila	3	1	0
50	AAPPCE	Santa Fe	López	4	0	0
51	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	5	0	0✓
52	AAPPCE	Santa Fe	Carlos Pelegrini			0✓
53	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	0	0	0✓
54	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	0	sin datos	sin datos
55	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	0	1	0
56	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	0	0	0
57	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	4	5	0✓
58	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	2	0	0✓
59	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	2	0	0✓
60	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	0	sin datos	sin datos
61	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana			0✓
62	AAPRESID	Santa Fe	San Bernardo	1	1	1✓
63	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	3	1	1✓
64	CREA	Santa Fe	Ataliva	0	0	0
65	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	0	0	0✓
66	CREA	Santa Fe	Crispi	0	0	0
67	CREA	Santa Fe	Esperanza	2	0	0
68	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	sin datos	sin datos	0✓
69	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	0	0	0
70	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	0	0	sin datos
71	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	0	2	0
72	CREA	Santa Fe	San Fabián	0	0	0✓
73	CREA	Santa Fe	San Martín de las Escobas	0	0	0✓
74	CREA	Santa Fe	Clucellas	1	0	0
75	INTA	Santa Fe	Centeno	1	0	0
76	INTA	Santa Fe	Rafaela	2	0	0
77	INTA	Santa Fe	Ceres	0	0	2
78	INTA	Santa Fe	San Justo	0	5	4

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 49° (16/08 al 31/08), 50° (01/09 al 15/09) y 51° lectura correspondiente al periodo comprendido del 16 de septiembre al 01 de octubre de 2026. Los valores con el símbolo “✓” corresponde a trampas implantadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				49° Lectura	50° Lectura	51° Lectura
1	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	0	0	0✓
2	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
3	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	0	0
4	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
5	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
6	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
7	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	Perdida
8	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	0	0	0
9	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	0	0	sin datos
10	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	0	0
11	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
12	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0
13	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
14	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	sin datos	0	sin datos
15	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	Perdida	0	0
16	AAPPCE	Buenos Aires	Florentino Ameghino	0	0	sin datos
17	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	0	0	0✓
18	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
19	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	0	Perdida	sin datos
20	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	0	0	0
21	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	0	0	0
22	AAPPCE	Buenos Aires	Pedro Gamen	0	0	0
23	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	sin datos	0	sin datos
24	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
25	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
26	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	0
27	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	0	0
28	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

29	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	Perdida	0	0✓
30	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	0	0
31	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	0	0	0
32	AAPRESID	Buenos Aires	Chillar	0	0	0
33	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	sin datos	0
34	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	0	0	0
35	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	0	0	0
36	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
37	CREA	Buenos Aires	América	0	0	0
38	CREA	Buenos Aires	Guanaco	0	Perdida	0
39	CREA	Buenos Aires	Henderson	0	0	0
40	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	0	0	0
41	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	0	0	0
42	CREA	Buenos Aires	Orense	0	0	0
43	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0
44	CREA	Buenos Aires	San Pedro	0	1	0
45	CREA	Buenos Aires	Alberdi	0	0	0
46	CREA	Buenos Aires	Junín	0	0	0
47	CREA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0
48	CREA	Buenos Aires	Catrilo	0	0	0
49	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	0	0	0
50	INTA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0
51	INTA	Buenos Aires	Conesa	0	0	0
52	INTA	Buenos Aires	San antonio de Areco	0	0	0
53	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
54	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	0	0	0
55	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	0	0	0
56	INTA	Buenos Aires	Bolivar	0	0	0
57	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	0
58	INTA	Buenos Aires	Balcarce	0	Perdida	0
59	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	0	0	0
60	AAPPCE	Córdoba	General Roca	0	0	0
61	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	0	0	0
62	AAPPCE	Córdoba	La playosa	0	0	0
63	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	0	0	0
64	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	0	0	0
65	AAPPCE	Córdoba	Villa María	0	0	0
66	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	0	0	0
67	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	0
68	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbuls maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

69	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	0	0	0
70	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	1	0	0✓
71	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	0✓
72	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	0	0	1✓
73	AAPRESID	Córdoba	Pegasano	3	0	0
74	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	2	0	0
75	CREA	Córdoba	General Levalle	0	0	sin datos
76	CREA	Córdoba	La Carlota	0	0	0
77	CREA	Córdoba	Melo	0	0	0
78	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	0	0	1
79	CREA	Córdoba	Villa valeria	0	0	0
80	CREA	Córdoba	Monte Buey	0	0	sin datos
81	INTA	Córdoba	Marcos Juarez 2	0	0	0
82	CREA	Córdoba	Ballesteros	3	0	0
83	CREA	Córdoba	La Brianza	0	0	0
84	AAPPCE	Córdoba	Achiras	0	0	0
85	AAPPCE	La Pampa	Macachín	0	0	0
86	CREA	La Pampa	General Pico	0	0	0
87	CREA	La Pampa	Quemú Quemú	0	0	0
88	CREA	La Pampa	Santa Rosa	0	0	0
89	INTA	La Pampa	Anguil 1	0	0	0
90	AAPPCE	La Pampa	Winifreda	0	sin datos	0
91	AAPPCE	La Pampa	Ing. Luiggi	0	0	sin datos
92	AAPRESID	San Luís	La Angelina	0	0	sin datos
93	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	0	0	sin datos
94	CREA	San Luís	Buena Esperanza	0	0	0
95	CREA	San Luís	Juan Jorba	0	0	0
96	INTA	San Luís	Quines			0✓
97	INTA	San Luís	San Luis 1	0	0	0
98	CREA	San Luís	Naschel	0	0	0
99	AAPPCE	Santa Fe	Álvarez	sin datos	0	0✓
100	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	0	0	0
101	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	0	0
102	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	0	Perdida	0
103	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	1	0	0
104	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	1	0	0
105	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	2	0	0✓
106	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	0	0	0✓
107	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	0	0	0
108	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	0	0	0
109	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	0	0	0✓

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

110	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	0	0	0
111	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	0	Perdida	0
112	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	0	0	0✓
113	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	0	0	0
114	INTA	Santa Fe	Pujato	Perdida	0	Perdida
115	INTA	Santa Fe	Cañada de Gómez	0	0	0
116	AAPPCE	Santa Fe	Los Quirquinchos	0	0	0

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (**AAPPCE**), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (**AAPRESID**), Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (**CASAFE**), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (**CONICET**), Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (**CREA**), Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (**EEAOC**), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (**INTA**), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (**MAIZAR**), y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (**SENASA**).

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas.** Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
1 a 4 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
5 a 20 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
21 a 50 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
51 a 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
> 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.