



RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 47


03 de agosto de 2026



AAPPCE



Aapresid



03 DE AGOSTO DE 2026

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)

INFORME N°47
17 de julio al 31 de julio de 2026.

En este cuadragésimo séptimo informe se relevaron en total 297 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (48 localidades), NEA (63 localidades), Litoral (37 localidades), Centro Norte (70 localidades) y Centro Sur (79 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 2 localidades de Uruguay.

Para cada región se evaluó cómo evolucionaron las capturas utilizando dos enfoques: un gráfico de torta para representar el resultado de todas las trampas y un gráfico de barras para mostrar únicamente las trampas instaladas en lotes de maíz en los últimos tres relevamientos (informes 45, 46 y 47). Adicionalmente, se realizó una comparación interanual correspondiente al mes de julio, contrastando los resultados obtenidos en 2025 y 2026.

En la región NOA se evidenció una leve retracción de las localidades comprendidas en la categoría de mayor abundancia (>100 adultos por trampa), no obstante, los niveles poblacionales continúan siendo elevados, con el 73% de las localidades registrando capturas superiores a 100 adultos por trampa (Figura 3). En esta región, el 50% de las trampas monitoreadas se encuentran instaladas en cultivos de maíz en estado de madurez fisiológica (R6), observándose nuevamente una marcada disminución del promedio regional de capturas en estas trampas con respecto al informe anterior.

En el NEA, se produjo una disminución de las localidades que registraron capturas superiores a 100 adultos por trampa con respecto al informe anterior. En esta región el 33% de las trampas monitoreadas se encuentran instaladas en cultivos de maíz, predominando lotes en estado de madurez fisiológica (R6), con niveles promedio de abundancia en las trampas que también evidenciaron una marcada disminución respecto de los registrados en el período anterior (Figura 6).

En el Litoral, el 60% de las localidades evaluadas registró presencia de *D. maidis*, observándose una estabilidad de las categorías de intermedia abundancia (1 a 20 y 21 a 50 adultos por trampa). En esta región el 13% de las trampas monitoreadas se encuentran instaladas en cultivos de maíz, en estado de madurez fisiológica (R6),

registrándose una disminución en los valores promedio de captura de las trampas, incluso más pronunciada que la observada en las regiones endémicas de *D. maidis* (Figura 7).

En la región Centro-Norte, el 87% de los sitios monitoreados registró presencia de *D. maidis*, observándose una estabilidad en la proporción de localidades incluidas en la categoría de máxima abundancia (>100 adultos por trampa) respecto del informe anterior. Del total de localidades relevadas, el 29% cuenta con trampas instaladas en cultivos de maíz que se encuentran en estado de madurez fisiológica (R6). No obstante, el promedio regional de capturas registrado en estas trampas mostró una leve disminución en comparación con el período previo (Figura 9).

En el Centro-Sur, el 93% de las localidades relevadas no registró capturas del vector. El 24% de las trampas monitoreadas se encuentran instaladas en cultivos de maíz, en estado de madurez fisiológica (R6), observándose una disminución del promedio regional de adultos registrados en estas trampas (Figura 11).

Las regiones del NOA y NEA continúan concentrando las mayores abundancias poblacionales de *D. maidis*, con presencia del vector en más del 98% de las localidades monitoreadas y un promedio del 60% de los sitios registrando capturas superiores a 100 adultos por trampa. En contraste, las regiones Litoral y Centro Sur evidencian una marcada disminución de las capturas durante los dos últimos informes. Por su parte, la región Centro-Norte presenta una tendencia general de retracción poblacional, aunque persisten localidades puntuales que constituyen focos de elevada abundancia del vector. En este contexto, resulta fundamental sostener esquemas de monitoreo activos, sistemáticos y geográficamente representativos, aun con el avance de los frentes de cosecha y la finalización del ciclo de los maíces tardíos. La información generada durante este período adquiere especial relevancia para comprender la dinámica poblacional estacional de *D. maidis* a escala regional, particularmente en relación con la ocurrencia, intensidad y distribución de las heladas, uno de los principales factores ambientales que regulan la supervivencia del vector durante el período invernal. Asimismo, la presencia de plantas voluntarias de maíz en lotes ya cosechados constituye un componente epidemiológico de gran importancia, ya que actúan como un “puente verde” que favorece la supervivencia y permanencia de *D. maidis*, contribuyendo a la continuidad del patosistema entre campañas. El monitoreo de estos hospederos resulta estratégico para la detección temprana de focos de persistencia y para la estimación de densidades poblacionales remanentes.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Por ello, la continuidad de los sistemas de vigilancia durante el período otoño-invernal resulta esencial para fortalecer la capacidad predictiva y mejorar la toma de decisiones de manejo a escala regional.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, en el que el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 46ª lectura (16/07 al 31/07).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el vigésimo tercero al cuadragésimo séptimo informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 45° (16/06 al 30/06), 46° (01/07 al 16/07) y 47° (17/07 al 31/07).

Comentarios Región NOA

Se relevaron 48 localidades, donde todas registraron presencia del vector. La categoría más frecuente como en el informe anterior correspondió a > 100 adultos por trampa, que representó el **73% (Figura 3)**. En esta región, el **50%** de las trampas se encuentran instaladas sobre cultivo de maíz. En el presente relevamiento se registra una disminución en las capturas promedio de chicharrita por trampa en lotes de maíz, en comparación con el monitoreo previo, pasando de **455,28 a 249,90 adultos por trampa (Figura 4)**. Las localidades que registraron las mayores capturas fueron **Las Cejas (Tucumán)**, con **5000** adultos por trampa; **El Bananal (Jujuy)**, con **1195** adultos por trampa y **El palomar (Santiago del Estero)**, con **983** adultos por trampa. En la comparación interanual correspondiente al mes de julio (2025 vs. 2026) se observa que, durante la segunda quincena de julio de 2026, la proporción de localidades incluidas en la categoría de máxima abundancia (>100 adultos por trampa) se mantuvo elevada, a diferencia de lo registrado en igual período de 2025, cuando se evidenció una marcada retracción de dicha categoría (**Figura 5**).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 4. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NOA, según datos de los informes 45°, 46° y 47° (presente informe).




Figura 5. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

trampas instaladas en cultivos de maíz durante la primera y segunda quincena de julio de las campañas 2025 y 2026 en la región NOA.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)




Figura 6. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 45° (16/06 al 30/06), 46° (01/07 al 16/07) y 47° (17/07 al 31/07).

Comentarios Región NEA

Del relevamiento efectuado en 63 localidades, registrándose detecciones del vector en el 98%. Asimismo, las categorías de captura más representativas fueron la de más de 100 adultos por trampa con un **46%** (**Figura 6**). Cabe destacar que el **33%** de las trampas incluidas en este relevamiento están sobre el cultivo de maíz, donde el valor promedio de captura de *D. maidis* registro nuevamente una marcada disminución respecto al de la quincena anterior, pasando de **433,50 a 195,29 por trampa** (**Figura 7**). Las localidades con mayores niveles de captura se ubicaron en la provincia de Santiago del Estero, destacándose entre ellas **Pampa de los Guanacos y Puna** con los valores más elevados (**1118 y 1025 adultos por trampa** respectivamente). La comparación interanual de julio (2025 vs. 2026) muestra una tendencia similar a la observada en el NOA. En la segunda quincena de julio de 2026, la proporción de localidades con capturas superiores a 100 adultos por trampa se mantuvo elevada, sin la retracción registrada en el mismo período

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

de 2025. En consecuencia, tampoco se observó un aumento en la proporción de localidades sin detección del vector (**Figura 8**).




Figura 7. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región NEA, según datos de los informes 45°, 46° y 47° (presente informe).




Figura 8. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en trampas instaladas en cultivos de maíz durante la primera y segunda quincena de julio de las campañas 2025 y 2026 en la región NEA.

Resumen Región Litoral




Figura 9. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 45° (16/06 al 30/06), 46° (01/07 al 16/07) y 47° (17/07 al 31/07).

Comentarios Región Litoral

En la región del Litoral se relevaron 37 localidades, observándose en un **60%** de ellas detecciones de ***D. maidis***, predominando las categorías de ausencia del vector (**40%**) y con capturas de **1 a 4 (35%)**, como se detalla en la **Figura 9**. El **13%** de las trampas están instaladas sobre cultivos de maíz que actualmente transitan estadios reproductivos avanzados, registrándose una marcada retracción en las capturas promedio de chicharrita por trampa, en comparación con el monitoreo previo, pasando de **30,83 a 3,00 adultos por trampa (Figura 10)**. La localidad de mayor captura fue representada por **Corrientes** con **208 adultos por trampa**. La comparación interanual correspondiente al mes de julio (2025 vs. 2026) evidencia un comportamiento diferente al observado en la zona endémica (NOA y NEA). En la región Litoral, la categoría de máxima abundancia (>100 adultos por trampa) se encuentra prácticamente retraída, mientras que la proporción de localidades con presencia del vector, pero con abundancias bajas, es mayor que la registrada durante la campaña 2025 (**Figura 10**).




Figura 10. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región LITORAL, según datos de los informes 45°, 46° y 47° (presente informe).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 10. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en trampas instaladas en cultivos de maíz durante la primera y segunda quincena de julio de las campañas 2025 y 2026 en la región LITORAL.

Resumen Región Centro Norte




Figura 11. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 45° (16/06 al 30/06), 46° (01/07 al 16/07) y 47° (17/07 al 31/07).

Comentarios Región Centro Norte

En esta región, el **87%** de las localidades registró detecciones de *D. maidis* en las trampas, predominando la categoría de más de **5 a 20 adultos por trampa**, que representó el **24%** del total de localidades monitoreadas (**Figura 11**). De las 70 localidades relevadas, el 29% de las trampas se encuentran instaladas en cultivos de maíz. Las mayores capturas de *D. maidis* correspondieron a **Eufracio Loza con 800 adultos y Monte del Rosario con 674 adultos por trampa** ambas perteneciente a la provincia de Córdoba. En cuanto al promedio regional, las trampas instaladas en lotes de maíz registraron una leve disminución en las capturas de *D. maidis*, pasando de **171,95 a 134,95 adultos por trampa (Figura 12)**. La comparación interanual correspondiente al mes de julio (2025 vs. 2026) muestra que, durante el mes de julio de 2026, la categoría de máxima abundancia (>100 adultos por trampa) se mantuvo elevada, a diferencia de lo observado en el mismo período de 2025, cuando registró una marcada retracción. Del mismo modo, las categorías

intermedias de abundancia concentraron una mayor proporción de localidades que en la campaña previa, evidenciando una mayor persistencia regional de *D. maidis* (**Figura 13**).




Figura 12. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO NORTE, según datos de los informes 45°, 46° y 47° (**presente informe**).

CENTRO NORTE




Figura 13. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en trampas instaladas en cultivos de maíz durante la primera y segunda quincena de julio de las campañas 2025 y 2026 en la región CENTRO NORTE.

Resumen Región Centro Sur




Figura 14. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 45° (16/06 al 30/06), 46° (01/07 al 16/07) y 47° (17/07 al 31/07).

Comentarios Región Centro Sur

De las 79 localidades relevadas, en un **93%** no se registró detecciones de ***D. maidis*** (**Figura 14**). El 24% de las trampas se encontraban instaladas sobre el cultivo de maíz, observándose la mayor captura en la localidad de **Timbúes (Santa Fe)** con **191 capturas de adultos por trampa**. En las localidades monitoreadas con cultivos de maíz, el promedio de capturas de *D. maidis* mostró una leve disminución respecto del informe previo, descendiendo de **15,59 a 11,68 adultos por trampa (Figuras 15)**. La comparación interanual correspondiente al mes de julio (2025 vs. 2026) evidencia que, durante la segunda quincena de julio de 2026, la retracción poblacional de *D. maidis* fue más pronunciada que la observada en el mismo período de la campaña anterior. En consecuencia, aumentó la proporción de localidades sin presencia del vector, reforzando la importancia de las condiciones ambientales como factores determinantes en la regulación de la dinámica poblacional de la especie (**Figura 16**).




Figura 15. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO SUR, según datos de los informes 45°, 46° y 47° (presente informe).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 16. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en trampas instaladas en cultivos de maíz durante la primera y segunda quincena de julio de las campañas 2025 y 2026 en la región CENTRO SUR.

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa 45° (16/06 al 30/06), 46° (01/07 al 16/07) y 47° (17/07 al 31/07).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

N° Loc.	Institución	Nombre de trampa	Localidad	45° Lectura	46° Lectura	47° Lectura
1	AGTSA	2025 MERCEDES UY - AGTSA	Mercedes	4	0	
2	AGTSA	2025 ACEGUÁ UY - AGTSA	Peñarol			
3	AGTSA	2025 RINCON DEL PINO - AGTSA	Los Arenales			
4	AGTSA	2025 NUEVA HELVECIA - AGTSA (SAN PEDRO)	Nueva Helvecia	17	3	
5	AGTSA	2025 LAS ARMAS	Colonia		0	1
6	AGTSA	2025 CORRALITO - AGTSA	Palmitas	2	2	
7	AGTSA	2025 Durazno - AGTSA	Durazno	0		
8	AGTSA	2025 Young 2 - AGTSA	Young	6	2	21
9	AGTSA	2026 Young 1 - AGTSA	Young			

Comentarios Uruguay

Durante el período evaluado se registró la presencia de *D. maidis* en las dos localidades monitoreadas de la República Oriental del Uruguay. No obstante, se observaron marcadas diferencias en la abundancia poblacional entre ambas. En **Colonia** se registró únicamente **1 adulto por trampa**, mientras que en **Young** las capturas alcanzaron un promedio de **21 adultos por trampa**, constituyéndose en la localidad con la mayor abundancia registrada en el presente informe.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 45° (16/06 al 30/06), 46° (01/07 al 16/07) y 46° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 al 31 de julio de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	45° Lectura	46° Lectura	47° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	15	6	2
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	20	12	10
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	10	15	12
4	INTA	Jujuy	El Bananal	1414	908	1195
5	INTA	Jujuy	Viñalito	3771	2470	758
6	AAPPCE	Salta	Agua Sucia	298	354	552
7	AAPPCE	Salta	Rio Piedras	583	315	481
8	AAPRESID	Salta	Rivadavia	169	395	59
9	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	587	910	570
10	CREA	Salta	Antilla	630	450	sin datos
11	CREA	Salta	Ceibalito	451	sin datos	sin datos
12	CREA	Salta	Copo Quiles	2700	sin datos	sin datos
13	CREA	Salta	El Bordo	4500	sin datos	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

14	CREA	Salta	El Galpón	1180	1920	1910
15	CREA	Salta	El Tunal	622	654	723
16	CREA	Salta	Horcones	55	sin datos	sin datos
17	CREA	Salta	J V Gonzales	50	sin datos	sin datos
18	CREA	Salta	Las Lajitas T3	246	945	919
19	CREA	Salta	Metan 1	161	187	90
20	CREA	Salta	Metan 2	1268	1112	696
21	CREA	Salta	Mosconi	52	22	18
22	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	Perdida	sin datos	sin datos
23	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	538	sin datos	sin datos
24	CREA	Salta	Santo Domingo	655	sin datos	sin datos
25	CREA	Salta	Saravia	2080	sin datos	sin datos
26	CREA	Salta	Tolloche	61	sin datos	sin datos
27	INTA	Salta	Metán	608	472	104
28	AAPPCE	Tucumán	Tusquita	1796	775	479
29	CREA	Tucumán	Alto Verde	86	161	120
30	CREA	Tucumán	Burruyacu	480	120	210
31	CREA	Tucumán	Garmendia	280	85	56
32	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	852	335	114
33	CREA	Tucumán	La Bajada	14	22	14
34	CREA	Tucumán	La Cocha 1	317	203	200
35	CREA	Tucumán	La Cruz	894	66	1386
36	CREA	Tucumán	La Invernada	172	402	498
37	CREA	Tucumán	La Virginia	456	187	136
38	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	562	603	297
39	CREA	Tucumán	Las Cejas	918	4480	5000
40	CREA	Tucumán	Los Pereyra	326	178	Perdida
41	CREA	Tucumán	Los Puestos	440	640	269
42	CREA	Tucumán	Piedrabuena	Perdida	245	223
43	CREA	Tucumán	Rapelli	2000	410	1300
44	CREA	Tucumán	Río Colorado	243	197	98
45	CREA	Tucumán	Rumi Punco	420	184	148
46	CREA	Tucumán	San Agustín	873	132	212
47	CREA	Tucumán	Tacanas	39	140	40
48	CREA	Tucumán	Taco Ralo	410	156	171
49	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	674	398	254
50	CREA	Tucumán	Trancas	1760	451	sin datos
51	CREA	Tucumán	Viclos	Perdida	133	54
52	INTA	Tucumán	Leales	389	11	12
53	AAPPCE	Tucumán	Tala Pozo	240	60	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

54	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	226	223	186
55	CREA	Santiago del Estero	El Charco	130	320	52
56	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	651	1610	983
57	CREA	Santiago del Estero	Frias	653	337	224
58	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	660	800	213
59	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	230	200	193
60	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	1600	2040	sin datos
61	CREA	Santiago del Estero	Vinará	578	643	Perdida
62	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	Perdida	Perdida	680
63	CREA	Catamarca	El Abra	388	263	395
64	CREA	Catamarca	Los Altos	1049	989	639
65	INTA	Catamarca	Los Altos	115	21	sin datos

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 45° (16/06 al 30/06), 46° (01/07 al 16/07) y 46° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 al 31 de julio de 2026. Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	45° Lectura	46° Lectura	47° Lectura
1	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	2120	sin datos	sin datos
2	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	147	Perdida	112
3	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	215	648	133
4	INTA	Chaco	Tres Isletas	sin datos	817	72
5	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	345	550	455
6	INTA	Chaco	Las Breñas	940	946	266
7	INTA	Chaco	Juan José Castelli	1431	243	296
8	INTA	Chaco	Sylvina	5	41	13
9	INTA	Chaco	Basail	198	38	44
10	CREA	Santa Fe	La María	33	102	36
11	CREA	Santa Fe	Margarita	5	58	35
12	CREA	Santa Fe	Ramayón	304	406	Perdida
13	CREA	Santa Fe	Soledad	996	106	15
14	CREA	Santa Fe	Hersilia	425	1050	34
15	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	69	35	26
16	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	0	sin datos	350

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

17	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	0	sin datos	335
18	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	0	43	53
19	CREA	Santa Fe	Gobernador Crespo	65	0	2
20	CREA	Santa Fe	La Osca	158	438	Perdida
21	CREA	Santa Fe	Malabrigo	241	840	95
22	INTA	Formosa	El colorado	38	69	52
23	INTA	Formosa	Comandante Fontana	Perdida	31	117
24	CREA	Santiago del Estero	Pozo de toba	800	sin datos	sin datos
25	CREA	Santa Fe	Arroyo Ceibal	209	Perdida	2
26	AAPPCE	Santa Fe	Santa Margarita	sin datos	162	142
27	AAPRESID	Santa Fe	Villa Minetti	1320	1160	8
28	CREA	Santiago del Estero	Weisburd	1512	sin datos	sin datos
29	INTA	Santa Fe	Reconquista	834	1008	11
30	INTA	Santa Fe	Calchaquí	281	157	72
31	INTA	Santa Fe	Logroño	1080	331	50
32	INTA	Santa Fe	San javier	86	148	11
33	INTA	Santa Fe	La sarita	1589	1164	190
34	CREA	Santa Fe	Emilia	15	16	sin datos
35	CREA	Santa Fe	Ambrosetti	675	480	75
36	CREA	Santa Fe	La Pelada	38	6	2
37	CREA	Santa Fe	San Bernardo	18	16	sin datos
38	CREA	Santa Fe	Colonia Esther	10	11	10
39	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	12	11	7
40	CREA	Chaco	La Montenegrina	7	Perdida	2
41	CREA	Santiago del Estero	Puna	469	Perdida	1025
42	CREA	Formosa	Perin	215	469	33
43	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	sin datos	80	235
44	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	sin datos	203	450
45	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	1450	Perdida	13
46	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	2151	423	762
47	AAPPCE	Santiago del Estero	Col. Mackinlay	6	sin datos	19
48	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	2151	sin datos	sin datos
49	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	sin datos	sin datos	5
50	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	283	59	258
51	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	1088	39	24
52	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	73	sin datos	sin datos
53	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	250	sin datos	84
54	CREA	Chaco	Palo blanco	sin datos	123	42
55	CREA	Chaco	Pampa del Infierno	sin datos	730	440
56	CREA	Chaco	Castelli	sin datos	8	sin datos
57	CREA	Chaco	Bajo Hondo	sin datos	5	15

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

58	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	sin datos	71	31
59	CREA	Chaco	Charata	1760	166	200
60	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	727	870	235
61	INTA	Santiago del Estero	Añatuya	1832	1176	908
62	INTA	Santiago del Estero	Malbran	281	2	0
63	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	1837	675	1118
64	CREA	Santiago del Estero	La Rosita	1250	200	220
65	CREA	Chaco	Gancedo	530	Perdida	550
66	CREA	Chaco	Las Breñas	720	200	200
67	CREA	Santiago del Estero	Girardet	1280	240	300
68	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	2000	200	450
69	CREA	Santiago del Estero	El colorado	1300	250	400
70	CREA	Formosa	Las Lomitas	240	254	46
71	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	421	Perdida	217
72	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	68	27	21
73	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	974	1040	763
74	AAPRESID	Santiago del Estero	Avia Terai	300	sin datos	120
75	AAPPCE	Santa Fe	Villa Minetti	Sin datos	sin datos	8

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 45° (16/06 al 30/06), 46° (01/07 al 16/07) y 46° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 al 31 de julio de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	45° Lectura	46° Lectura	47° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	8	3	1
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	38	Perdida	0
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	185	174	208
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	7	1	9
5	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	0	4	6
6	INTA	Corrientes	Mercedes	1	3	7
7	INTA	Corrientes	Virasoro	0	4	3
8	INTA	Corrientes	Goya	5	0	1
9	INTA	Corrientes	Curuzú	2	0	Perdida
10	INTA	Corrientes	Esquina	sin datos	45	0
11	INTA	Corrientes	Monte Caseros	9	2	0
12	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	9	0	1
13	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	8	0	Perdida

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

14	AAPPCE	Entre Ríos	San Salvador	45	13	9
15	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	97	18	18
16	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	4	1	1
17	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	17	9	1
18	AAPRESID	Entre Ríos	Gualeduay	0	0	0
19	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	224	12	2
20	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	5	2	0
21	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	13	6	1
22	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	5	0	0
23	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	28	12	6
24	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	47	Perdida	0
25	CREA	Entre Ríos	La Paz	4	16	3
26	CREA	Entre Ríos	Feliciano	0	0	0
27	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	6	Perdida	0
28	CREA	Entre Ríos	Gualeduay	15	0	2
29	CREA	Entre Ríos	Gualeduaychu	0	0	0
30	CREA	Entre Ríos	Victoria	0	0	0
31	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	15	2	2
32	INTA	Entre Ríos	Maria Grande	2	1	19
33	INTA	Entre Ríos	Nogoya	28	0	0
34	INTA	Entre Ríos	Villaguay	0	1	0
35	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	397	4	1
36	INTA	Entre Ríos	Diamante	27	5	2
37	INTA	Entre Ríos	Gualeduay	2	0	0
38	INTA	Entre Ríos	Parana	58	51	48
39	AAPPCE	Entre Ríos	Villa Mantero	5	0	0

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 45° (16/06 al 30/06), 46° (01/07 al 16/07) y 46° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 al 31 de julio de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	45° Lectura	46° Lectura	47° Lectura
1	AAPPCE	Córdoba	Corralito	151	0	34
2	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	32	4	22
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	46	10	37
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	16	2	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	78	137	293
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	164	22	56
7	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	49	107	179
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	68	12	18
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	0	0
10	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	30	28	14
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	626	196	260
12	AAPRESID	Córdoba	Devoto	12	46	13
13	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	2	2	0
14	AAPRESID	Córdoba	Eufasio Loza	2240	2320	800
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	111	5	7
16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	60	45	120
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	686	306	674
18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	177	98	101
20	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	86	46	53
21	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	238	496	211
22	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	310	138	150
23	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	18	69	56
24	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	920	86	sin datos
25	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	0	23	30
26	AAPRESID	Córdoba	Hernando	0	3	sin datos
27	CREA	Córdoba	Colonia Tirolesa	9	4	42
28	CREA	Córdoba	Piquillín	157	52	18
29	CREA	Córdoba	Las Chilcas	2900	39	sin datos
30	CREA	Córdoba	Sebastián Elcano	138	174	24
31	CREA	Córdoba	El Tío	45	228	59
32	CREA	Córdoba	Las Astillas	233	1254	441
33	CREA	Córdoba	Tala Norte	752	95	26
34	CREA	Córdoba	Mi Granja	453	484	89
35	CREA	Córdoba	Sacanta	640	7	40
36	CREA	Córdoba	Sinsacate	687	235	26
37	INTA	Córdoba	Manfredi	49	30	22
38	INTA	Córdoba	San Francisco	48	32	25
39	INTA	Córdoba	Brinkmann	754	170	99
40	AAPRESID	San Luis	La Toma	18	8	8
41	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	110	7	64
42	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	32	14	4
43	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	6	7	8
44	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	2	1	28
45	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	31	12	4
46	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	22	23	108

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

47	AAPPCE	Santa Fe	Pilar	28	16	25
48	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	5	4	146
49	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	8	0	0
50	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	22	2	0
51	AAPPCE	Santa Fe	Vila	5	2	0
52	AAPPCE	Santa Fe	López	33	7	6
53	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	57	32	29
54	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	7	14	0
55	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	4	sin datos	sin datos
56	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	64	10	8
57	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	30	0	3
58	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	79	22	6
59	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	388	69	17
60	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	0	5	32
61	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	3	2	sin datos
63	AAPRESID	Santa Fe	San Bernardo	59	19	6
64	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	10	7	7
65	CREA	Santa Fe	Ataliva	3	5	6
66	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	39	4	8
67	CREA	Santa Fe	Crispi	41	18	4
68	CREA	Santa Fe	Esperanza	0	5	0
69	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	14	4	5
70	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	6	1	0
71	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	sin datos	sin datos	1
72	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	0	0	3
73	CREA	Santa Fe	San Fabián	3	1	0
74	CREA	Santa Fe	San Martín de las Escobas	17	4	21
75	CREA	Santa Fe	Clucellas	sin datos	3	11
76	INTA	Santa Fe	Centeno	11	9	37
77	INTA	Santa Fe	Rafaela	143	287	100
78	INTA	Santa Fe	Ceres	1936	2423	463
79	INTA	Santa Fe	San Justo	505	sin datos	Perdida

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 45° (16/06 al 30/06), 46° (01/07 al 16/07) y **46° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 al 31 de julio de 2026**. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	45° Lectura	46° Lectura	47° Lectura
1	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	29	4	3
2	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
3	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	0	0
4	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
5	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
6	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
7	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	0
8	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	1	0	0
9	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	9	1	0
10	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	0	0
11	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
12	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0
13	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
14	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	0	0	0
15	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	0	0
16	AAPPCE	Buenos Aires	Rafael Obligado	0	0	sin datos
17	AAPPCE	Buenos Aires	Florentino Ameghino	0	0	sin datos
18	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	0	0	0
19	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
20	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	6	2	0
21	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	0	0	sin datos
22	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	0	0	0
23	AAPPCE	Buenos Aires	Pedro Gamen	0	0	sin datos
24	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	0	0	sin datos
25	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
26	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
27	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	0
28	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	0	0
29	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
30	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	0	sin datos
31	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	sin datos	sin datos
32	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	0	0	sin datos
33	AAPRESID	Buenos Aires	Puan	0	sin datos	sin datos
34	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	0	0
35	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	0	0	0
36	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	Perdida	0	1
37	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
38	CREA	Buenos Aires	América	0	0	0
39	CREA	Buenos Aires	Guanaco	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

40	CREA	Buenos Aires	Henderson	0	0	0
41	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	0	0	0
42	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	0	0	0
43	CREA	Buenos Aires	Orense	0	0	0
44	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0
45	CREA	Buenos Aires	San Pedro	2	1	0
46	CREA	Buenos Aires	Alberdi	1	0	0
47	CREA	Buenos Aires	Junín	0	0	0
48	CREA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0
49	CREA	Buenos Aires	Catriló	0	1	0
50	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	0	0	0
51	INTA	Buenos Aires	Pergamino	10	4	1
52	INTA	Buenos Aires	Conesa	8	3	0
53	INTA	Buenos Aires	San antonio de Areco	12	3	2
54	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
55	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	1	1	0
56	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	0	Perdida	0
57	INTA	Buenos Aires	Bolívar	0	0	0
58	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	0	Perdida	0
59	INTA	Buenos Aires	Balcarce	0	0	0
60	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	5	0	1
61	AAPPCE	Córdoba	General Roca	0	0	0
62	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	7	0	2
63	AAPPCE	Córdoba	La playosa	0	0	0
64	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	1	0	0
65	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	0	0	0
66	AAPPCE	Córdoba	Villa María	3	0	0
67	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	5	0	1
68	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	0
69	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	12	4	Perdida
70	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	3	0	0
71	AAPRESID	Córdoba	Lecueder	0	sin datos	sin datos
72	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	0	1	sin datos
73	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	0
74	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	13	3	sin datos
75	AAPRESID	Córdoba	Pegasano	0	1	0
76	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	8	6	1
77	CREA	Córdoba	General Levalle	7	5	1
78	CREA	Córdoba	La Carlota	21	3	1
79	CREA	Córdoba	Melo	5	5	4
80	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	9	6	2

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

81	CREA	Córdoba	Villa valeria	0	1	1
82	CREA	Córdoba	Monte Buey	sin datos	sin datos	5
83	INTA	Córdoba	Marcos Juárez 2	5	0	0
84	CREA	Córdoba	Ballesteros	6	1	3
85	CREA	Córdoba	La Brianza	7	0	3
86	AAPPCE	Córdoba	Achiras	2	0	0
87	AAPPCE	La Pampa	Macachín	0	0	0
88	CREA	La Pampa	General Pico	5	0	0
89	CREA	La Pampa	Quemú Quemú	0	0	0
90	CREA	La Pampa	Santa Rosa	0	0	0
91	INTA	La Pampa	Anguil 1	0	0	0
92	AAPPCE	La Pampa	Winifreda	0	0	0
93	AAPPCE	La Pampa	Ing. Luiggi	0	0	sin datos
94	AAPRESID	San Luís	La Angelina	0	0	0
95	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	0	0	0
96	CREA	San Luís	Buena Esperanza	0	0	3
97	CREA	San Luís	Juan Jorba	4	2	1
98	INTA	San Luís	San Luis 1	10	3	0
99	CREA	San Luís	Naschel	7	2	2
100	AAPPCE	Santa Fe	Álvarez	2	sin datos	sin datos
101	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	1	0	0
102	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	0	0
103	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	8	1	3
104	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	10	1	5
105	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	1	0	0
106	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	784	391	191
107	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	1	0	sin datos
108	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	15	3	0
109	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	7	0	0
110	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	28	7	5
111	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	6	Perdida	0
112	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	0	0	sin datos
113	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	10	2	11
114	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	2	0	1
115	INTA	Santa Fe	Pujato	20	17	16
116	INTA	Santa Fe	Cañada de Gómez	5	0	0
117	AAPPCE	Santa Fe	Los Quirquinchos	2	0	0

ANEXO 1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (**AAPPCE**), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (**AAPRESID**), Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (**CASAFE**), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (**CONICET**), Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (**CREA**), Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (**EEAOC**), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (**INTA**), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (**MAIZAR**), y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (**SENASA**).

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.




Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas.** Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
1 a 4 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
5 a 20 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
21 a 50 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
51 a 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
> 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa